

## ELENCO SISTEMÁTICO DE LOS CURCULIONOIDEA (COLEOPTERA) DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES

Miguel A. Alonso-Zarazaga

Depto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal, 2, E-28006 Madrid, España

**Resumen:** Se proporcionan nuevos datos sobre la distribución de 199 especies de gorgojos (Coleoptera, Curculionoidea) de la Península Ibérica e islas Baleares, resultando dos especies nuevas para España: *Tanysphyrus lemnae* (Fabricius, 1792) y *Heydeneonymus amplicollis* (Boheman, 1840), 14 para Portugal: *Catapion pubescens* (Kirby, 1811), *Exapion wagnerianum* Schatzmayr, 1925, *Holotrichapion (Holotrichapion) saturnium* (Normand, 1937), *Stenopterapion (Stenopterapion) tenue* (Kirby, 1808), *Corimalia postica* (Gyllenhal, 1838), *Nanophyes brevis bleusei* Pic, 1900, *Eremobaris picturata* (Ménétriés, 1849), *Anthonomus (Anthonomus) rubi* (Herbst, 1795), *Sibinia (Dichotychius) gallica gemmans* Desbrochers des Loges, 1908, *Sibinia (Dichotychius) planiuscula planiuscula* Desbrochers des Loges, 1873, *Polydrusus (Eurodrusus) pilosus pilosus* Gredler, 1866, *Coniatus (Bagoides) suavis* Gyllenhal, 1834, *Coniocleonus (Augustecleonus) nebulosus* (Linnaeus, 1758) y *Temnorhinus (Temnorhinus) mixtus* (Fabricius, 1792) y una para Andorra: *Ceutorhynchus pyrhorhynchus* (Marsham, 1802). Se presenta un elenco actualizado de las especies citadas del área, y se da un corto listado de aquellas especies cuya presencia se considera descartable por diferentes motivos. *Lixus (Dilixellus) punctiventris* Boheman, 1835 es un homónimo primario de *L. punctiventris* Germar, 1823 y se reemplaza con *L. abdominalis* Boheman, 1835, **stat. res.**

**Palabras clave:** Coleoptera, Curculionoidea, especies descartadas, homonimia, primeros registros, área iberobaleár, Paleártico.

### Systematic checklist of the Curculionoidea (Coleoptera) of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands

**Abstract:** New data on the distribution of 199 species of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands are presented, with two species new to Spain: *Tanysphyrus lemnae* (Fabricius, 1792) and *Heydeneonymus amplicollis* (Boheman, 1840), 14 new to Portugal: *Catapion pubescens* (Kirby, 1811), *Exapion wagnerianum* Schatzmayr, 1925, *Holotrichapion (Holotrichapion) saturnium* (Normand, 1937), *Stenopterapion (Stenopterapion) tenue* (Kirby, 1808), *Corimalia postica* (Gyllenhal, 1838), *Nanophyes brevis bleusei* Pic, 1900, *Eremobaris picturata* (Ménétriés, 1849), *Anthonomus (Anthonomus) rubi* (Herbst, 1795), *Sibinia (Dichotychius) gallica gemmans* Desbrochers des Loges, 1908, *Sibinia (Dichotychius) planiuscula planiuscula* Desbrochers des Loges, 1873, *Polydrusus (Eurodrusus) pilosus pilosus* Gredler, 1866, *Coniatus (Bagoides) suavis* Gyllenhal, 1834, *Coniocleonus (Augustecleonus) nebulosus* (Linnaeus, 1758) and *Temnorhinus (Temnorhinus) mixtus* (Fabricius, 1792) and one new to Andorra: *Ceutorhynchus pyrhorhynchus* (Marsham, 1802). An updated checklist of the species recorded from the above mentioned area is given, as well as a short list of those species whose presence can be discarded for different reasons. *Lixus (Dilixellus) punctiventris* Boheman, 1835 is a primary homonym of *L. punctiventris* Germar, 1823 and is replaced with *L. abdominalis* Boheman, 1835, **stat. res.**

**Key words:** Coleoptera, Curculionoidea, discarded species, homonymy, first records, Ibero-Balearic area, Palaearctic.

### Introducción

Han pasado ya dieciséis años desde mi primer intento de plasmar en negro sobre blanco un listado de los táxones de gorgojos (Curculionoidea) presentes en la Península Ibérica y las islas Baleares (Alonso-Zarazaga, 2002). La reciente publicación del *Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea* (Alonso-Zarazaga *et al.*, 2017) me ha parecido un buen punto de partida para actualizar aquella lista, que se ha quedado muy obsoleta, no sólo en cuanto al número de los diferentes táxones, sino también en cuanto a los cambios de nombre sufridos por algunos de ellos.

Este elenco se basa en un catálogo personal que lleva haciéndose casi cuarenta años (al principio en cartulinas, después en diferentes formatos de bases de datos para ordenador, incluyendo el formato actual, Microsoft Access® 2010). En los últimos años, se han incorporado todas las revistas ibéricas de Historia Natural casi en su completitud (353, algunos números de revistas portuguesas y catalanas no han podido comprobarse en busca de menciones de gorgojos), pero aún queda comprobar revistas y monografías extra-ibéricas. En su momento, cuando se considere más completo de lo que está ahora (aunque ya lo esté mucho más de lo que estuvo el catálogo de Iglesias Iglesias, 1922), se dará también a imprenta como tal catálogo, con todos los datos recogidos.

No es inusual ver que un trabajo recoge como nueva para la Península Ibérica, las Baleares o alguna de sus entidades políticas o físicas componentes (comunidad autónoma, provincia o distrito — en Portugal continental — o isla) una especie que realmente no lo es. El catálogo de Iglesias Iglesias (1922) está obsoleto y contiene numerosos errores. Mi lista preliminar (Alonso-Zarazaga, 2002) no indicaba localidades salvo para las seis especies que se citaban como nuevas para la fauna iberobaleár. La persona que intente formarse un catálogo como el que obra actualmente en mi poder tendría que revisar 1474 referencias para saber en qué provincias o distritos están citadas las especies. Bajo la premisa de que aún queda mucho por revisar, me permito dar un pequeño listado de especies (200) con nuevas citas para las provincias españolas y los distritos portugueses, hasta donde llega ahora mi conocimiento. Las citas están basadas en ejemplares estudiados por mí. A continuación de esta adición, se expone el elenco completo.

### Material y métodos

En la elaboración de esta lista sólo se han utilizado fuentes aceptables como publicadas por el Código Internacional de

Nomenclatura Zoológica; se ha evitado utilizar la llamada “literatura gris”, usualmente de difícil procura, como son informes privados o semipúblicos realizados por cuenta de entidades conservacionistas o de la Administración, tesis doctorales, tesinas y trabajos de fin de máster, etc. Sólo se les ha prestado atención si presentan un ISBN.

La lista sigue un orden alfabético estricto en cada categoría, excepto en las familias, que siguen un orden filogenético. Con respecto a la de 2002, se han corregido varias fechas y autorías. Se han añadido las subespecies que, en algunos casos, faltaban.

#### Símbolos utilizados:

- especie/subespecie citada.
- especie/subespecie *inquirenda*.
- ~ nombre usado como válido en la lista preliminar de 2002, actualmente considerado o un sinónimo o no aplicable a ese taxon (identificación errónea).
- (+) especie/subespecie añadida desde la lista preliminar de 2002 o pasada de *inquirenda* a citada.
- (-) especie/subespecie pasada de citada a *inquirenda* o añadida al listado con cierta prevención.
- (◀) especie/subespecie transferida a este género/subgénero desde la lista preliminar de 2002.

Los cambios de categoría (especie a subespecie, subespecie a especie, etc.), de autor o de fecha no han sido marcados.

Las citas tienen el siguiente orden de datos: País/Provincia (para España)/Distrito (para Portugal)/Isla (para las Baleares, con las siguientes unidades: Cabrera, incluye todo el archipiélago, Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca). Para Portugal se prefiere la división administrativa actual antes que la antigua división en regiones históricas que usa, por ejemplo, *Flora Ibérica*, y que están ya obsoletas. A continuación se expone: nº de ejemplares, localidad, municipio (si fuese preciso), coordenadas (geográficas o UTM), altitud, fecha de captura (día-mes [en números romanos]-año), colector (usualmente entre paréntesis) y depositario (en acrónimos). Algunas de estas indicaciones pueden faltar, dependiendo de los datos obtenidos de las etiquetas o del remitente.

Los acrónimos usados para los depositarios son:

- AH – Col. Adolphe Hoffmann, Muséum National d’Histoire Naturelle, París, Francia.
- AP – Col. Attila Podlussány, Budapest, Hungría.
- AS – Col. Artur Serrano, Lisboa, Portugal.
- AV – Col. Amador Viñolas i Saborit, Barcelona.
- AZ – Col. Miguel Ángel Alonso Zarazaga, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid.
- BZ – Col. Javier Blasco Zumeta, Pina de Ebro, Zaragoza.
- CACM – Cátedra de Artrópodos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- CK – Col. Rudolf Köstlin, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stuttgart, Alemania.
- CZMu – Cátedra de Zoología de la Universidad de Murcia, Murcia.
- DZGr – Departamento de Zoología, Universidad de Granada, Granada.
- EEZA – Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), Almería.
- FC – Col. José Antonio Fernández Cortés, Málaga.
- FO – Col. Fernando Ochotorena, Murcia.
- HWi – Col. Herbert Winkelmann, Berlín, Alemania.
- KS – Col. Karel Schön, Litvínov, República Checa.
- LSc – Col. Laurent Schott, La Chapelle-Saint-Luc, Francia.

- MAM – Col. Mario Arcas Martín, Cáceres.
- MB – Col. Manuel Baena, Córdoba.
- MNCN – Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid – Col. Ibérica.
- MNHN – Muséum National d’Histoire Naturelle, París, Francia.
- MS – Col. Miguel Soler, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
- MZB – Museo de Zoología de Barcelona, Barcelona.
- NZAC – New Zealand Arthropod Collection, Landcare Research, Auckland, Nueva Zelanda.
- PB – Col. Pablo Bahillo de la Puebla, Baracaldo, Vizcaya.
- PP – Col. Piet Poot, Naturalis, Leiden, Países Bajos.
- RB – Col. Roman Borovec, Praga, República Checa.
- TY – Col. Tomás Yélamos, Barcelona.
- UAM – Universidad Autónoma de Madrid, Depto. de Zoología, Tres Cantos, Madrid.
- UO – Departamento de Biología Animal, Universidad de Oviedo, Oviedo.
- VC – Col. Antonio J. Velázquez de Castro, Valencia.
- XV – Col. Xavier Vázquez Albalade, Barcelona.

#### Nuevas citas

***Cimberis (Cimberis) attelaboides*** (Fabricius, 1787)  
Madrid: 2 ej., Las Sierras, Garganta de los Montes, Canencia (L. Gil), *P[inus] sylvestris*, AZ. Nueva para la provincia.  
Se ha citado de las provincias de La Rioja, Lérida y Segovia.

***Anthribus fasciatus*** (Forster, 1770)  
Granada: 1 ej., Venta Palma, Sierra Tejada, Cara Norte, 10-VI-[19]93 (Bastazo – Vela), AZ. Nueva para la provincia.  
Jaén: 1 ej., Fuente Bermejo, Iruela, S<sup>a</sup> Cazorla, 19-V-[19]53 (Mateu – Cobos), AZ; 1 ej., id., EEZA. Nueva para la provincia.  
Málaga: 1 ej., Cortijo Quejigales, S<sup>a</sup> Ronda, 22-V-[19]82 (M.A. Alonso Z.), AZ. Nueva para la provincia.  
Citada de las provincias de Lérida y Zaragoza y del distrito de Vila Real.

***Anthribus nebulosus*** Forster, 1770  
Jaén: 1 ej., Fte. Bermejo, Iruela, S<sup>a</sup> Cazorla, Mateu-Cobos coll., 19-V-[19]53, EEZA. Nueva para la provincia.  
Se ha citado de las provincias de Lérida y Navarra y del distrito de Guarda.

***Enedreytes hilaris*** Fähræus, 1839  
Barcelona: 1 ej., Sant Marçal, Montseny, 23-IX-1989 (J. de Ferrer), AZ. Nueva para la provincia.  
Gerona: 1 ej., Riells del Montseny, 9-IX-[1984] (T. Yélamos), AZ. Nueva para la provincia.  
Se ha citado de las provincias de Cádiz y Lérida, y de las islas de Mallorca y Menorca.

***Platyrhinus resinosus*** (Scopoli, 1763)  
Huesca: 1 ej., Valle de Ordesa (Hispania), VII-1943 (J. M. Dusmet), EEZA. Nueva para la provincia.  
Se ha citado de las provincias de Barcelona, Guipúzcoa, La Rioja, Lérida, Navarra y Zaragoza.

***Trigonorhinus areolatus*** (Boheman, 1845)  
Málaga: 1 ej., Sierra Blanca, Ojén, 1000m, 20-IV-[19]86, 30SUF3149 (Bastazo & Vela), AZ. Nueva para la provincia.  
Sevilla: 10 ej., S<sup>a</sup> [del] Tablón, Pruna, 29-V-1986 (M. Baena), *Scolymus* sp., AZ. Nueva para la provincia.  
Especie citada de las provincias de Cádiz, Cuenca, Granada, Madrid y Teruel, y del distrito de Portalegre.

***Bruchela parallela*** (Küster, 1848)

Lisboa: 1 m., Serra de Monsanto, 23-VI-1980 (A. Serrano) (n° 5598), AS. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Cádiz y Málaga y del distrito de Vila Real.

***Auletobius (Canarauletes) maroccanus*** Hoffmann, 1953

Cádiz: 1 ej., Tarifa, IV-1990 (P. Poot), PP. Nueva para la provincia.

Previamente citado de la provincia de Almería.

***Mesauletobius pubescens*** (Kiesenwetter, 1852)

Salamanca: 1 ej., El Casarito, 30-IV-1989 (Nieves), MNCN. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Gerona, Guadalajara, Huelva, León, Lérida, Madrid, Pontevedra, Segovia, Soria, Teruel, Valencia y Zaragoza, la isla de Mallorca y los distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Setúbal y Vila Real.

***Lasiorynchites (Lasiorynchites) cavifrons*** (Gyllenhal, 1833)

Barcelona: 2 ej., Collsuspina, 23-V-[19]76 (T. Yélamos), AZ. Nueva para la provincia.

Citada de las provincias de Gerona y Lérida.

***Tatianaerhynchites aequatus*** (Linnaeus, 1767)

Gerona: 1 ej., Planoles, 1200 m, 27-V-[19]76 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Álava, Albacete, Badajoz, Barcelona, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Lérida y Madrid y de los distritos de Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto y Setúbal.

***Apion haematodes haematodes*** Kirby, 1808

Palencia: 1 ej., 2 Km S Puerto de Piedrasluengas, 1200 m, 6-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Meia Praia, Lagos, 30-VIII-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Portalegre: Marvão, 3-VI-[19]78 (F. Lopes), AS. Nueva para el distrito.

Viana do Castelo: 1 ej., Castro Laboreiro, 4-VI-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Vila Real: 2 ej., Tourem, 5-VI-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada de las provincias de Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Segovia, Valencia y Zaragoza, las islas de Mallorca y Menorca, y los distritos de Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Setúbal y Viseu.

***Aizobius robustirostris*** (Desbrochers des Loges, 1870)

La Coruña: 1 m, Santiago de C[ompostela] (M. Velado), ex Col. Pérez Arcas, MNCN; 1 h, Coruña (Bolívar) (*Apion sedi* Germ.), MNCN. Nueva para la provincia.

León: 2 h, Lacedana [= Laciaña], MNCN. Nueva para la provincia.

Vila Real: 1 ej., Chaves, 1-III-1976, Col. Passos de Carvalho (Serrano #11). Primera cita exacta para Portugal.

La mención de España recogida en Alonso-Zarazaga *et al.* (2017) corresponde a estas localidades. La mención de Portugal sin más detalle es de Wanat (2007).

***Cistapion cyanescens*** (Gyllenhal, 1833)

Málaga: 1 m., 1 h., Ctra. de los Montes, Venta El Boticario, 2-V-[19]80 (Fernández Cortés), FC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Almería, Badajoz, Barcelona, Granada, Guadalajara, León, Madrid, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Valencia, y de los distritos de Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Lisboa, Setúbal y Viseu.

***Hoplopodapion ferrerii*** (Alonso-Zarazaga, 1983)

Málaga: 1 ej., Marbella, Río Verde, 17-V-[19]68 (E. Ulbrich), CK. Nueva para la provincia.

Conocida sólo de la provincia de Cádiz.

***Perapion (Perapion) ilvense*** (Wagner, 1905)

Évora: 1 h., Cabeção, 9-VII-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Faro: 1 h., Meia-Praia, Lagos, 30-VIII-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Ávila, Cádiz, Ciudad Real, Granada y Madrid, y de Portugal sin más detalle por Flach (1908).

***Perapion (Perapion) marchicum*** (Herbst, 1797)

Setúbal: 1 ej., Chaminé (Cercal [do Alentejo]), 5-V-1976, Col. Passos de Carvalho (AS #15). Nueva para el distrito.

Citada anteriormente para las provincias de Ávila, Granada, Lérida, Madrid y Málaga, las islas de Mallorca y Menorca, y el distrito de Beja.

***Phrissotrichum (Schilskyapion) perrisii*** (Wencker, 1858)

Braga: 1 ej., Covide, 4-VI-[19]80 (A. Serrano), AS; 2 hh., São João do Campo [= Campo do Gerês], 4-VI-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Santarém: 1 ej., Vale de Cavalos, 29-III-1976, Col. Passos de Carvalho (AS #8). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Asturias, Barcelona, Cádiz, León, Lugo y Pontevedra, y los distritos de Coimbra, Setúbal, Vila Real y Viseu.

***Pseudaplemonus chevrolati*** (Gyllenhal, 1833)

Madrid: Valdemanco-1, Guadarrama, 25-VIII-[19]91 (García & Sanz), UAM. Nueva para la provincia.

Se ha citado de la provincia de Cádiz y de los distritos de Leiria y Viseu.

***Aspidapion (Aspidapion) radiolus*** (Marsham, 1802)

Ciudad Real: 1 ej., Sierra Madrona, 22-VI-[19]83 (Velázquez de Castro), VC. Nueva para la provincia.

Setúbal: 1 h., Fonte do Veado, Serra da Arrábida, 1-X-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Salamanca, Teruel, Valencia y Zaragoza, las islas de Cabrera, Mallorca y Menorca, y los distritos de Beja, Faro, Lisboa y Portalegre.

***Catapion pubescens*** (Kirby, 1811)

Faro: 1 ej., Meia Praia, Lagos, 30-VIII-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Setúbal: 1 m., Sines, 16-VI-[19]79 (A. Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Granada, Lérida, Madrid y Navarra y de la isla de Mallorca.

***Catapion seniculus*** (Kirby, 1808)

Faro: 1 h.?, Meia Praia, Lagos, 30-VIII-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Ávila, Badajoz, Cádiz, Gerona, Huesca, León, Lérida, Madrid, Málaga, Tarragona y Zaragoza, de la isla de Mallorca y del distrito de Guarda.

***Acentrotypus brunnipes*** (Boheman, 1839)

Valencia: 1 m., Millares, 31-V-[19]32 (sub *Apion frater* Desbr.), CACM. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Salamanca y Zaragoza, de la isla de Mallorca y del distrito de Vila Real.

***Ceratapion (Acanephodus) parens*** (Desbrochers des Loges, 1870)

Teruel: 3 ej., Santa Eulalia (Báguena), CACM. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Badajoz y Madrid y de los distritos de Faro y Lisboa.

***Diplapion squamuliferum*** (Desbrochers des Loges, 1891)

Huelva: 1 ej., Matalascañas, 9-IX-[19]84 (Ester Izquierdo), CACM. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de la provincia de Zaragoza, pero más común de lo que parece en la zona mediterránea ibérica, confundida con otras especies del género.

***Exapion fuscirostre fuscirostre*** (Fabricius, 1775)

Huesca: 2 ej., Col de Fades, Castejón de Sos, 1400 m, 13-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Navarra: 1 ej., 1 Km SE Alto de Laza, 1050 m, 7-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia. Palencia: 1 ej., 2 Km S Puerto de Piedrasluengas, 1200 m, 6-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, Granada, La Coruña, Lérida, Madrid, Murcia, Orense, Segovia y Zaragoza, las islas de Cabrera y Mallorca, y los distritos de Aveiro, Bragança, Guarda, Lisboa, Vila Real y Viseu.

***Exapion putonii*** (C. Brisout de Barneville, 1866)

Palencia: 1 ej., 2 Km S Puerto de Piedrasluengas, 1200 m, 6-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Santander: 5 ej., Tarna, 3,5 Km N Potes, 3-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Ávila, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Segovia y Valencia.

***Exapion wagnerianum*** Schatzmayr, 1925

Vila Real: 1 ej., Chaves, 1-III-1976 (Col. Passos Carvalho) (Serrano #12), AS. Nueva para Portugal.

Citada con anterioridad de la provincia de León. Especie rarísima.

***Kalcapion semivittatum semivittatum*** (Gyllenhal, 1833)

Setúbal: 1 ej., Serra da Arrábida, 25-VIII-[19]78 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Jaén, León, Málaga y Valencia, las islas de Cabrera, Mallorca y Menorca, y los distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Viana do Castelo y Viseu.

***Pseudapion rufirostre*** (Fabricius, 1775)

Murcia: 4 ej., La Arrixaca, 13-III-1983, #16 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Faro: 1 m., 1 h., Vila Moura, 9-VI-[19]81 (A. Serrano), AS; 1 h., Torrinha (Caldas de Monchique), 15-V-1982 (Artur Serrano), AS (8881). Nueva para el distrito.

Setúbal: 1 m., 2 hh., Sines, 14-IV-[19]79 (A. Serrano), AS; 2 hh., S. Torpes, 4-IV-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Lérida, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Valencia y Zaragoza, las islas de Mallorca y Menorca, y los distritos de Braga, Guarda, Lisboa y Portalegre.

***Eutrichapion (Cnemapion) vorax*** (Herbst, 1797)

Santarém: 1 ej., Vale de Cavalos, 29-III-1976, Col. Passos Carvalho (AS #8). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Granada, Jaén, León, Lérida, Madrid, Málaga, Orense, Salamanca, Segovia, Valencia y Zaragoza, la isla de Mallorca y los distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vila Real y Viseu.

***Hemitrichapion (Lotapion) wagneri*** (Flach, 1906)

Setúbal: 1 h., S. Torpes, 4-IV-[19]80 (A. Serrano), AS; id., 1 h., AZ. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Cádiz y Gerona y del distrito de Lisboa.

***Holotrichapion (Apiops) pisi*** (Fabricius, 1801)

Burgos: 4 ej., Medina de Pomar, 650 m, V-1986 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Teruel: 1 ej., Torres de Albarracín, 15-IX-[19]81 (Fernández Cortés), FC. Nueva para la provincia.

Évora: 1 ej., Torf. Vila Viçosa, 25-IV-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Santarém: 1 ej., Benavente, Sto. Estêvão, 21-IV-[19]78 (L. Mendes), AS; 1 ej., Vale de Cavalos, 29-III-1976, Col. Passos de Carvalho (Serrano #9). Nueva para el distrito.

Setúbal: 1 ej., Chaminé (Cercal [do Alentejo]), 5-V-1976, Col. Passos de Carvalho (Serrano #17). Nueva para el distrito. Citada anteriormente de las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, la isla de Mallorca y el distrito de Lisboa.

***Holotrichapion (Holotrichapion) saturnium*** (Normand, 1937)

Lisboa: 1 m., Serra de Monsanto, 23-VI-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Citada con anterioridad de la provincia de Málaga bajo el nombre incorrecto de *Apion ononis*.

***Holotrichapion (Legaricapion) gracilicolle*** (Gyllenhal, 1839)

Málaga: 1 h., Ctra. de los Montes, Venta El Boticario, 2-V-[19]80 (Fernández Cortés), FC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Albacete, Ávila, Cádiz, Castellón, Madrid, Salamanca y Sevilla, y de los distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre y Setúbal.

***Oryxolaemus scabiosus*** (Weise, 1889)

Vila Real: 1 ej., Chaves, 1-III-1978, Col. Passos de Carvalho (Serrano #7), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Barcelona, Cádiz, Gerona, La Coruña, León, Málaga y Valencia, de la isla de Mallorca y del distrito de Évora. Es relativamente común sobre sus plantas patrones, los erguones del género *Calicotome* (Fabaceae).

***Pirapion immune*** (Kirby, 1808)

Vila Real: 2 ej., Chaves, 1-III-1976, Col. Passos de Carvalho (Serrano #18), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Guipúzcoa, Lérida, Lugo, Madrid, Pontevedra, Salamanca, Segovia y Valencia y de los distritos de Aveiro, Braga, Guarda y Lisboa.

***Stenopterapion (Cobosiotherium) cantabricum*** (Desbrochers des Loges, 1869)

Santander: 6 ej., Tarna, 3,5 Km N Potes, 3-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Ávila, León, Madrid, Orense, Pontevedra, Salamanca y Segovia.

***Stenopterapion (Cobosiotherium) dubium*** (Desbrochers des Loges, 1896)

Granada: 1 ej., S<sup>a</sup> Nevada, Pampaneira, 1100 m (Meregalli), KS. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Jaén y Málaga.

***Stenopterapion (Cobosiotherium) scutellare*** (Kirby, 1811)

Vila Real: 1 h., Tourém (= Tourim), Serra de Gerês, 6-I-[19]81 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Asturias, Guipúzcoa y Pontevedra, y de los distritos de Braga, Lisboa y Viana do Castelo. Las citas de Cádiz de Rosenhauer (1856) corresponden en realidad a *Perapion (Perapion) ilvense* (material controlado) y la cita de Granada de Dieck (1870) debe referirse con toda seguridad a *S. (C.) dubium*, descrito con posterioridad.

***Stenopterapion (Stenopterapion) tenue*** (Kirby, 1808)

Leiria: 1 ej., Alcobaça, Ganihos, 24-VI-1987 (Fernanda N. Ribeiro). Nueva para Portugal.

Setúbal: 1 ej., Quinta da Serra, Serra da Arrábida, 5-VI-[19]81 (A. Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Barcelona, Cádiz, Granada, Huesca, Lérida, Madrid, Málaga y Valencia, y de la isla de Mallorca.

***Protapion assimile assimile*** (Kirby, 1808)

Beja: 1 ej., Vidigueira, 8-VII-1978, Col. Passos Carvalho (Serrano #5), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Orense, Sevilla, Valencia y Vizcaya, de la isla de Mallorca y de los distritos de Portalegre y Porto.

***Protapion interjectum interjectum*** (Desbrochers des Loges, 1895)

Alicante: 1 m., 1 h., Alcoy (Col. Báguena), CACM. Nueva para la provincia.

Castellón: 1 h., Chovar (Col. Báguena), CACM. Nueva para la provincia.

Granada: 2 mm., 1 h., El Charcón, Sierra Nevada, VI-[19]80 (Fernandez Cortés), FC. Nueva para la provincia.

Teruel: 6 hh., Santa Eulalia (Col. Báguena), CACM. Nueva para la provincia.

Valencia: 1 m., Millares, 6-IV-[19]32 (L. Báguena), CACM. Nueva para la provincia.

Beja: 2 ej., Vidigueira, 5-VII-1978, Col. Passos Carvalho (Serrano #4 y 16), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de Andorra, de las provincias de Ávila, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huesca, León, Madrid, Málaga, Segovia y Zamora, y los distritos de Évora y Lisboa.

***Protapion nigrirtarse*** (Kirby, 1808)

Cádiz: 1 h., Vejer, (Col. Báguena) (A. nigrirtarse det. Bág.), CACM. Nueva para la provincia.

Salamanca: 1 h., El Casarito, 30-IV-1989 (Nieves), MNCN. Nueva para la provincia.

Beja: 5 ej., Vidigueira, 5-VII-1978, Col. Passos Carvalho (Serrano #16). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Granada, Guipúzcoa, Huesca, Jaén La Coruña, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona y Vizcaya, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal y Vila Real.

***Protapion schoenherri*** (Boheman, 1839)

Huesca: 1 h., Col de Fades, Castejón de Sos, 1400 m, 13-VI-1989 (Syrett, Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Ávila, Madrid y Segovia.

***Protapion trifolii*** (Linnaeus, 1768)

Cantabria: 1 ej., Santander, 19-VII-1987 (Velázquez de Castro), VC. Nueva para la provincia.

Setúbal: 1 ej., Sines, 15-VI-[19]79 (A. Serrano), col. Serrano; São Torpes, 6-IV-[19]80 (A. Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Viana do Castelo: 1 ej., Vilela-Arcos de Valdevez, 17/19-III-[19]78 (L. Mendes), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Álava, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Gerona, Huesca, Jaén, León, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Évora y Vila Real. Oliveira (1890b: 834) menciona la especie de todo Portugal septentrional hasta Bussaco (actualmente Buçaco), pero es muy probable que la especie llegue hasta la costa sur, como ocurre en España.

***Betulapion simile simile*** (Kirby, 1811)

Vila Real: 1 h., Tourém (= Tourim), Serra de Gerês, 5-VI-[19]80 (A. Serrano), n° 5351, AS. Nueva para el distrito.

Especie citada de las provincias de Granada y Huesca y del distrito de Guarda. Cobos (1950) la citó de los alrededores de Málaga y Torres Sala (1962) de la Dehesa de la Albufera de Valencia, localizaciones inverosímiles ante la ausencia de su planta patrón, *Betula pubescens* Ehrh. (Betulaceae), lo que permite sospechar identificaciones erróneas. Queda por averiguar si la especie es capaz de desarrollarse sobre la otra especie ibérica, *B. pendula* Roth.

***Corimalia postica*** (Gyllenhal, 1838)

Faro: 1 ex., Tavira, Algarve, 12-VI-1981 (Artur Serrano), AS (7552). Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Cádiz, Castellón, Jaén, Madrid y Valencia.

***Dieckmanniellus chevrieri*** (Boheman, 1845)

Cáceres: 1 ej., Arroyo de Jumadiel (S. Brozas), 325 m, 20-VI-1991 (Wrase-Winkelmann-Klöck). Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Álava, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Orense, Sevilla y Valencia, de la isla de Menorca, y de los distritos de Aveiro, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal y Viseu.

***Dieckmanniellus nitidulus*** (Gyllenhal, 1838)

Setúbal: 1 ex., S. Torpes, 25-III-1978 (Artur Serrano), AS (589); 5 ex., S. Torpes, 4-IV-1980 (Artur Serrano), AS (4431); 2 ex., Arrábida, 30-VII-1979 (Artur Serrano), AS (3314); 2 ex., Arrábida, 8-VI-1979 (Artur Serrano), AS (2812); 3 ex., Arrábida, 14-VIII-1978 (Artur Serrano), AS (3381); 2 ex., Arrábida, 19-VII-1978 (Artur Serrano), AS

(3376); 1 ex., Sines, 15-VI-1979 (Artur Serrano), AS (3103); 1 ex., Sra. Arrábida, 29-VI-1978 (Artur Serrano), AS (4240). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Orense, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vizcaya, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Castelo Branco, Faro, Lisboa y Portalegre.

***Nanophyes brevis*** Boheman, 1845 *s.l.*

Évora: 2 ex., Pavia-Vimieiro, km. 3, 9-VII-1980 (Artur Serrano), AS (5505). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Cádiz, Ciudad Real, Lérida y Valencia, y los distritos de Coimbra y Lisboa.

***Nanophyes brevis bleusei*** Pic, 1900

Faro: 1 m., Barragem do Arade, 12/13-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para Portugal.

Citada anteriormente sólo de las provincias de Cádiz y Madrid.

***Nanophyes rubricus*** Rosenhauer, 1856

Leiria: 1 m., Alcobaça, Ganilhos, 24-VII-1987 (Fernanda N. Ribeiro leg.), AS. Nueva para Portugal.

Se ha citado de las provincias de Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Gerona, Lérida, Madrid, Málaga y Salamanca, y de las islas de Mallorca y Menorca.

***Pericartiellus durieui*** (Lucas, 1846)

Faro: 3 ej., Azinhal, [Castro Marim], 14-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Asturias, Ávila, Badajoz, Madrid, Málaga, Salamanca y Valencia, y de los distritos de Braga, Castelo Branco, Portalegre, Porto, Setúbal y Vila Real.

***Pericartiellus flavidus*** (Aubé, 1850)

Granada: 1 m, Grenade, Espagne, R. Obr. & L. Bl., Juillet 1879 (MNHN, Coll. R. Oberthür). Nueva para la provincia. Citada con anterioridad de las provincias de Ciudad Real y Madrid, y de la isla de Mallorca.

***Eremobaris picturata*** (Ménétriés, 1849)

Lisboa: 1 ej., Lisboa, IX-1979 (Artur Serrano), AS (3759). Nueva para Portugal.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Cádiz, Castellón, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

***Labiaticola teruelensis*** (Hustache, 1927)

Madrid: Guadarrama, Monterrey, 16-VII-1992 (M.J. Sanz leg.), UAM. Nueva para la provincia.

Conocida hasta ahora tan sólo de la localidad tipo en la provincia de Teruel.

***Malvaevora tímida tímida*** (Rossi, 1792)

Granada: 1 ej., Granada, c. cementerio, 15-V-[19]78 (M. Zafra), DZGr; 1 ej., Silla del Moro, 5-V-[19]78, DZGr; 1 ej., P[antano de]. Cubillas, 30-IV-[19]78, DZGr; 1 ej., id., 4-VI-[19]78, DZGr; 1 ej., id., 4-VI-[19]78 (M. Villar), DZGr. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Teruel y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Beja, Coimbra, Leiria y Faro.

***Maurobaris spoliata*** (Boheman, 1836)

Faro: 1 ej., Castro Marim, 2-IV-[19]82, #9307 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Alicante, Barcelona, Córdoba, Gerona y Málaga, de la isla de Mallorca y del distrito de Lisboa.

***Melanobaris laticollis*** (Marsham, 1802)

Murcia: Revolvedores, 3-II-1985 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Barcelona, La Coruña, Lérida, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Teruel y Vizcaya, de la isla de Mallorca y de los distritos de Bragança, Coimbra, Guarda y Vila Real.

***Melanobaris quadraticollis quadraticollis*** (Boheman, 1836)

Murcia: 1 ej., Revolvedores, 3-II-1985 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Cádiz, Ciudad Real, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y de los distritos de Faro, Leiria, Lisboa y Portalegre.

***Brachycerus barbarus lateralis*** Gyllenhal, 1833

Cáceres: 1 ej., Segura de Toro, 10-VIII-1981, 700 m (M. Arcas Martín), MAM; 1 ej., id., 24-III-1986, 560 m (M. Arcas Martín), MAM. Nuevo para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, y de los distritos de Beja, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa y Setúbal. Las citas de las islas de Cabrera y Mallorca (Tenenbaum, 1915) pueden referirse a *B. barbarus ramosus* L.W. Schaufuss, 1882, subespecie no reconocida por algunos (incluido Alonso-Zarazaga *et al.*, 2017), a pesar de las pequeñas pero constantes diferencias discernibles entre los ejemplares.

***Tanysphyrus lemnae*** (Fabricius, 1792)

Vizcaya: 3 ej., Bilbao (Uhagón), MNCN. Nueva para España.

Especie de amplia distribución en Francia, por lo que su presencia en la zona cantábrica peninsular podía esperarse. Se captura con facilidad sacando las *Lemna* del agua con una red de plancton o similar.

***Ceutorhynchus aeneicollis*** Germar, 1823

Toledo: 1 h., Embalse Guajaro, Argés, 4-IV-1996 (J. de Ferrer), MNCN. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Madrid y Zaragoza y de la isla de Mallorca.

***Ceutorhynchus assimilis*** (Paykull, 1792)

Faro: 6 ej., Castro Marim, 28-IV-[19]82, #9151 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Asturias, Barcelona, Castellón, Gerona, Guipúzcoa, La Coruña, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Orense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Teruel, Valencia y Zaragoza, de la isla de Mallorca, y de los distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Porto y Vila Real.

***Ceutorhynchus gallorhenanus*** (F. Solari, 1949)

Murcia: 2 ej., S<sup>a</sup> Carrascoy, Las Llanas, 19-III-1983, #19 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Castro Marim, 28-IV-[19]82, #9155 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad para la provincia de Madrid y para Portugal, sin más detalle (Colonnelli, 2004).

***Ceutorhynchus lepriouri*** (C. Brisout de Barneville, 1881)

Almería: 1 ej., Paterna del Río, Alpujarras, VI-[19]57 (Co-

bos), EEZA; 1 ej., Canjáyar, 1-V-[19]83 (Cobos), EEZA. Nuevo para la provincia.

Anteriormente sólo citada de la provincia de Sevilla.

***Ceutorhynchus pallidactylus*** (Marsham, 1802)

Granada: 1 ej., P[antano de]. Cubillas, 4-VI-[19]78 (M.A. Conesa), DZGr. Nueva para la provincia.

Tarragona: 3 ej., Campredò, Tortosa, 18-IV-[19]84 (Vázquez), XV. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Alicante, Badajoz, Gerona, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla, Teruel, Valencia, Valladolid y Zaragoza, de la isla de Mallorca, y de los distritos de Castelo Branco, Coimbra, Évora, Portalegre y Vila Real.

***Ceutorhynchus pyrrhorhynchus*** (Marsham, 1802)

Andorra: 1 m., Pal, Xixerella, 26-VI-1987 (Podlussány), AP. Nueva para Andorra.

Faro: 1 ej., Castro Marim, 28-IV-[19]82, #9154 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, León, Lérida, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla, Teruel y Zaragoza, y del distrito de Évora.

***Ceutorhynchus rhenanus*** (Schultze, 1895)

Ciudad Real: 1 ej., Luciana (Alonso-Zarazaga), AZ. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad solo de la provincia de Madrid.

***Ceutorhynchus sardeanensis*** Schultze, 1903

Sevilla: 1 ej., Finca Alguaciles, Crtra. Las Cabezas-Montellano, Km 12, Utrera, 5-V-[19]81. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Ciudad Real, Madrid, Palencia y Zaragoza.

***Coeliodes ilicis*** (Bedel, 1885)

Setúbal: 3 ej., Arrábida, 12-III-[19]79 (Serrano) #1939, AS; 2 ej., id., AZ; 1 ej., Castelo de Mouros, Arrábida, 10-III-[19]78 (Serrano) #440, AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, Madrid, Málaga, Orense, Salamanca, Tarragona, Toledo y Zaragoza, y del distrito de Vila Real.

***Drupenatus nasturtii*** (Germer, 1823)

Gerona: 7 ej., Río Ter, Girona, 2-V-2009 (Dani Boix), MNCN. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Almería, Granada, Málaga y Valencia, y de las islas de Mallorca y Menorca.

***Ectamnogaster caviventris*** (Schultze, 1897)

Málaga: 1 m., Torrequebrada, Benalmádena, 18-IV-[19]79 (Alonso-Zarazaga), AZ; 1 m., id., EC. Nueva para la provincia.

Citada solamente de la provincia de Cádiz y de Portugal, sin más datos (Colonnelli, 2004).

***Hadroplontus trimaculatus*** (Fabricius, 1775)

Jaén: 1 ej., Mesa del Poyo del Manquillo, Sierra de Cazorla, VI-[19]62 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Ávila, Barcelona, Granada, Lérida, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

***Mogulones borraginis*** (Fabricius, 1792)

Alicante: 1 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Granada y Málaga, y del distrito de Guarda.

***Nedyus quadrimaculatus*** (Linnaeus, 1758)

Segovia: 1 ej., El Espinar, VII-[19]65 (M. Ortego), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Álava, Barcelona, Gerona, Lérida, Madrid, Orense y Teruel, y de los distritos de Guarda y Vila Real.

***Prisistus biscutellatus*** (Chevrolat, 1859)

Almería: 2 ej., Lújar (Cobos), 21-VI-[19]66, EEZA; 1 ej., Paterna del Río (Cobos), VI-[19]57, EEZA. Nueva para la provincia.

León: 3 ej., Truchas, VII-[19]59 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Madrid, Salamanca y Segovia.

***Stenocarus ruficornis*** (Stephens, 1831)

Almería: Paterna del Río, Alpujarra, VI-[19]57 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Burgos, Granada, Lérida, Madrid, Teruel, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca y del distrito de Vila Real.

***Trichosirocalus dawsoni*** (C. Brisout de Barneville, 1869)

Setúbal: 1 ej., Grândola, 19-X-[19]99, trampa de intercepción en copa de Q. suber, 29SNC3818 (A. Serrano), AS. Primera cita de una localidad para Portugal.

Citada con anterioridad de las provincias de Ciudad Real y Pontevedra, y de Portugal sin más detalle (Colonnelli, 2004).

***Trichosirocalus histrix*** (Perris, 1852)

Cádiz: 1 ej., San Roque, 31-V-[19]71 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Badajoz y Madrid, y de Portugal sin más detalle (Colonnelli, 2004).

***Mononychus punctumalbum*** (Herbst, 1784)

Lérida: Seròs, riu, 22-V-[19]82 (T. Yélamos), TY, un fenotipo *salviae*. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Asturias, Cádiz, Cuenca, La Coruña, Madrid y Valencia, y de los distritos de Coimbra, Faro, Lisboa y Vila Real.

***Cossonus (Cossonus) linearis*** (Fabricius, 1775)

Vizcaya: Emb. Zadorra, Ozaeta, 15-V-[19]86, (J. M. Avila), AZ. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Burgos, León, Lérida y Segovia, y de las islas Baleares, sin más detalle (Folwaczny, 1973).

***Cotaster uncipes*** (Boheman, 1838)

Huesca: 13 ej., Selva de Oza, VIII-[19]63, VII-[19]64 (González, Español), MNCN. Primera indicación exacta para España.

Anteriormente, Diotti *et al.* (2015) la habían citado de Andorra y de los Pirineos occidentales españoles, sin detallar.

***Hexarthrum capitulum*** (Wollaston, 1858)

Vizcaya: 3 ej., Bilbao, vigas en edificio húmedo y sin calefacción (Estela García), AZ. Nueva para la provincia.

Citada solamente de la provincia de Zaragoza, parece tratarse de una especie de carcoma no muy común en vigas en las condiciones mencionadas, aunque se ha encontrado en otras ciudades españolas.

***Pselactus spadix spadix*** (Herbst, 1795)

Jaén: 1 ej., La Iruela, Sierra de Cazorla (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Tarragona: Les Cases d'Alcanar, 14-III-[19]82 (T. Yélamos), TY (identificado como ssp. *celatus*). Nueva para la provincia. Se ha citado de las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Cuenca y Valencia, de las islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, y del distrito de Coimbra.

***Pseudophloeophagus truncorum*** (Stephens, 1831)

Asturias: 1 ej., Robledo de Anayo, Piloña, 10-XI-2016 (M. Toribio), MNCN\_Ent 197826. Nueva para la provincia. Citada anteriormente de la provincia de Guipúzcoa y del distrito de Lisboa.

***Stenoscelis (Stenoscelis) submuricata*** (Schoenherr, 1832)

Lérida: 1 ej., Seròs, 6-VI-[19]87 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia. Citada con anterioridad de las provincias de Ciudad Real, La Rioja, Madrid y Málaga.

***Rhyncolus (Rhyncolus) elongatus*** (Gyllenhal, 1827)

Gerona: Sta. Coloma de Farners, 10-VII-[19]87 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia. Se ha citado de las provincias de Barcelona, Jaén, La Rioja, Lérida, Madrid y Málaga.

***Acalyptus carpini*** (Fabricius, 1792)

Huesca: 3 ej., Valle de Ordesa, L. Bágüena (Exped. Inst. Entomol. 11/13-VII-1943), MNCN. Nueva para la provincia.

Especie citada para los Pirineos centrales sin detallar si son los españoles o los franceses (Kiesenwetter, 1852) bajo el sinónimo *Acalyptus rufipennis* Gyllenhal, 1835. Esta cita confirma su presencia a ambos lados de la cadena.

***Anthonomus (Anthonomus) rubi*** (Herbst, 1795)

Braga: 1 ej., Serra do Gerês, 5-VIII-[19]79 (Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Viana do Castelo: 2 ej., Soajo, 4-VI-[19]80 (Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Vila Real: 2 ej., Est<sup>a</sup> de Carris (Gerês), 3-VI-[19]80 (Serrano), AS; 2 ej., Tourém (Gerês), 5-VI-[19]80 (Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Barcelona, Huesca, León, Lérida, Navarra, Pontevedra, Vizcaya y Zaragoza.

***Cionus hortulanus*** (Geoffroy, 1785)

Huesca: 1 h., Boreal de Linza, Pirineos, 7-VI-1987 (Podlussány), AP. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Asturias, Barcelona, Lérida, Madrid, Segovia, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

***Archarius (Archarius) pyrroceras*** (Marsham, 1802)

Almería: 4 ej., Paterna del Río, VI-[19]57 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Huelva: 1 ej., Reserva Doñana, 14/17-IV-[19]66 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Barranco do Velho, 13-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, Gerona, La Coruña, La Rioja, Madrid, Orense, Pontevedra, Tarragona y Valencia, de la isla de Mallorca y del distrito de Coimbra. El ejemplar portugués pertenece a la fma. *minus* Rey, 1895, que merece un estudio más profundo,

dado que su morfología hace pensar más bien en una especie o subespecie distinta.

***Curculio elephas*** (Gyllenhal, 1835)

Albacete: Albacete, 4-VIII-1982, #20 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Castro Marim (Esteveira), 14/16-IX-[19]83, #11287 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Asturias, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Huelva, Jaén, La Coruña, Lérida, Madrid, Orense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y del distrito de Viseu.

***Curculio (Curculio) glandium*** Marsham, 1802

Vizcaya: 2 ej., Nuestra Señora de Oro, Murguía, 15-V-1988 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Gerona, Granada, Jaén, La Coruña, Lérida, Madrid, Málaga, Orense, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y de los distritos de Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Leiria, Setúbal y Vila Real.

***Derelomus piriformis*** (Hoffmann, 1938)

Alicante: 1 m., La Albufereta, Alicante, 21-VIII-1987 (J.I. López-Colón), AZ. Nueva para la provincia.

Cádiz: 1 h., San Roque, IX-1982 (J. de Ferrer), AZ. Nueva para la provincia.

Córdoba: 1 h., Córdoba, 5-III-[19]87, trampa de luz (M. Baena), AZ; 1 m., Baena, 5-V-[19]89, a la luz (M. Baena), AZ. Nueva para la provincia.

Especie mencionada de España sin más detalles sobre estos ejemplares por Alonso-Zarazaga & Lyal (1999).

***Dorytomus (Dorytomus) longimanus*** (Forster, 1771)

Alicante: 1 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Almería, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Jaén, Lérida, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza, y de la isla de Mallorca.

***Mecinus pascuorum*** (Gyllenhal, 1813)

Santarém: 1 ej., Santarém, I-1981 (Col. Mendes), AS #6246. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Pontevedra, Segovia y Valencia, de la isla de Mallorca y de los distritos de Bragança y Évora.

***Mecinus pyraster*** (Herbst, 1795)

Cuenca: 1 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Faro: 2 ej., Albufeira, 8-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, La Rioja, La Coruña, Lérida y Pontevedra, de la isla de Mallorca y de los distritos de Aveiro, Braga y Bragança.

***Mecinus variabilis*** (Rosenhauer, 1856)

Almería: 1 ej., Cortijo de la Camarilla, Sierra de los Filabres, V-[19]55 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Évora: 5 ej., Montes Juntos, 29-IV-[19]79 (Serrano), AS



#2389; 1 ej., id., 26-IV-[19]80 (Serrano), AS #4795. Nueva para el distrito.

Setúbal: 4 ej., Sines, 15-VI-[19]79 (Serrano), AS #3093. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Cádiz, Lérida y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca y de Portugal sin más detalle (Oliveira, 1890a).

***Miarus ursinus*** Abeille, 1906

Almería: 5 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Málaga y del distrito de Évora.

***Rhinusa antirrhini*** (Paykull, 1800)

Almería: 1 ej., Senés, 5-V-[19]55 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Castellón, Jaén, La Rioja, Lérida y Madrid, de la isla de Mallorca y del distrito de Castelo Branco.

***Rhinusa moroderi*** (Reitter, 1906)

Alicante: 1 ej., Benifallim, 28-IV-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente tan sólo de la provincia de Valencia.

***Rhinusa tetra*** (Fabricius, 1792)

Almería: 1 ej., Castala, 2000 m, Sierra de Gádor, 2-VII-[19]61 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Granada, Guadalajara, Jaén, Lérida, Madrid, Navarra, Pontevedra, Segovia, Teruel, Valencia y Zaragoza, y de los distritos de Bragança, Coimbra, Lisboa, Vila Real y Viseu.

***Rhinusa vestita*** (Germar, 1821)

Lisboa: 1 ex., Oeiras, 19-IV-1979 (Artur Serrano), AS (2097). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Alicante, Ávila, Barcelona, Cáceres, Granada, Madrid, Málaga y Teruel, y de los distritos de Bragança, Évora y Guarda.

***Orchestes (Alyctus) testaceus*** (O.F. Müller, 1776)

Granada: 1 ej., Venta El Molinillo, Sierra Harana, 29-X (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de la provincia de Lérida y de los distritos de Guarda y Vila Real.

***Smicronyx (Smicronyx) albosquamosus*** Wollaston, 1854

Almería: 3 ej., Paterna del Río, VI-[19]57 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de la provincia de Granada y de la isla de Mallorca.

***Pachytychius haematocephalus*** (Gyllenhal, 1835)

Huelva: 1 ej., Reserva de Doñana, 14/17-IV-1966, EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, La Rioja, León, Madrid, Málaga y Navarra, de la isla de Mallorca y de los distritos de Aveiro, Guarda, Lisboa, Vila Real y Viseu.

***Sibinia (Dichotychius) gallica gemmans*** Desbrochers des Loges, 1908

Setúbal: 1 ej., Sines, 21-I-[19]78 (Serrano), AS #286. Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Valencia y Zaragoza.

***Sibinia (Dichotychius) planiuscula planiuscula*** Desbrochers des Loges, 1873

Setúbal: 1 ej., Sines, 16-VI-[19]79 (Serrano), AS #3123. Nueva para Portugal.

Citada con anterioridad de las provincias de Cádiz, Sevilla y Valencia.

***Sibinia (Sibinia) arenariae*** Stephens, 1831

Faro: 1 ej., Tavira (Algarve), 12-VI-1981 (Serrano), AS #7551; 2 ej., Castro Marim (Algarve), 11-VI-1981 (Serrano), AS #7274. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Asturias, León, Madrid, Murcia y Zaragoza, de la isla de Mallorca y de Portugal sin más detalle (Oliveira, 1890a).

***Tychius (Tychius) argentatus*** Chevrolat, 1859

Setúbal: 1 ej., Arrábida, 14-V-1979 (Artur Serrano), AS (2714); 1 ej., Sines, 15-VI-1979 (Artur Serrano), AS (3092). Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Granada, Jaén, Murcia y Valencia, de la isla de Mallorca y del distrito de Lisboa.

***Tychius (Tychius) aureolus*** Kiesenwetter, 1852

Huelva: 1 ej., Coto de Doñana, 27-V-[19]57 (J.A. Valverde), EEZA. Nueva para la provincia. El ejemplar presenta algunas diferencias con la forma típica de la especie.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Cuenca, Jaén y Teruel.

***Tychius (Tychius) cuprifer*** (Panzer, 1799)

Jaén: 1 ej., Mesa del Poyo del Manquillo, Sierra de Cazorla, VI-[19]62 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Salamanca: 1 ej., Montejo, 16-VI-[19]48 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Álava, Almería, Badajoz, Cádiz, Gerona, Granada, Madrid, Málaga y Navarra, de la isla de Mallorca y de los distritos de Coimbra, Leiria y Vila Real.

***Tychius (Tychius) oedemerus*** Penecke, 1936

Faro: 1 ej., Meia-Praia, 7-VIII-1978 (Artur Serrano), AS (1912). Nueva para el distrito.

Leiria: 1 ej., Alcobaça, Ganilhos, 9-VI-1987, Fernanda N. Ribeiro leg. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Cádiz y Málaga, y del distrito de Évora.

***Tychius (Tychius) picirostris*** (Fabricius, 1787)

Faro: 1 ej., Ludo, Faro (Algarve), 10-VI-1981 (Artur Serrano), AS (7099). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Almería, Badajoz, Cádiz, Granada, Huesca, La Coruña, Lérida, Madrid, Vizcaya y Zaragoza, y de los distritos de Coimbra y Lisboa.

***Tychius (Tychius) quinquepunctatus*** (Linnaeus, 1758)

Évora: 1 ej., Estremoz (A. Alemtejo), 23-V-1987 (Artur Serrano), AS (12444). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, La Rioja, León, Lérida, Navarra y Palencia, y del distrito de Coimbra.

***Sitophilus granarius*** (Linnaeus, 1758)

Granada: 1 ej., Granada, V-[19]78 (M.D. Delgado), DZGr. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, La

Coruña, La Rioja, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, de las islas de Cabrera, Ibiza, Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Santarém, Vila Real y Viseu.

***Sitophilus zeamais*** Motschulsky, 1855

Barcelona: 7 ej., Barcelona, 19-VII-[19]84 (Novella), XV. Nueva para la provincia.

Málaga: 1 ej., La Cala [del Moral], 12-III-[19]77, DZGr. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de la isla de Mallorca. En realidad la especie debe ser tanto o más común que su congénere *S. oryzae* (Linnaeus, 1763), con la que es muy fácil confundirla.

***Sphenophorus abbreviatus*** (Fabricius, 1787)

Ávila: Las Navas, V.[19]80 (Patilla leg.), UAM. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Cádiz, Castellón, Málaga, Navarra, Orense, Pontevedra, Valencia y Zaragoza, de la isla de Mallorca y de los distritos de Faro y Lisboa.

***Sphenophorus parumpunctatus*** Gyllenhal, 1838

Tarragona: 1 ej., Fangar, dunes, Delta del Ebro, 7-V-[19]83 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Valencia: 1 ej., alrededores de Valencia, 15-VI-2004, (S. García Vidal), trampa de feromonas, MNCN. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Badajoz, Barcelona, Madrid y Pontevedra, y de los distritos de Bragança y Lisboa.

***Brachyderes (Brachyderes) illaesus*** Boheman, 1833

Sevilla: Aznalcázar, 29-XII-[19]77 y 30-XI-[19]77, CZMu. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Cádiz, Granada y Huelva, y de los distritos de Beja, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal y Vila Real.

***Brachyderes (Brachyderes) incanus*** (Linnaeus, 1758)

Braga: 1 ej. (pequeño), Covide, 1-IV-1981 (Serrano) #6463, AS. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Gerona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, La Rioja, León, Lérida, Madrid, Orense, Salamanca, Segovia, Tarragona, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Bragança, Guarda, Évora, Leiria, Lisboa, Vila Real y Viseu.

***Brachyderes (Brachyderes) pubescens*** Boheman, 1833

Murcia: 1 ej., Revolcadores, 3-II-1985 (Ochotorena) #23, FO. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Albacete, Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Navarra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Beja, Évora, Faro y Lisboa.

***Brachyderes (Gastraspis) marginellus*** Graells, 1858

Faro: 2 m., 1 h., Azinhal, [Castro Marim], 14-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Ávila, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Madrid y Salamanca, y de los distritos de Beja, Évora, Guarda y Setúbal.

***Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum melanogrammum*** (Forster, 1771)

Cuenca: 1 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Barcelona, Cantabria, Granada, Huesca, La Coruña, La Rioja, León, Lérida, Lugo, Madrid y Zaragoza, y del distrito de Coimbra. La cita de Granada (Sierra Nevada; Rosenhauer, 1856) es muy dudosa y no se ha vuelto a encontrar a pesar de numerosas visitas a la sierra. El límite meridional de la especie en la Península Ibérica parece estar marcado por una línea Tragacete-Madrid-Coimbra.

***Rhytidères (Rhytidères) plicatus*** (Olivier, 1790)

Cáceres: 1 ej., Segura de Toro, 23-VIII-1984, 620 m (M. Arcas Martín), MAM. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Valencia y Zaragoza, de las islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, y de los distritos de Lisboa y Setúbal.

***Attactagenus pyriformis*** (Boheman, 1833)

Vila Real: 2 ej., Vila Real, 18-IV-1980, Col. Aloisio (nrs. 12118, 12119), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Ávila, Guipúzcoa, Madrid, Segovia y Zamora, y del distrito de Lisboa. La cita de Guipúzcoa es probablemente errónea, ya que se trata de una especie propia del Sistema Central y sierras cercanas.

***Heydeneonymus amplicollis*** (Boheman, 1840)

Ávila: Sierra de Gredos, 1100 m, 2-VIII-1953, AH (Trachyphloeocetus cneorhinoide Dbr., A. Hoffmann det.). Nueva para España.

Beja: 1 ex., Casa Branca, Zambujeira 31-III-1982 (Artur Serrano), AS (n. 8092). Nueva para el distrito.

Especie rarísima, hasta ahora conocida tan sólo del distrito de Lisboa.

***Heydeneonymus cneorhinoide*** (Desbrochers des Loges, 1909)

Huelva: 1 h., Matalascañas, 4-IX-[19]84 (Velázquez de Castro), VC. Nueva para la provincia.

Málaga: 1 h., Pantano [de La] Cancelada, Benahavís, 9-VII-1983 (J. de Ferrer), AZ. Nueva para la provincia.

Hasta ahora conocida tan sólo de la localidad típica en la provincia de Cádiz (Algeciras).

***Philopedon vicinum*** (Desbrochers des Loges, 1875)

Huelva: 1 ej., El Rompido, 5-IV-[19]82 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Almería, Cádiz y Málaga y del distrito de Faro. Queda aún por dilucidar si no se trata de la misma especie que la marroquí *Philopedon setarium* (Fairmaire, 1867), nombre que tendría prioridad. La descripción de esta última no permite distinguirlas y se hace necesario el estudio de los tipos.

***Naupactus cervinus*** Boheman, 1840

Cádiz: 1 ej., Algeciras, 27-VII-1983 (J.L. Pérez-Guerra), AZ. Nueva para la provincia.

Málaga: 1 ej., Urb. Miraflores, El Palo, Málaga, 14-VIII-[19]79 (J.M. Vela), AZ; 1 ej., id., 3-VII-[19]81, AZ; 1 ej., id., 23-VIII-[19]81, AZ; 2 ej., id., 12-VIII-[19]81, AZ; 1 ej., id., 15-IX-[19]81, AZ; 1 ej., id., 21-XII-[19]79, AZ; 1 ej., Mira-

flores de El Palo, Málaga, 18-X-[19]82 (Bastazo & Vela), AZ. Nueva para la provincia.

Setúbal: 3 ej., Sines, 24-XII-[19]77 (Serrano), AS #242 (identificado como *Pantomorus cervinus*). Nueva para el distrito.

Especie invasora de origen sudamericano, citada anteriormente de las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona, y de los distritos de Leiria, Lisboa y Porto.

**Otiiorhynchus (Arammichnus) cribricollis** Gyllenhal, 1834 Madrid: Madrid, V (Vélez), UAM; Pitis, III (Serrano), UAM. Nueva para la provincia.

Vizcaya: 1 ej., Plencia, 19-X-1986 (Bahillo), PB. Nuevo para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón, Cuenca, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia, de las islas de Cabrera, Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca, y del distrito de Lisboa.

**Otiiorhynchus (Dorymerus) sulcatus** (Fabricius, 1775)

Braga: 1 ej. Gerês (Vila), 3-VI-[1]980 (Serrano), AS (#4815). Nueva para el distrito.

Especie invasora, citada de las provincias de Barcelona, Granada, Guipúzcoa, La Coruña, Lérida y Madrid y de los distritos de Porto y Vila Real. Frecuente en parques y jardines.

**Otiiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis** (Linnaeus, 1767)

Cuenca: 1 ej., N Laguna del Marquesado, 1350 m, 23-IV-1984 (W. Schawaller), CK. Nueva para la provincia.

Teruel: SW Valderrobres, 500 m, 18-IV-1984 (W. Schawaller), CK. Nueva para la provincia.

Se ha citado de Andorra y de las provincias de Barcelona, Cantabria, Castellón, Gerona, Huesca y Lérida, y de Portugal sin más detalle (Magnano, 1973).

**Otiiorhynchus (Nihus) uncinatus** Germar, 1823

Huesca: 1 ej., Yésero, 1200 m, 12-V-1966 (Besuchet), RB. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de la provincia de Lérida, de donde hay varios ejemplares en el MNCN con la etiqueta: Val d'Aran.

**Otiiorhynchus (Pendragon) ovatus ovatus** (Linnaeus, 1758)

Madrid: 1 h., Alcobendas, AZ. Nueva para la provincia.

Especie con tendencias invasoras, se ha citado de Andorra y de las provincias de Gerona y Zaragoza. Probablemente estas localizaciones correspondan a su área natural, pero se encuentra dispersa por parques y jardines de otras localidades.

**Otiiorhynchus (Zadrehus) atroapterus** (DeGeer, 1775)

Asturias: 4 ej., Lloredo-Gozón (Playa de Xagó), 16-V-2017 (M. Toribio), MNCN\_Ent 197821, 197822, 197823, 197824. Nueva para la provincia.

Especie propia de los arenales marítimos, su presencia en Asturias se daba por descontada. También debe estar en el País Vasco y Cantabria. Se ha citado de las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra. Una cita de la provincia de León (cerca del monasterio de Santas Albas, es decir, Santa María de Arbás) efectuada por Heyden (1870) corresponde, sin lugar a dudas, a un error de identificación, no siendo éste un lugar adecuado para la ecología de la especie.

**Euplister setabensis** (Hustache, 1921)

Alicante: 1 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72, EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Valencia y Sala-

manca. La cita de los alrededores de Málaga (Cobos, 1950) es muy dudosa. Personalmente, la de Salamanca despierta mis sospechas de un error de etiquetado, dado que la especie, áptera, tiene una capacidad de dispersión limitada y está acantonada en el área levantina.

**Phyllobius (Nemoicus) oblongus** (Linnaeus, 1758)

Alicante: 15 ej., Sierra de Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA; 1 ej., Benifallín, 28-IV-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Córdoba: 1 m., 1 h., Fuente del Espino, Luque, 25-V-1987 (Baena), MB. Nueva para la provincia.

Málaga: 13 ej., Cortijo Quejigales, Sª Ronda, 1280m, 26-V-[19]79 (M.A. Alonso Z.), *Crataegus monogyna*, AZ; 2 ej., id., 22-V-[19]82, AZ; 1 ej., Villanueva del Rosario, 30SUF 8094, 14-V-1988 (Alonso-Z.), *Quercus rotundifolia* Lam., AZ. Nueva para la provincia.

Zaragoza: 1 ej., Moncayo, 29-VI-[19]79 (M.A. Alonso Z.), AZ. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Granada y Jaén.

**Phyllobius (Phyllobius) tuberculifer** Chevrolat, 1866

Cuenca: 3 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Palencia: 1 m. (?), falta abdomen), Palencia, Estercolero, 17-VI-1986 (L. Carro), det. Ph. xanthocnemus por M. Torres, UO. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Ávila, Cantabria, La Rioja, León, Madrid, Orense, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Teruel y Zaragoza, y los distritos de Guarda y Vila Real.

**Phyllobius (Phyllobius) xanthocnemus** Kiesenwetter, 1852

Huesca: 1 ej., Selva de Oza, 1600 m, 6-VI-1987 (Podlussány), AP. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de Andorra y de las provincias de Álava, Asturias, Guipúzcoa y Lérida.

**Polydrusus (Chomatocryptus) xanthopus** Gyllenhal, 1834

Cádiz: 1 ej., La Muela, Vejer, 14-VI-1998 (P.[L.] Coello), LSc. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Lérida, Madrid, Segovia, Sevilla, Toledo y Zaragoza, y de los distritos de Coimbra, Évora, Faro y Setúbal.

**Polydrusus (Eurodrusus) confluens** Stephens, 1831

Burgos: 2 ej., 5 Km E de Herrera de Pisuerga [junto a Sotovellanos], 6-VI-1989 (Syrett & Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Gerona, La Rioja, Lérida, Madrid, Salamanca y Segovia, y de los distritos de Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Setúbal y Viseu.

**Polydrusus (Eurodrusus) ibericus** Stierlin, 1884

Cuenca: 1 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Soria: 1 h., Burgo de Osma, 19-VI-1987 (Podlussány), AP. Nueva para la provincia.

Especie citada tan sólo de la provincia de Zaragoza, en realidad presenta una distribución bastante más amplia, en bastantes de las numerosas poblaciones de su planta patrón, *Juniperus thurifera* L., la sabina albar (Cupressaceae). Este comportamiento trófico la acerca mucho más a las especies del géne-

ro *Pachyrhinus* Schoenherr, 1823, donde se ubicaba hasta hace poco, que a las especies de *Polydrusus* Germar, 1817, que se alimentan de angiospermas planifolias. El cambio me parece, a todas luces, injustificado y sin un argumento profundo, por lo que se necesitarán más datos antes de colocar definitivamente esta bella especie.

***Polydrusus (Eurodrusus) pilosulus*** Chevrolat, 1865

Alicante: 3 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Málaga, Palencia, Salamanca, Sevilla y Valladolid, y de los distritos de Beja, Faro y Lisboa.

***Polydrusus (Eurodrusus) pilosus pilosus*** Gredler, 1866

Faro: 1 ej., Albufeira, 8-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para Portugal.

Citada con anterioridad de las provincias de Lérida y Palencia.

***Polydrusus (Eurodrusus) planifrons planifrons*** Gyllenhal, 1834

Alicante: 4 ej., Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Huesca, Lérida y Navarra.

***Polydrusus (Eurodrusus) pulchellus baeticus*** Roudier, 1963

Huelva: 1 ej., Matalascañas, 12/25-IV-1988 (Matern), HWI. Nueva para la provincia.

Faro: 3 ej., Sierra de Monchique, P3, 9-V-1994 (Bayer & Winkelmann); 1 ej., Albufeira, 8-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nueva para el distrito.

Citada anteriormente tan sólo de la provincia de Cádiz.

***Polydrusus (Eurodrusus) pulchellus roudieranus*** Yunakov, 2017

Setúbal: 2 ej., Sobreda-Umg[ebung], 31-III-1986 (Winkelmann-Klöß) / *Eusomus* spec. det. Dieckmann '87. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente del distrito de Coimbra. Las subespecies de esta especie presentan unos límites morfológicos difuminados a medida que nos acercamos a sus potenciales límites geográficos. Así, los ejemplares de *P. (E.) pulchellus baeticus* de las localidades de Faro arriba mencionadas presentan algunos caracteres intermedios con la forma de Sobreda aquí indicada. Sólo los ejemplares de las localidades típicas u otras muy cercanas a ellas se asemejan a las descripciones originales.

***Polydrusus (Eustolus) impressifrons*** Gyllenhal, 1834

Almería: 1 ej., Vélez Rubio, 10-VI-[19]51 (E. Carrión), EEZA. Nueva para la provincia.

Palencia: 1 ej., Bárcena de Campos, 1-V-1988 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Álava, Albacete, Badajoz, Barcelona, Cuenca, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, La Rioja, Lérida, Madrid, Navarra, Salamanca, Teruel y Zaragoza, de la isla de Cabrera, y de los distritos de Faro, Guarda y Portalegre. Las citas del archipiélago de Cabrera resultan, cuando menos, extrañas, dado que la especie parece estar ausente del área levantina.

***Polydrusus (Metallites) viridinitens*** Gravenhorst, 1807

Gerona: 1 ej., Puigsacalm, 1500 m, 16-V-[19]82 (Yélamos), AZ. Nueva para la provincia.

Especie citada hasta ahora tan sólo de la provincia de Barcelona y, sin más detalles, de Castilla y Andalucía. Todas estas citas deben ser confirmadas.

***Foucartia elongata*** Tournier, 1876

León: 1 ej., Villafranca del Bierzo, 6-VI-1983 (J. Péricart), *Genista florida*, AZ; 1 ej., La Candamia, Villaobispo de las R[egueras], 16-VI-[19]84 (O. Mansilla), AZ; 1 ej., La Candamia, Villaobispo de las Regueras, 8-VI-[19]82 (O. Mansilla), *Genista scorpius*, AZ. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Orense y Salamanca.

***Pleurodirus (Pleurodirus) fairmairii*** (Kiesenwetter, 1852)

Alicante: Sierra Mariola, 2-V-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Castellón, Granada, Tarragona y Valencia, y de los distritos de Coimbra, Leiria, Porto, Vila Real y Viseu. Las citas portuguesas parecen corresponder a un error de determinación, dado que se trata aparentemente de una especie del Este peninsular.

***Andrion regensteiniense*** (Herbst, 1797)

Cuenca: 3 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Huesca: 2 ej., Col de Fades, Castejón de Sos, 1400 m, 13-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Navarra: 1 ej., 1 Km SE Alto de Laza, 1050 m, 7-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Palencia: 1 ej., 2 Km S Puerto de Piedrasluengas, 1200 m, 6-VI-[19]89 (P. Syrett & R. Emberson), NZAC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Granada, La Coruña, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Orense, Pontevedra, Salamanca, Segovia y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Vila Real y Viseu.

***Charagmus griseus*** (Fabricius, 1775)

Sevilla: Aznalcázar, 27-III-[19]82, CZMu. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Cádiz, Gerona, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo y Vila Real.

***Sitona callosus*** Gyllenhal, 1834

Cuenca: 1 ej., Tragacete, bord de rivièrè, 12-VI-1986 (R. Vincent), LSc. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Pontevedra y Zaragoza.

***Sitona hispidulus*** (Fabricius, 1777)

Asturias: 1 ej., Robledo de Anayo, Piloña, 10-XI-2016 (M. Toribio), MNCN\_Ent 197831. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castellón, Gerona, Granada, Guipúzcoa, La Coruña, León, Lérida, Madrid, Navarra, Salamanca y Valencia, de la isla de Mallorca y de los distritos de Aveiro y Guarda.

***Sitona macularius macularius*** (Marshall, 1802)

Albacete: 1 ej. Albacete, 8-III-1976 (Ochotorena), FO. Nueva para la provincia.

Alicante: 1 ej., Benifallim, 28-IV-[19]72 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Granada, Huesca, La Coruña, La Rioja, Lérida, Madrid, Murcia, Orense, Salamanca, Sevilla, Teruel y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y del distrito de Bragança.

**Cycloderes (Aramorius) guinardi** (Jacquelin du Val, 1853)  
Gerona: 1 ej., La Estela, Costa Brava, Hispania, 20-VI-1977 (Heiss), RB. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Castellón, Lérida, Navarra, Teruel y Valencia.

**Brachypera (Antidonus) lunata** (Wollaston, 1854)

Murcia: Aznalcázar, s.m.d., CZMu. Nueva para la provincia.  
Faro: 1 ej., Castro Marim, 28-IV-[19]82 (Serrano), AS #9146. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, de la isla de Mallorca, y de los distritos de Coimbra, Évora y Santarém.

**Coniatus (Bagoïdes) suavis** Gyllenhal, 1834

Faro: 4 ej., Tavira, Algarve, 12-VI-1981 (Serrano), AS #7549, #7550. Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Barcelona, Madrid y Zaragoza, y de las islas de Mallorca y Menorca.

**Coniatus (Coniatus) deyrollei** Capiomont, 1868

Murcia: 3 ej., Embalse de Puentes, Lorca, 18-III-1984 (Ochotorena), FO #34. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Azinhal, [Castro Marim], 14-V-1994 (Bayer & Winkelmann); 2 ej., Loulé NE: Querença, 12/13-V-1994 (Bayer & Winkelmann); 1 ej., Barragem do Arade, 12/13-V-1994 (Bayer & Winkelmann). Nuevas citas exactas para Portugal.

Citada con anterioridad de la provincia de Cádiz, de la isla de Mallorca y de Portugal sin más detalle (Skuhrovec, 2013). La identidad de esta especie es problemática por la falta de caracteres netos con respecto de la siguiente, aquellos en que se apoyan las diagnósis existentes parecen ser bastante variables.

**Coniatus (Coniatus) repandus** (Fabricius, 1792)

Málaga: 1 ej., Urbanización Riomar, Torremolinos, 18-VI-[19]84 (M. Soler), MS. Nueva para la provincia.

Setúbal: 1 ej., S. Torpes (Sines), 15-VI-[1]980 (Serrano), AS #5449; 1 ej., Sines, 12-VII-1981 (Serrano), AS #7564. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Badajoz, Gerona, Madrid, Navarra, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Coimbra, Faro, Leiria y Viseu.

**Donus austerus austerus** (Boheman, 1834)

Sevilla: Aznalcázar, s.m.d., CZMu. Nueva para la provincia.  
Setúbal: 4 ej., S. Torpes, Morgavel, 21-VIII-[1]980 (Serrano), AS #5700. Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Cádiz y Málaga, y de los distritos de Castelo Branco y Lisboa.

**Donus philanthus** (Olivier, 1807)

Sevilla: Aznalcázar, s.m.d., CZMu. Nueva para la provincia.  
Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Burgos y Gerona, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Faro y Lisboa.

**Hypera (Eririnomorpha) conmaculata** (Herbst, 1795)

Lisboa: 1 ej., Santa Cruz, 30-IV-[19]78 (Serrano), AS #764; 1 ej., id. #763, AZ. Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Castellón, Lérida y Valencia, de la isla de Mallorca y de los distritos de Guarda, Leiria y Vila Real.

**Hypera (Eririnomorpha) rumicis** (Linnaeus, 1758)

Setúbal: 1 ej., Arrábida, 8-VI-[19]79 (Serrano), AS #2799 (escamas purpúreo-cobrizas). Nueva para el distrito.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Barcelona y Lérida y de Portugal sin más detalle (Oliveira, 1889).

**Hypera (Hypera) melancholica** (Fabricius, 1792)

Lisboa: 1 ej., Qta. do Marquês, Oeiras, 7-III-[19]78 (Serrano), AS #381. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Cádiz, Lérida, Madrid y Sevilla, de las islas de Mallorca y Menorca, y de Portugal sin más detalle (Oliveira, 1889).

**Hypera (Hypera) nigrirostris** (Fabricius, 1775)

Asturias: 2 ej., Robledo de Anayo, Piloña, 10-XI-2016 (M. Toribio) MNCN\_Ent 197829, 197830. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Álava, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Gerona, Granada, Lérida, Madrid, Málaga, Salamanca, Valencia y Vizcaya, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre y Viseu.

**Hypera (Hypera) ononidis** (Chevrolat, 1863)

Setúbal: 3 ej., S. Torpes, 4-IV-980 (Serrano), AS #4423. Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Álava, Barcelona, Cádiz, Teruel y Valencia, de la isla de Mallorca y de Portugal sin más detalle (Skuhrovec, 2013).

**Hypera (Kippenbergia) arator** (Linnaeus, 1758)

Gerona: 1 ej., St. Hilari Sacalm, 5-VI-[19]82 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Faro: 1 ej., Castro Marim (Esteveiras), 14/18-III-83 (Serrano), AS #10677. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Huesca, La Coruña, Lérida, Madrid, Pontevedra y Zaragoza, y de los distritos de Beja, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Portalegre y Viseu.

**Coniocleonus (Augustecleonus) nebulosus** (Linnaeus, 1758)

Cáceres: 1 ej., Segura de Toro, 1500m, 15-VIII-1986 (M. Arcas Martín); AZ. Primera indicación exacta para España.

Viana do Castelo: 1 ej., P.N. Peneda-Gerês (S<sup>a</sup> Amarela), 7-V-[19]82, #8380 (Serrano), AS; 2 ej., id., id., #8382 (Serrano), AS, AZ. Nueva para Portugal.

Citada de España sin más detalle (Hoffmann, 1950).

**Coniocleonus (Plagiographus) amori** (Marseul, 1868)

Faro: 1 ej., Castro Marim (Esteveira), 8-III-83, #9768 (Serrano), AZ; 1 ej., id., 9/12-IV-85, #11379 (Serrano), AS; 2 ej., id., 21/25-V-84, #10764 (Serrano), AS (identificados como *C. gaditanus*). Nueva para el distrito.

Especie citada de la provincia de Cádiz y de Portugal sin más detalle (Faust, 1904).

**Coniocleonus (Plagiographus) excoriatus** (Gyllenhal, 1834)

Granada: 1 ej., Calahonda, 16-V-[19]74 (J. Lorite) DZGr; 1 ej., Granada, 5-IV-[19]75 (J.L. Rosúa) DZGr; 1 ej., id., 30-X-[19]79, DZGr; 1 ej., La Herradura, V-[19]73 (M. Villar),

DZGr; Motril, VIII-[19]79 (M.C. Garrido) DZGr; 1 ej., Purchil, Camino de, 24-V-[19]78, DZGr. Nueva para la provincia. Toledo: Cabañas de la Sagra, IV-[19]79 (Moreno), UAM. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Gerona, Lérida, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Valencia y Zaragoza, de las islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, y de los distritos de Beja, Braga, Coimbra, Évora, Faro y Viana do Castelo.

***Coniocteonus (Plagiographus) graellsii*** (Chevrolat, 1873)  
Viana do Castelo: 1 ej., Alto dos Bicos, S<sup>a</sup> da Peneda, 4-VI-[19]80, #5205 (Serrano), AS. Primera cita exacta para Portugal.

Especie conocida de las provincias de Madrid y Segovia y citada de Portugal sin más detalle en Alonso-Zarazaga *et al* (2017) y Meregalli (2018).

***Coniocteonus (Plagiographus) megalographus*** (Fähræus, 1842)

Cádiz: 2 ejs., Laguna de Medina, Jerez, 3-VII-[19]82 (J. de Ferrer), AZ; 3 ejs., Cortijo Salomón, San Roque, 26-XII-[19]87 (J. de Ferrer), AZ. Primera indicación exacta para España.

La cita de Alonso-Zarazaga (2002) (y otras obras posteriores) se basa en estos ejemplares.

***Coniocteonus (Plagiographus) nigrosuturatus*** (Goeze, 1777)

Jaén: 1 ej., Cazorla, III-[19]75, DZGr. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, León, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Beja y Leiria.

***Coniocteonus (Plagiographus) variolosus*** (Wollaston, 1864)  
Almería: 1 ej., Punta del Sabinar, El Ejido 30SWF2660, 23-X-[19]92 (Unid. Zool. Granada), barlovento, trampas, AZ; 1 ej., id., 16-VI[19]92, AZ. Nueva para la provincia.

Citada tan sólo de la provincia de Murcia.

***Cyphocleonus testatus*** (Gyllenhal, 1834)

Faro: 1 ej., Meia Praia, 11-VIII-78, #1520 (Serrano), AS. Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Madrid, Málaga y Pontevedra, y del distrito de Lisboa.

***Mecaspis emarginata*** (Fabricius, 1787)

Madrid: 1 m., El Espaldar, Lozoyuela, Sierra de la Cabrera (L. Gil), AZ. Nueva para la provincia.

Especie citada tan sólo antes de ahora de la provincia de Lérida (Valle de Arán). Esta cita implica que su distribución en la Península Ibérica debe ser mucho más amplia, sobre todo en la mitad norte.

***Temnorhinus (Temnorhinus) brevisrostris*** (Gyllenhal, 1834)

Huelva: 1 ej., Matalascañas (dunas), II-1984 (Jürgen Trautner), VC. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona y Sevilla, y de la isla de Mallorca.

***Temnorhinus (Temnorhinus) mixtus*** (Fabricius, 1792)

Faro: 1 ej., Castro Marim, 18-VIII-1982, #9417 (Serrano), AS; 3 ejs., id. (Esteveira), 27-I-83, #9739 (Serrano), AS; 1 ej., id., 19-V-82, #9277 (Serrano), AS. Nueva para Portugal.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Barcelona y Zaragoza, y de la isla de Mallorca.

***Larinus (Larinomesius) ochreateus*** (Olivier, 1807)

Setúbal: 1 ex., Arrábida, 4-VII-1979 (Artur Serrano), AS (3265); 1 ex., Arrábida, 22-VI-1978 (Artur Serrano), AS (1341). Nueva para el distrito.

Citada con anterioridad de las provincias de Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Gerona, Jaén, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Coimbra, Faro y Lisboa.

***Larinus (Larinus) cynarae*** (Fabricius, 1787)

Granada: 1 ej., La Calahorra, 4-VI-[19]72 (R. Jiménez), DZGr. Nueva para la provincia.

Palencia: 1 ej., Bárcena de Campos, 850 m, 13-VII-1986 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Madrid, Málaga, Navarra, Salamanca, Toledo, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Lisboa y Setúbal. Es un taxon complejo, probablemente representado en la Península Ibérica por dos formas crípticas, una norteña que se alimentaría exclusivamente de *Onopordum* y otra sureña que lo haría sobre todo de *Cynara* y correspondería a la forma típica, descrita del norte de África. Hay una tercera forma críptica en la península itálica, consideradas biotipos por Briese *et al.* (1996). El problema se complica aún más con las citas de *Larinus latus* (Herbst, 1783), especie oriental muy cercana, distinta molecularmente pero de difícil separación morfológica, de todo el área ocupada aparentemente por *L. cynarae* y sus formas crípticas. Los caracteres usados para la separación de ambas especies son variables y de difícil apreciación. Un acercamiento al problema mediante secuenciación de ADN arrojaría probablemente bastante más claridad de la que se tiene ahora.

***Larinus (Larinus) ursus*** (Fabricius, 1792)

Ávila: 1 ej., Mingofernando, S<sup>a</sup> de Gredos, 6-VI-[19]87 (P. Gurrea), cardillo, UAM; 1 ej., Poyales del Hoyo, 25-V-[19]85 (P. Gurrea), UAM. Nueva para la provincia.

Cáceres: 1 ej., Segura de Toro, 5-VIII-1982, 460 m (M. Arcas Martín), MAM. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Granada, Jaén, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Salamanca, Valencia y Zaragoza, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Vila Real y Viseu.

***Larinus (Phyllonomeus) longirostris*** Gyllenhal, 1835

Teruel: Frías de Albarracín, 25-V-[19]73 (Cobos), EEZA. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Cádiz, Castellón, Granada, Lérida, Madrid, Salamanca y Valencia, y del distrito de Lisboa.

***Larinus (Phyllonomeus) nanus*** Lucas, 1847

Évora: 1 ex., Veiros, 9-XII-1979 (Artur Serrano), AS (3941). Nueva para el distrito.

Setúbal: 1 ex., Torrão, 20-IV-1977 (Artur Serrano), AS (#135). Nueva para el distrito.

Se ha citado de las provincias de Almería, Ávila, Ciudad Real, Granada, La Rioja, Madrid, Málaga, Salamanca y Teruel, y del distrito de Lisboa.

**Larinus (Phyllonomeus) sturnus** (Schaller, 1783)

Palencia: 1 ej., Bárcena de Campos, 850 m, 17-VIII-1988 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Gerona, Granada, Jaén, Lérida, Madrid, Segovia, y de las islas de Mallorca y Menorca.

**Larinus (Phyllonomeus) turbinatus** Gyllenhal, 1835

Palencia: 4 ej., Bárcena de Campos, 850 m, 28-VIII-1986 (Bahillo), PB; 1 ej., id., 28-XII-1986, id., PB. Nueva para la provincia.

Vizcaya: 1 ej., Gujuli, 29-V-1988 (Bahillo), PB; 1 ej., Opakua, 900 m, 19-X-1986 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia

Citada con anterioridad de las provincias de Almería, Barcelona, Burgos, Castellón, Gerona, Jaén, Lérida, Lugo, Madrid, Navarra, Orense, Salamanca, Teruel, Toledo y Valencia, y de los distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria y Setúbal.

**Lixus (Epimeces) flaveolus** Motschulsky, 1849

Zaragoza: 1 ej., Retuerta de Pina, Pina de Ebro, s.m.d. (Blasco Zumeta), BZ. Nueva para la provincia.

Se ha citado de la provincia de Madrid y de España meridional (sin más datos, pero probablemente de los alrededores de Cartagena) (Motschulsky, 1849). En la mitad sur de la Península sustituye en la mayoría de los casos a *L. filiformis* (Fabricius, 1781), del que se le distingue con cierta dificultad

**Lixus (Epimeces) ulcerosus** Petri, 1904

Lérida: 1 m?, Bosc d'en Bentanacs, Alàs i Cerc, 12-V-2009 (J. Bentanachs), MZB. Det. A.-Z. 2015. Nueva para la provincia. Citada anteriormente de las provincias de Cuenca, Gerona, Granada, Madrid, Málaga, Palencia, Teruel y Zaragoza.

**Lixus (Eulixus) iridis** Olivier, 1807

Burgos: 1 m., 1 h., Bercedo, 6-VI-1986 (Bahillo), PB. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Álava, Ávila, Barcelona, Cuenca, Gerona, Madrid y Salamanca, de la isla de Mallorca, y de los distritos de Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Setúbal, Vila Real y Viseu.

**Lixus (Ortholixus) rosenschoeldi** Boheman, 1842

Almería: 1 ej., Almería, Spanien, E. Juni, CK. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Teruel y Zaragoza y del distrito de Viseu.

**Magdalis (Magdalis) duplicata** Germar, 1819

Gerona: St. Quirze, Besora, 27-VI-[19]87 (X. Vázquez), TY. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Albacete, Lérida, Madrid, Navarra y Tarragona.

**Magdalis (Porrothus) cerasi** (Linnaeus, 1758)

Barcelona: St. Marçal, Montseny, en pomera, 23-VI-[19]87 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Lérida y Tarragona, de la isla de Menorca y de los distritos de Coimbra y Vila Real.

**Anisorhynchus scabrosus** (Geoffroy, 1785)

Lérida: 1 h., Prats i Samsor, 1/20-VII-1987 (A. Viñolas), AV. Nueva para la provincia.

Se ha citado de las provincias de Barcelona, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Jaén, La Rioja, Lugo, Málaga, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Valencia y Zaragoza, y del distrito de Lisboa.

**Pissodes (Pissodes) validirostris** (C.R. Sahlberg, 1834)

Gerona: 1 ej., Gombrèn (Ripollès), tronc pi roig, 23-VI-[19]81 (T. Yélamos), TY. Nueva para la provincia.

Citada anteriormente de las provincias de Ávila, Barcelona, Castellón, Cuenca, Huelva, La Coruña, La Rioja, Lérida, Madrid, Navarra, Segovia, Tarragona, Toledo, Valencia y Valladolid, y de los distritos de Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Vila Real y Viseu.

**Euplatypus hintzi** (C.F. Schaufuss, 1897)

Valencia: 4 ej., 156/14 PIF - puerto, 14-X-2014, (Javier Collado), s/ sapelli ex Congo, MNCN. Ésta es una especie que ya ha sido citada de las instalaciones portuarias del distrito de Lisboa (en madera de limba, *Terminalia superba* Engl. & Diels, Combretaceae) y que debe ser vigilada dada la posibilidad de su introducción en áreas de clima cálido de la península, debido a la variedad de plantas patrón que es capaz de utilizar. En Valencia, donde fue colectada sobre madera de sapelli (*Entandrophragma cylindricum* (Sprague) Sprague, Meliaceae), junto con ella apareció también un único ejemplar de *E. parallelus* (Fabricius, 1801), especie a la cual se aplican las mismas recomendaciones de control.

**Hylastes linearis** Erichson, 1836

Cádiz: 2 ej., Puerto del Bujeo, Algeciras, 30-I-1988 (J. de Ferrer), AZ. Nueva para la provincia.

Citada con anterioridad de las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia, de las islas de Mallorca y Menorca, y de los distritos de Aveiro, Braga, Faro, Leiria, Lisboa, Porto y Viseu.

## Elenco sistemático

### CIMBERIDIDAE Gozis, 1882

#### Cimberidini Gozis, 1882

*Cimberis* Gozis, 1881

*Cimberis* (*Cimberis*) Gozis, 1881

- *attelaboides* (Fabricius, 1787)

#### Doydirhynchini Pierce, 1916

*Doydirhynchus* Dejean, 1821

- *austriacus* (Olivier, 1807)

### ANTHRIBIDAE Billberg, 1820

#### ANTHRIBINAE Billberg, 1820

#### Allandrini Pierce, 1930

*Allandrus* LeConte, 1876

- *munieri* (Bedel, 1882)
- *undulatus* (Panzer, 1795)

#### Anthribini Billberg, 1820

*Anthribus* Geoffroy, 1762

- *fasciatus* (Forster, 1770)
- *nebulosus* (Forster, 1770) (+)

#### Discotenini Lacordaire, 1865

*Enedreytes* Schoenherr, 1839

- *hilaris* Fåhræus, 1839
- Pseudeuparius* Jordan, 1914
- *sepicola* (Fabricius, 1792) (◀)

**Piesocorynini Valentine, 1960***Phaenotheriolum* Ganglbauer, 1903

- *espanoli* (González, 1969)

**Platyrhinini Imhoff, 1856***Platyrhinus* [Clairville], 1798

- *resinosus* (Scopoli, 1763)

*Ulorhinus* Sharp, 1891

- *bilineatus* (Germar, 1819) (+)

**Platystomini Pierce, 1916***Platystomos* Schneider, 1791

- *albinus* (Linnaeus, 1758)

**Trigonorhinini***Opanthribus* Schilsky, 1907

- *tessellatus* (Boheman, 1829)

*Trigonorhinus* Wollaston, 1861

- *areolatus* (Boheman, 1845)

**Tropiderini Lacordaire, 1865***Tropideres* Schoenherr, 1823

- *albirostris* (Schaller, 1783)

**Zygaenodini Lacordaire, 1865***Dissoleucas* Jordan, 1925

- *niveirostris* (Fabricius, 1798)

*Eusphyrus* LeConte, 1876

- *vasconicus* (Hoffmann & Tempère, 1954) (+)

*Noxius* Jordan, 1936

- *curtirostris* (Mulsant & Rey, 1861)

*Rhaphitropis* Reitter, 1916

- *marchica* (Herbst, 1797) (+)
- *oxyacanthae* (Brisout de Barneville, Ch., 1863)

**CHORAGINAE Kirby, 1819****Araecerini Lacordaire, 1865***Araecerus* Schoenherr, 1823

- *fasciculatus* (DeGeer, 1775) [*~ coffeae* (Fabricius, 1801)]

**Choragini Kirby, 1819***Choragus* Kirby, 1819

- *sheppardi* Kirby, 1819
- *theryi* Abeille de Perrin, 1893 (+)

*Melanopsacus* Jordan, 1924

- *grenieri* (Brisout de Barneville, Ch., 1867)

*Pseudochoragus* Petri, 1912

- *piceus* (Schaum, 1845) [*~ nitens* (LeConte, 1884)]

**URODONTINAE C.G. Thomson, 1859***Bruchela* Dejean, 1821

- *albida* (Kuester, 1848)
- *cana* (Kuester, 1848)
- *carpetana* (Daniel, K., 1906)
- *conformis* (Gyllenhal, 1833)
- *flavescens* (Kuester, 1850)
- *parallela* (Kuester, 1848)
- *pygmaea* (Gyllenhal, 1833)
- *rufipes* (Olivier, 1790)
- *rufipes rufipes* (Olivier, 1790) [*~ argentata* (Kuester, 1847)]
- *suturalis* (Fabricius, 1792)
- *testaceipes* (Reiche, 1861) (+)

*Cercomorphus* Perris & Jacquelin du Val, 1864

- *abbreviatus* Reitter, 1896
- *duvalii* Perris, 1864

**ATTELABIDAE Billberg, 1820****ATTELABINAE Billberg, 1820****Apoderini Jekel, 1860***Apoderus* Olivier, 1807

- *coryli* (Linnaeus, 1758)

**Attelabini Billberg, 1820***Attelabus* Linnaeus, 1758

- *nitens* (Scopoli, 1763)
- *variolosus* Olivier, 1807

**RHYNCHITINAE Gistel, 1848****Auletini Desbrochers des Loges, 1908****Auletina Desbrochers des Loges, 1908***Auletes* Schoenherr, 1826

- *tubicen* Schoenherr, 1826
- *wagenblasti* Uyttenboogaart, 1935

**Auletohiina Legalov, 2001***Auletobius* Desbrochers des Loges, 1869

- *Auletobius* (*Canarauletes*) Legalov, 2007
- *maroccanus* Hoffmann, 1953

**Pseudomesauletina Legalov, 2003***Eomesauletes* Legalov, 2001

- *politus* (Lepelletier & Audinet-Serville, 1825)

*Mesauletobius* Legalov, 2001

- *pubescens* (Kiesenwetter, 1852)

**Byctiscini Voss, 1923****Byctiscina Voss, 1923***Byctiscus* Thomson, C. G., 1859

- *betulae* (Linnaeus, 1758)
- *populi* (Linnaeus, 1758)

**Deporaini Voss, 1929****Deporaina Voss, 1929***Caenorhinus* Thomson, C.G., 1859

- *Caenorhinus* (*Caenorhinus*) Thomson, C.G., 1859
- *megacephalus* (Germar, 1823) [*~ mannerheimii* (Hummel, 1823)]

*Deporaus* Samouelle, 1819

- *Deporaus* (*Deporaus*) Samouelle, 1819
- *betulae* (Linnaeus, 1758)

**Rhynchitini Gistel, 1848***Involvulus* Schrank, 1798*Involvulus* (*Involvulus*) Schrank, 1798

- *cupreus* (Linnaeus, 1758)
- *Involvulus* (*Teretriorhynchites*) Voss, 1938
- *icosandriae* (Scopoli, 1763) [*~ caeruleus* DeGeer, 1775]
- *icosandriae icosandriae* (DeGeer, 1775)
- *pubescens* (Fabricius, 1775)

*Lasiiorhynchites* Jekel, 1860*Lasiiorhynchites* (*Coccygorrhynchites*) Prell, 1926

- *sericeus* (Herbst, 1797)
- *Lasiiorhynchites* (*Lasiiorhynchites*) Jekel, 1860
- *cavifrons* (Gyllenhal, 1833)
- *Lasiiorhynchites* (*Nelasiiorhynchites*) Legalov, 2003
- *comatus* (Gyllenhal, 1833) [*~ olivaceus* Gyllenhal, 1833]
- *vaucheri* (Desbrochers des Loges, 1897)
- *Lasiiorhynchites* (*Stenorhynchites*) Voss, 1932
- *caeruleocephalus* (Schaller, 1783)

*Neocoenorrhinus* Voss, 1952*Neocoenorrhinus* (*Neocoenorhinidius*) Legalov, 2003

- *interpunctatus* (Stephens, 1831)



- *pauillus* (Germar, 1824) (+)
- Neocoenorrhinus* (*Neocoenorrhinus*) Voss, 1952
- *germanicus* (Herbst, 1797)
- Neocoenorrhinus* (*Schoenitemmus*) Legalov, 2003
- *minutus* (Herbst, 1797) [~ *aeneovirens* (Marsham, 1802)]
- Rhynchites* Schneider, 1791
- Rhynchites* (*Epirhynchites*) Voss, 1969
- *auratus* (Scopoli, 1763)
- *giganteus* Schoenherr, 1832 (+)
- Rhynchites* (*Rhynchites*) Schneider, 1791
- *bacchus* (Linnaeus, 1758)
- Tatianaerhynchites* Legalov, 2002
- *aequatus* (Linnaeus, 1767)
- Temnocerus* Thunberg, 1815
- *coeruleus* (Fabricius, 1798) [~ *tomentosus* (Gyllenhal, 1839)]
- *nanus* (Paykull, 1792)

## BRENTIDAE Billberg, 1820

### APIONINAE Schoenherr, 1823

#### Apionini Schoenherr, 1823

#### Apionina Schoenherr, 1823

- Apion* Herbst, 1797
- *cruentatum* Walton, 1844
  - *distincticolle* Desbrochers des Loges, 1870
  - *frumentarium* (Linnaeus, 1758)
  - *haematodes* Kirby, 1808
  - *haematodes haematodes* Kirby, 1808
  - *rubens* Walton, 1837 [~ *rubens* Stephens, 1839]
  - *rubiginosum* Grill, 1893
  - *longithorax* Desbrochers des Loges, 1889

#### Aplemonina Kissinger, 1968

- Aizobius* Alonso-Zarazaga, 1990
- *robustirostris* (Desbrochers des Loges, 1870) [~ *schaeferi* (Hoffmann, 1960)]
  - *sedi* (Germar, 1818)
- Cistapion* Wagner, 1924
- *cyanescens* (Gyllenhal, 1833)
- Helianthemapion* Wagner, 1930
- *aciculare* (Germar, 1817)
  - *kefense* (Normand, 1921)
  - *velatum* (Gerstaecker, 1854)
- Hoplopodapion* F. Solari, 1933
- *ferreri* (Alonso-Zarazaga, 1983)
  - *poupillieri* (Wencker, 1864)
- Onychapion* Schilsky, 1901
- *tamarisci* (Gyllenhal, 1839)
- Perapion* Wagner, 1907
- Perapion* (*Eroosapion*) Ehret, 1994
- *lemoroi* (Brisout de Barneville, Ch., 1880)
- Perapion* (*Perapion*) Wagner, 1907
- *affine* (Kirby, 1808) (+)
  - *curtiostre* (Germar, 1817)
  - *hydrolapathi* (Marsham, 1802)
  - *ilvense* (Wagner, 1905)
  - *marchicum* (Herbst, 1797)
  - *violaceum* (Kirby, 1808)
  - *violaceum lopezi* (Hoffmann, 1957)
  - *violaceum violaceum* (Kirby, 1808)
- Phrissotrichum* Schilsky, 1901
- Phrissotrichum* (*Phrissotrichum*) Schilsky, 1901
- *boiteli* (Normand, 1939)
  - *joannium* Ehret, 1997
  - *sicanum* Ehret, 1997

- *tubiferum* (Gyllenhal, 1833)
  - *wenckeri* (Brisout de Barneville, Ch., 1863)
- Phrissotrichum* (*Schilskyapion*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *moroderi* (Desbrochers des Loges, 1907) (+) [~ *grenieri* (Desbrochers des Loges, 1875)]
  - *perrisii* (Wencker, 1859)
  - *rugicolle* (Germar, 1817) (-)
- Pseudaplemonus* Wagner, 1930
- *chevolati* (Gyllenhal, 1833)
  - *limonii* (Kirby, 1808)
- Pseudoperapion* Wagner, 1930
- *brevirostre* (Herbst, 1797)
- Pseudostenapion* Wagner, 1930
- *simum* (Germar, 1817) (+)

#### Aspidapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Alocentron* Schilsky, 1901
- Alocentron* (*Alocentron*) Schilsky, 1901
- *Alocentron* (*Alocentron*) *curvirostre* (Gyllenhal, 1833) (+)
- Aspidapion* Schilsky, 1901
- Aspidapion* (*Aspidapion*) Schilsky, 1901
- *radiolus* (Marsham, 1802)
  - *radiolus radiolus* (Marsham, 1802)
  - *soror* (Rey, 1895)
- Aspidapion* (*Koestlinia*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *aeneum* (Fabricius, 1775)

#### Catapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Catapion* Schilsky, 1906
- *burdigalense* (Wencker, 1859)
  - *curtisii* (Stephens, 1831)
  - *meieri* (Desbrochers des Loges, 1901)
  - *natricis* (Planet, 1918)
  - *pubescens* (Kirby, 1811)
  - *seniculus* (Kirby, 1808)
  - *seriatosetosulum* (Wencker, 1864)

#### Ceratapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Acentrotypus* Alonso-Zarazaga, 1990
- *brunnipes* (Boheman, 1839)
- Ceratapion* Schilsky, 1901
- Ceratapion* (*Acanephodus*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *onopordi* (Kirby, 1808)
  - *onopordi onopordi* (Kirby, 1808)
  - *parens* (Desbrochers des Loges, 1870)
- Ceratapion* (*Angustapion*) Wanat, 1995
- *longiclava* (Desbrochers des Loges, 1897)
  - *macrorrhynchum* (Eppelsheim, 1888)
- Ceratapion* (*Ceratapion*) Schilsky, 1901
- *armatum* (Gerstaecker, 1854)
  - *carduorum* (Kirby, 1808)
  - *damryi* (Desbrochers des Loges, 1894)
  - *gibbirostre* (Gyllenhal, 1813)
- Ceratapion* (*Clementiellus*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *robusticorne* (Desbrochers des Loges, 1866)
- Ceratapion* (*Echinostroma*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *basicorne* (Illiger, 1807)
  - *dentirostre* (Gerstaecker, 1854)
  - *penetrans* (Germar, 1817)
  - *penetrans wanati* Alonso-Zarazaga, 1992
  - *scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)
  - *scalptum scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)
- Diplapion* Reitter, 1916
- *confluens* (Kirby, 1808)
  - *detritum* (Mulsant & Rey, 1859)
  - *nitens* (Schilsky, 1901)
  - *squamuliferum* (Desbrochers des Loges, 1891)

- *stolidum* (Germar, 1817)
- Omphalopion* Schilsky, 1901
- *beuthini* (Hoffmann, Anton, 1874)
  - *buddebergi* (Bedel, 1887)
  - *hookerorum* (Kirby, 1808)
  - *laevigatum* (Paykull, 1792)
- Taphrotopium* Reitter, 1916
- Taphrotopium* (*Taphrotopium*) Reitter, 1916
- *sulcifrons* (Herbst, 1797)

#### Exapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Exapion* Bedel, 1887
- *breviusculum* (Rosenhauer, 1856)
  - *compactum* (Desbrochers des Loges, 1888)
  - *compactum asturiense* (Wagner, 1914)
  - *compactum compactum* (Desbrochers des Loges, 1888)
  - *elongatissimum* (Desbrochers des Loges, 1870)
  - *fasciolatum* (Wagner, 1912) [~ *heikertingeri* (Wagner, 1918)]
  - *fuscirostre* (Fabricius, 1775)
  - *fuscirostre flachi* (Wagner, 1906)
  - *fuscirostre fuscirostre* (Fabricius, 1775)
  - *genistae* (Kirby, 1811)
  - *laufferi* (Schilsky, 1906)
  - *laufferi laufferi* (Schilsky, 1906)
  - *laufferi paganettii* (Wagner, 1914)
  - *lemovicinum* (Hoffmann, 1929)
  - *oblongulum* (Desbrochers des Loges, 1875)
  - *putonii* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
  - *reysi* (Desbrochers des Loges, 1897) (+)
  - *subparallellum* (Desbrochers des Loges, 1888)
  - *uliciperda* (Pandellé, 1867)
  - *ulicis* (Forster, 1771)
  - *wagnerianum* Schatzmayr, 1925
  - *difficile* (Herbst, 1797)
- Lepidapion* Schilsky, 1906
- Lepidapion* (*Hidryocneme*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *cretaceum* (Rosenhauer, 1856)
- Lepidapion* (*Lepidapion*) Schilsky, 1906
- *acuminatum* (Schilsky, 1906)
  - *argentatum* (Gerstaecker, 1854)
  - *argentatum argentatum* (Gerstaecker, 1854)
  - *gallaecianum* (Desbrochers des Loges, 1894)
  - *plagiatum* (Desbrochers des Loges, 1891)
  - *squamidorsum* (Desbrochers des Loges, 1908)
  - *squamigerum* (Jacquelin du Val, 1854)

#### Ixapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Ixapion* Roudier & Tempère, 1973
- *variegatum* (Wencker, 1864)

#### Kalcapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Kalcapion* Schilsky, 1906
- *pallipes* (Kirby, 1808)
  - *semivittatum* (Gyllenhal, 1833)
  - *semivittatum semivittatum* (Gyllenhal, 1833)
  - *separandum* (Aubé, 1866)
- Melanapion* Wagner, 1930
- Melanapion* (*Melanapion*) Wagner, 1930
- *minimum* (Herbst, 1797)
- Squamapion* Bokor, 1923
- *atomarium* (Kirby, 1808)
  - *cineraceum* (Wencker, 1864)
  - *elongatum* (Germar, 1817)
  - *flavimanum* (Gyllenhal, 1833)
  - *leucophaeatum* (Wencker, 1864)
  - *minutissimum* (Rosenhauer, 1856)

- *origani* (Planet, 1918)
  - *vicinum* (Kirby, 1808)
- Taeniapion* Schilsky, 1906
- *rufescens* (Gyllenhal, 1833)
  - *rufulum* (Wencker, 1864)
  - *urticarium* (Herbst, 1784)
  - *urticarium urticarium* (Herbst, 1784)

#### Malvapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Malvapion* Hoffmann, 1958
- *malvae* (Fabricius, 1775)
- Pseudapion* Schilsky, 1906
- *fulvirostre* (Gyllenhal, 1833)
  - *moschatae* (Hoffmann, 1938)
  - *rufirostre* (Fabricius, 1775)
- Rhopalapion* Schilsky, 1906
- *longirostre* (Olivier, 1807)

#### Metapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- Metapion* Schilsky, 1906
- *candidum* (Wencker, 1864)
  - *candidum candidum* (Wencker, 1864)
  - *hartmanni* (Desbrochers des Loges, 1897)
  - *subcandidum* (Schilsky, 1902)

#### Oxystomatina Alonso-Zarazaga, 1990

- Cyanapion* Bokor, 1923
- Cyanapion* (*Bothryorrhynchapion*) Bokor, 1923
- *afér* (Gyllenhal, 1833)
  - *gyllenhalii* (Kirby, 1808)
  - *platalea* (Germar, 1817)
- Cyanapion* (*Cyanapion*) Bokor, 1923
- *alcyoneum* (Germar, 1817) [~ *hispanicum* (Wencker, 1864)]
  - *columbinum* (Germar, 1817) (+)
- Eutrichapion* Reitter, 1916
- Eutrichapion* (*Cnemapion*) Bokor, 1923
- *vorax* (Herbst, 1797)
- Eutrichapion* (*Eutrichapion*) Reitter, 1916
- *ervi* (Kirby, 1808)
  - *mystriophorum* Alonso-Zarazaga, 1994
  - *viciae* (Paykull, 1800)
- Eutrichapion* (*Psilocalymma*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *punctiger* (Paykull, 1792)
  - *arrogans* (Wencker, 1858) (+)
- Hemitrichapion* Voss, 1959
- Hemitrichapion* (*Dimesomyops*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *andalusiacum* (Desbrochers des Loges, 1889)
  - *pavidum* (Germar, 1817)
  - *rapulum* (Wencker, 1864) (-)
- Hemitrichapion* (*Lotapion*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *sandovali* (Ferragu, 1957)
  - *wagneri* (Flach, 1906)
- Hemitrichapion* (*Tinocyba*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *filicorne* (Wencker, 1864)
  - *lanigerum* (Gemming, 1871)
  - *reflexum* (Gyllenhal, 1833)
  - *juniperi* (Boheman, 1839) (-)
  - *waltoni* (Stephens, 1839) (-)
- Holotrichapion* Györffy, 1956
- Holotrichapion* (*Apiops*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *pisi* (Fabricius, 1801)
- Holotrichapion* (*Holotrichapion*) Györffy, 1956
- *ononis* (Kirby, 1808)
  - *saturnium* (Normand, 1937) (+)
- Holotrichapion* (*Legaricapion*) Ehret, 1990
- *aethiops* (Herbst, 1797)

- *gracilicolle* (Gyllenhal, 1839)
- Ischnopterapion* Bokor, 1923
- Ischnopterapion* (*Chlorapion*) Györfy, 1956
- *cognatum* (Hochhuth, 1851)
  - *virens* (Herbst, 1797)
  - *subglabrum* (Desbrochers des Loges, 1870) (-)
- Ischnopterapion* (*Ischnopterapion*) Bokor, 1923
- *aeneomicans* (Wencker, 1864)
  - *aeneomicans aeneomicans* (Wencker, 1864)
  - *fairmairei* (Wencker, 1864)
  - *loti* (Kirby, 1808)
  - *modestum* (Germar, 1817)
  - *plumbeomicans* (Rosenhauer, 1856)
  - *plumbeomicans pericarti* (Ehret, 1991) (+)
  - *plumbeomicans plumbeomicans* (Rosenhauer, 1856)
- Mesotríchapion* Györfy, 1956
- *punctirostre* (Gyllenhal, 1839) (+)
- Oryxolaemus* Alonso-Zarazaga, 1990
- *scabiosus* (Weise, 1889)
  - *flavifemoratus* (Herbst, 1797)
  - *croceifemoratus* (Gyllenhal, 1839)
- Oxystoma* Duméril, 1805
- *craccae* (Linnaeus, 1767)
  - *dimidiatum* Desbrochers des Loges, 1897
  - *ochropus* (Germar, 1818)
  - *opeticum* (Bach, 1854) (+)
  - *pomonae* (Fabricius, 1798)
  - *subulatum* (Kirby, 1808) (+)
  - *cerdo* (Gerstäcker, 1854) (+)
- Pirapion* Reitter, 1916
- *immune* (Kirby, 1808)
- Protopirapion* Alonso-Zarazaga, 1990
- *atratum* (Germar, 1817)
  - *kraatzii* (Wencker, 1859)
- Stenopterapion* Bokor, 1923
- Stenopterapion* (*Cobosiotherium*) Alonso-Zarazaga, 1990
- *cantabricum* (Desbrochers des Loges, 1869)
  - *dubium* (Desbrochers des Loges, 1896)
  - *scutellare* (Kirby, 1811)
  - *subsquamosum* (Desbrochers des Loges, 1891)
- Stenopterapion* (*Stenopterapion*) Bokor, 1923
- *intermedium* (Eppelsheim, 1875) (+)
  - *meliloti* (Kirby, 1808)
  - *tenue* (Kirby, 1808)
- Piezotrachelina Voss, 1959**
- Protapion* Schilsky, 1908
- *apricans* (Herbst, 1797)
  - *assimile* (Kirby, 1808)
  - *assimile assimile* (Kirby, 1808)
  - *dentipes* (Gerstäcker, 1854)
  - *dissimile* (Germar, 1817)
  - *fulvipes* (Geoffroy, 1785)
  - *fulvipes fulvipes* (Geoffroy, 1785)
  - *interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895)
  - *interjectum interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895)
  - *laevicolle* (Kirby, 1811)
  - *nigricrus* (Desbrochers des Loges, 1895) [~ *ruficroides* (Dieckmann, 1973)]
  - *nigritarse* (Kirby, 1808)
  - *ocularium* (Desbrochers des Loges, 1895) [~ *mediterraneum* (Wagner, 1908)]
  - *ononidis* (Gyllenhal, 1827)
  - *pedale* (Mulsant & Rey, 1859)
  - *schoenherri* (Boheman, 1839)
  - *trifolii* (Linnaeus, 1768)

- *varipes* (Germar, 1817)
  - *difforme* (Germar, 1818) (-)
  - *filirostre* (Kirby, 1808) (+)
  - *gracilipes* (Dietrich, 1857) (+)
- Pseudoprotapion* Ehret, 1990
- *alonsochrysimimus* Russell & Velázquez de Castro, 2015 (+)
  - *dumeei* (Hoffmann, 1957) (+)
  - *tricarinatum* (Waltl, 1835) (+)
  - *astragali* (Paykull, 1800)
  - *elegantulum* (Germar, 1818)

#### **Trichapiina Alonso-Zarazaga, 1990**

- Betulapion* Ehret, 1994
- *simile* (Kirby, 1811)
  - *simile simile* (Kirby, 1811)

#### **Podapiini Wanat, 2001**

- Podapion* Riley, 1883
- *baenai* Alonso-Zarazaga, 1998

Incertae sedis

*Apion nigrocyaneum* Beguin-Billecocq, 1909

### **BRENTINAE Billberg, 1820**

#### **Brentini Billberg, 1820**

#### **Arrhenodina Lacordaire, 1865**

- Orfilaia* Haedo Rossi, 1955
- *reichei* (Fairmaire, 1859)

#### **Eremoxenina Semenov, 1892**

- Amorphocephala* Damoiseau, 1966
- *coronata* (Germar, 1817)

### **NANOPHYINAE Gistel, 1848**

#### **Corimaliini Alonso-Zarazaga, 1989**

- Allomalía* Alonso-Zarazaga, 1989
- *quadrivirgata* (Costa, 1863)
- Corimalia* Gozis, 1885
- *martini* (H. Brisout de Barneville, 1883) (+)
  - *pallida* (Olivier, 1807)
  - *postica* (Gyllenhal, 1838)
  - *tamarisci* (Gyllenhal, 1838)
  - *tetrastigma* (Aubé, 1863)
- Hypophyes* Reitter, 1916
- *minutissimus* (Tourmier, 1867)
  - *pallidulus* (Gravenhorst, 1807)

#### **Nanophyini Gistel, 1848**

- Ctenomeropsis* Voss, 1939
- *nigra* (Waltl, 1835)
- Dieckmanniellus* Alonso-Zarazaga, 1989
- *chevrieri* (Boheman, 1845) [~ *helveticus* (Tourmier, 1867)]
  - *gracilis* (L. Redtenbacher, 1847)
  - *nitidulus* (Gyllenhal, 1838)
- Microon* Alonso-Zarazaga, 1989
- *sahlbergi* (Sahlberg, C. R., 1835)
- Nanodiscus* Kiesenwetter, 1864
- *transversus* (Aubé, 1850)
- Nanomimus* Alonso-Zarazaga, 1989
- *hemisphaericus* (Olivier, 1807)
- Nanophyes* Schoenherr, 1838
- *brevis* Boheman, 1845
  - *brevis bleusei* Pic, 1900
  - *globiformis* Kiesenwetter, 1864
  - *globulus* (Germar, 1821)
  - *marmoratus* (Goeze, 1777)

- *marmoratus marmoratus* (Goeze, 1777)
  - *poecilopterus* Brisout de Barneville, H., 1869
  - *poecilopterus poecilopterus* Brisout de Barneville, H., 1869
  - *rubricus* Rosenhauer, 1856
  - *brevis fallax* Rey, 1893 (-)
- Pericartiellus* Alonso-Zarazaga, 1989
- *durieui* (Lucas, 1846)
  - *flavidus* (Aubé, 1850)

## CURCULIONIDAE Latreille, 1802 s.l.

### BAGOINAE Thomson, 1859

- Bagous* Germar, 1817
- Bagous* (*Bagous*) Germar, 1817
- *lutulentus* (Gyllenhal, 1813) (+)
  - *robustus* Brisout de Barneville, H., 1863 (+)
  - *glabrirostris* (Herbst, 1795)
  - *subcarinatus* Gyllenhal, 1836
- Bagous* (*Macropelmus*) Dejean, 1821
- *argillaceus* Gyllenhal, 1836
  - *cylindricus* Rosenhauer, 1856
  - *exilis* Jacquelin du Val, 1854
  - *fuentei* Pic, 1908
  - *limosus* (Gyllenhal, 1827)
  - *lutulosus* (Gyllenhal, 1827)
  - *perparvulus* Rosenhauer, 1856
  - *revelieri* Tournier, 1874
  - *sardiniensis* Brisout de Barneville, H., 1863
  - *septemcostatus* Chevrolat, 1860
  - *subruber* Reitter, 1890
  - *tempestivus* (Herbst, 1795)
  - *vivesi* González, 1967
  - *biimpressus* Fähræus, 1845
  - *claudicans* Boheman, 1845
  - *diglyptus* Boheman, 1845
  - *frit* (Herbst, 1795)
  - *lutosus* (Gyllenhal, 1813)
- Bagous* (*Parabagous*) Schilsky, 1977
- *andalusiacus* González, 1971
  - *chevrolati* Tournier, 1874
  - *franzi* González, 1967
  - *gracilentus* Desbrochers des Loges, 1896
  - *guttatus* Desbrochers des Loges, 1896
  - *ibericus* González, 1971
  - *rudicollis* Desbrochers des Loges, 1896

### BRACHYCERINAE Billberg, 1820

#### Brachycerini Billberg, 1820

- Brachycerus* Olivier, 1789
- *balearicus* Bedel, 1874
  - *barbarus* (Linnaeus, 1758)
  - *barbarus lateralis* Gyllenhal, 1833
  - *barbarus ramosus* L.W. Schaufuss, 1882
  - *callosus* Schoenherr, 1833
  - *muricatus* Olivier, 1790
  - *plicatus* Gyllenhal, 1833
  - *pradieri* Fairmaire, 1857
  - *pradieri pradieri* Fairmaire, 1857
  - *repertus* Roudier, 1958
  - *rotundicollis* Escalera, 1918
  - *undatus* Fabricius, 1798
  - *foveicollis* Gyllenhal, 1833 (-)
  - *lutosus* Gyllenhal, 1833 (-)

#### Erihrinini Schoenherr, 1825

#### Erihrinina Schoenherr, 1825

- Notaris* Germar, 1817
- *acridulus* (Linnaeus, 1758) [~ *montanus* Faust, 1882]
  - *scirpi* (Fabricius, 1792)
- Procas* Stephens, 1831
- *armillatus* (Fabricius, 1801)
  - *granulicollis* Walton, 1848 (+)
  - *michaelis* Thompson, 2006 (+)
  - *picipes* (Marsham, 1802)
  - *picipes picipes* (Marsham, 1802) [~ *minutus* Desbrochers des Loges, 1893]
  - *rasus* Desbrochers des Loges, 1897
- Thryogenes* Bedel, 1884
- *festucae* (Herbst, 1795)

#### Ocladiina Lacordaire, 1865

- Ocladius* Schoenherr, 1825
- *grandii* Osella & Meregalli, 1986

#### Raymondionimini Reitter, 1913

- Alaocephala* Ganglbauer, 1906
- *delarouzei* (Brisout de Barneville, Ch., 1862)
  - *delarouzei catalonica* Osella, 1977
- Coiffaitiella* Osella, 1977
- *benjamini* (Marquet, 1875)
  - *benjamini aurouxi* (González, 1965)
  - *benjamini benjamini* (Marquet, 1875)
  - *carinirostris* (Osella, 1971)
  - *hispanica* (Osella, 1971)
  - *lusitanica* (Osella, 1971)
  - *remilleti* (Osella, 1971)
- Raymondionymus* Wollaston, 1873
- *perrisi* (Grenier, 1864)

#### Tanysphyrini Gistel, 1848

- Stenopelmus* Schoenherr, 1835
- *rufinasus* Gyllenhal, 1835 (+)
- Tanysphyrus* Germar, 1817
- *lemnæ* (Fabricius, 1792) (+)

## CONODERINAE Schoenherr, 1833

### BARIDITAE Schoenherr, 1836

#### Apostasimerini Schoenherr, 1844

#### Zygobaridina Pierce, 1907

- Limnobaris* Bedel, 1885
- *t-album* (Linnaeus, 1758)
- Linogeraeus* Casey, 1920
- *punctatissimus* (Boheman, 1836) (+)

#### Baridini Schoenherr, 1836

#### Baridina Schoenherr, 1836

- Aulacobaris* Desbrochers des Loges, 1892
- *andalusiaca* (Brisout de Barneville, H., 1870)
  - *caerulescens* (Scopoli, 1763)
  - *caerulescens caerulescens* (Scopoli, 1763)
  - *chlorizans* (Germar, 1824)
  - *corinthia* (Desbrochers des Loges, 1892)
  - *corsicana* (Schultze, 1904)
  - *cuprirostris* (Fabricius, 1787)
  - *cuprirostris cuprirostris* (Fabricius, 1787)
  - *fallax* (Brisout de Barneville, H., 1870)
  - *gudenusi* (Schultze, 1901) (+)
  - *gudenusi gudenusi* (Schultze, 1901) (+)
  - *ignifer* (Fuente, 1901)

- *janthina* (Boheman, 1836)
  - *lepidii* (Germar, 1823)
  - *malachitica* Chevrolat, 1860
  - *nivalis* (Brisout de Barneville, H., 1870)
  - *pertusa* (Kiesenwetter, 1864)
  - *picicornis* (Marsham, 1802)
  - *picicornis picicornis* (Marsham, 1802)
  - *prasina* (Boheman, 1836)
  - *prasina alcaidei* (Hoffmann, 1957)
  - *prasina prasina* (Boheman, 1836)
  - *viridipennis* (Rosenhauer, 1856)
  - *angusta* (Brullé, 1832)
  - *angusta angusta* (Brullé, 1832)
- Baris* Germar, 1817
- *analisis* (Olivier, 1790)
  - *analisis analis* (Olivier, 1790)
  - *rufa* (Boheman, 1844)
  - *limbata* (Brisout de Barneville, H., 1870)
- Cosmobaris* Casey, 1920
- *scolopacea* (Germar, 1819)
- Eremobaris* Zaslavskij, 1956
- *picturata* (Ménétriés, 1849) (◄) [~ *opiparis* (Jacquelin du Val, 1853)]
- Labiaticola* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
- *korbi* (Schulze, 1900)
  - *teruelensis* (Hustache, 1927)
  - *melas* (Boheman, 1836)
- Malvaevora* Zaslavskij, 1956
- *timida* (Rossi, 1792)
  - *timida timida* (Rossi, 1792)
- Maurobaris* Alonso-Zarazaga, 2005
- *spoliata* (Boheman, 1836) (◄)
- Melaleucus* Chevrolat, 1883
- *sellatus* (Boheman, 1844)
- Melanobaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
- *atronitens* (Chevrolat, 1861)
  - *atronitens atronitens* (Chevrolat, 1861)
  - *elevata* (Reitter, 1899)
  - *erysimi* (Chobaut, 1917)
  - *erysimi erysimi* (Chobaut, 1917) (+)
  - *erysimi erysimioides* (Hoffmann, 1942)
  - *laticollis* (Marsham, 1802)
  - *morio* (Boheman, 1844)
  - *pyrenaica* (Hoffmann, 1933)
  - *quadraticollis* (Boheman, 1836)
  - *quadraticollis quadraticollis* (Boheman, 1836)
  - *sinapis* (Normand, 1937) (+)
  - *atramentaria* (Boheman, 1836)

#### Madarini Jekel, 1865

#### Leptoschoinina Lacordaire, 1865

- Arganthonius* Alonso-Zarazaga, 2005
- *albomaculatus* (Brisout de Barneville, H., 1867) (◄)
  - *novaki* (Penecke, 1936) (◄)

### CEUTORHYNCHITAE Gistel, 1848

#### Amalini Wagner, 1936

- Amalus* Schoenherr, 1825
- *scortillum* (Herbst, 1795)

#### Ceutorhynchini Gistel, 1848

- Amalorrhynchus* Reitter, 1913
- *melanarius* (Stephens, 1831) (+)
- Atlantonyx* Korotyaev, 1999
- *hispanicus* (Colonnelli, 1995) (◄)
  - *lopezcoloni* (Korotyaev & Alonso-Zarazaga, 2010) (◄)

- Baryoxyonyx* Hustache, 1931
- *retractus* (Peyerimhoff, 1925)
- Calosirus* C. G. Thomson, 1859
- *apicalis* (Gyllenhal, 1827)
  - *terminatus* (Herbst, 1795)
- Ceutorhynchus* Germar, 1823
- *aeneicollis* Germar, 1823
  - *alternans* Brisout de Barneville, Ch., 1869
  - *assimilis* (Paykull, 1792)
  - *atomus* Boheman, 1845
  - *barbareae* Suffrian, 1847
  - *carinatus* Gyllenhal, 1837
  - *chalybaeus* Germar, 1823
  - *chlorophanus* Rouget, 1858 (+)
  - *coarctatus* Gyllenhal, 1837
  - *cochleariae* (Gyllenhal, 1813) (+)
  - *coerulescens* Gyllenhal, 1837
  - *constrictus* (Marsham, 1802)
  - *contractus* (Marsham, 1802) (~ *minutus* (Reich, 1797))
  - *curtulus* Schultze, 1903
  - *cyaneotinctus* Colonnelli, 2005 (+)
  - *duvali* Brisout de Barneville, Ch., 1869 (+)
  - *erysimi* (Fabricius, 1787)
  - *fallax* Boheman, 1845 (+)
  - *flavomarginatus* Lucas, 1846
  - *fulvipes* Schultze, 1895
  - *fulvitaris* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860
  - *gallorhenanus* F. Solari, 1949
  - *gilvirostris* K. Daniel, 1914 (+)
  - *gracilis* Dieckmann & Smreczyński, 1972
  - *grenieri* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860
  - *griseus* C. Brisout de Barneville, 1869 (+)
  - *gypsophilus* Colonnelli, 2000
  - *hirtulus* Germar, 1823
  - *ignitus* Germar, 1823
  - *inaffectatus* Gyllenhal, 1837
  - *insidiosus* Brisout de Barneville, Ch., 1869
  - *intersetosus* Weise, 1883
  - *laetus* Rosenhauer, 1856
  - *lepidi* Hoffmann, 1955 (+)
  - *leprieuri* Brisout de Barneville, Ch., 1881
  - *leucorhamma* Rosenhauer, 1856
  - *major* Escalera, 1914 (~ *sardeanensis* Schultze, 1903)
  - *micans* Brisout de Barneville, Ch., 1869
  - *mohri* Dieckmann, 1960
  - *napi* Gyllenhal, 1837
  - *nevadensis* Hoffmann, 1960
  - *obstrictus* (Marsham, 1802)
  - *pallidactylus* (Marsham, 1802)
  - *pandellei* C. Brisout de Barneville, 1869 (+)
  - *parvulus* C. Brisout de Barneville, 1869 (+)
  - *pectoralis* Weise, 1895
  - *perrisi* Brisout de Barneville, Ch., 1869
  - *peyerimhoffi* Hustache, 1916 (+)
  - *pictarsis* Gyllenhal, 1837
  - *posthumus* Germar, 1823
  - *pulvinatus* Gyllenhal, 1837
  - *pumilio* (Gyllenhal, 1827)
  - *puncticollis* Boheman, 1845
  - *pyrenaicus* Brisout de Barneville, Ch., 1869
  - *pyrrhorhynchus* (Marsham, 1802)
  - *querceti* (Gyllenhal, 1813)
  - *rapae* Gyllenhal, 1837
  - *resedae* (Marsham, 1802)
  - *rhenanus* (Schultze, 1895)
  - *roberti* Gyllenhal, 1837 (+)

- *romani* Colonnelli, 2005 (+)
- *rufipes* Brisout de Barneville, Ch., 1869
- *rugicollis* Brisout de Barneville, Ch., 1869
- *rusticus* Gyllenhal, 1837
- *similis* C. Brisout de Barneville, 1869 (+)
- *sophiae* Gyllenhal, 1837 (+)
- *squamulosus* Brisout de Barneville, Ch., 1869
- *steineri* Roudier, 1957
- *striatellus* Schultzze, 1900
- *subpilosus* Brisout de Barneville, Ch., 1869
- *sulcatus* C. Brisout de Barneville, 1869 (+)
- *sulcicollis* (Paykull, 1800)
- *syrites* Germar, 1823
- *talickyi* Korotyaev, 1980 (+)
- *tenuirostris* Rosenhauer, 1856
- *thlaspi* Brisout de Barneville, Ch., 1869 (+)
- *tibialis* Boheman, 1845
- *typhae* (Herbst, 1795)
- *unguicularis* C.G. Thomson, 1871 (+)
- *villiersi* Tempère, 1984 (+)
- *viridanus* Gyllenhal, 1837
- *viridipennis* Brisout de Barneville, Ch., 1869
- Coeliastes* Weise, 1883
  - *lamii* (Fabricius, 1792)
- Coeliodes* Schoenherr, 1837
  - *ilicis* (Bedel, 1885)
  - *rana* (Fabricius, 1787)
  - *ruber* (Marsham, 1802)
  - *transversealbofasciatus* (Goeze, 1777)
  - *trifasciatus* Bach, 1854
- Coeliodinus* Dieckmann, 1972
  - *phrymos* Alonso-Zarazaga & Colonnelli, 2017 (+)
- Datonychus* Wagner, 1944
  - *arquata* (Herbst, 1795)
  - *delicatulus* (Hustache, 1946) (+)
  - *melanostictus* (Marsham, 1802)
  - *urticae* (Boheman, 1845)
- Drupenatus* Reitter, 1913
  - *nasturtii* (Germar, 1823)
- Ectamnogaster* Schultzze, 1903
  - *caviventris* (Schultzze, 1897)
- Ethelcus* Reitter, 1916
  - *denticulatus* (Schrank, 1781)
- Glocianus* Reitter, 1916
  - *africanus* (Schultzze, 1899)
  - *distinctus* (Brisout de Barneville, Ch., 1870)
  - *fennicus* (Faust, 1895)
  - *granulithorax* (Schultzze, 1900)
  - *inhumeralis* (Schultzze, 1897)
  - *lethierryi* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
  - *maculaalba* (Herbst, 1795)
  - *nebulosus* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
  - *pilosellus* (Gyllenhal, 1837)
  - *punctiger* (Sahlberg, C.R., 1835)
- Hadroplontus* Thomson, C. G., 1859
  - *litura* (Fabricius, 1775)
  - *trimaculatus* (Fabricius, 1775)
- Mesoxonyx* Korotyaev, 1997
  - *hispanicus* (Hustache, 1926)
  - *sicardi* (Hustache, 1931)
- Micrelus* Thomson, C. G., 1859
  - *ericae* (Gyllenhal, 1813)
  - *ferrugatus* (Perris, 1847)
- Microplontus* Wagner, 1944
  - *atlanticus* (Dieckmann, 1982) (+)
  - *campestris* (Gyllenhal, 1837)
- *molitor* (Gyllenhal, 1837)
- *rugulosus* (Herbst, 1795)
- Mogulones* Reitter, 1916
  - *abbreviatulus* (Fabricius, 1792)
  - *angulicollis* (Schultzze, 1897) (+)
  - *annibal* Desbrochers des Loges, 1896 (+)
  - *arcasti* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
  - *asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)
  - *aubei* (Boheman, 1845) (+)
  - *borraginis* (Fabricius, 1792)
  - *cingulatus* (Schultzze, 1897)
  - *crucifer* (Pallas, 1771)
  - *diecki* (Brisout de Barneville, Ch., 1870)
  - *geographicus* (Goeze, 1777)
  - *gibbicollis* (Schultzze, 1897)
  - *gratiosus* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
  - *larvatus* (Schultzze, 1897)
  - *peregrinus* (Gyllenhal, 1837)
  - *soricinus* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
  - *tessellatus* (Schultzze, 1899)
    - *andreae* (Germar, 1824) (+)
    - *t-album* (Gyllenhal, 1837) (+)
- Mogulonoides* Colonnelli, 1986
  - *radula* (Germar, 1823) (+)
- Nedyus* Schoenherr, 1825
  - *quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758)
- Neoxonyx* Hoffmann, 1930
  - *monticola* (Desbrochers des Loges, 1896) (+)
- Oprohinus* Reitter, 1916
  - *picipennis* (Schultzze, 1898)
  - *suturalis* (Fabricius, 1775)
- Paracoeliodes* Colonnelli, 1979
  - *conformis* (Grilat, 1887)
- Parethelcus* Wagner, 1943
  - *pollinarius* (Forster, 1771)
- Paroxyonyx* Hustache, 1931
  - *audisioi* Colonnelli, 2005 (+)
  - *cinctus* (Chevrolat, 1861)
  - *imitator* (Wagner, 1928)
    - *fallaciosus* (Desbrochers des Loges, 1896)
- Phrydiuchus* Gozis, 1885
  - *quijote* Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1996
  - *topiarius* (Germar, 1823)
- Prisistus* Reitter, 1916
  - *biscutellatus* (Chevrolat, 1859)
  - *obsoletus* (Germar, 1823)
- Ranunculiphilus* Dieckmann, 1969
  - *Ranunculiphilus (Austroceptorhynchus)* Korotyaev, 1980
    - *italicus* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
  - *Ranunculiphilus (Ranunculiphilus)* Dieckmann, 1969
    - *faeculentus* (Gyllenhal, 1837)
    - *obscurus* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
- Sirocalodes* Voss, 1958
  - *depressicollis* (Gyllenhal, 1813)
  - *mixtus* (Mulsant & Rey, 1859)
  - *quercicola* (Paykull, 1792)
- Stenocarus* Thomson, C. G., 1859
  - *cardui* (Herbst, 1784)
  - *ruficornis* (Stephens, 1831)
- Thamiocolus* Thomson, C. G., 1859
  - *kraatzii* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
  - *niveus* (Chevrolat, 1859)
  - *pubicollis* (Gyllenhal, 1837)
  - *subulatus* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
- Trichosirocalus* Colonnelli, 1979
  - *barnevillei* (Grenier, 1866)

- *briesei* Alonso-Zarazaga & Sánchez-Ruiz, 2002
- *dawsoni* (Brisout de Barneville, Ch., 1869)
- *histris* (Perris, 1852)
- *horridus* (Panzer, 1801)
- *rufulus* (Dufour, 1851)
- *trogodytes* (Fabricius, 1787)
- *urens* (Gyllenhal, 1837)

*Zacladus* Reitter, 1912

- *exiguus* (Olivier, 1807)
- *geranii* (Paykull, 1800)

#### Hypurini

*Aphytobius* Wagner, 1937

- *fuentei* (Desbrochers des Loges, 1908)
- *luctuosus* (Desbrochers des Loges, 1896) (-)

*Hypurus* Rey, 1882

- *bertrandi* (Perris, 1852)

*Oreorrhynchaeus* Otto, 1894

- *hispanicus* Wagner, 1941

*Pseudophytobius* Desbrochers des Loges, 1884

- *acaloides* (Fairmaire, 1857)
- *acaloides acaloides* (Fairmaire, 1857) (+)
- *acaloides saltator* Desbrochers des Loges, 1884

#### Mononychini LeConte, 1876

*Mononychus* Germar, 1823

- *punctumalbum* (Herbst, 1784)
- *superciliaris* Boheman, 1844

#### Phytobiini Gistel, 1848

*Neophytobius* Wagner, 1936

- *granatus* (Gyllenhal, 1835)
- *quadrinodosus* (Gyllenhal, 1813)

*Pelenomus* Thomson, C.G., 1859

- *canaliculatus* (Fähræus, 1843) (+)
- *commari* (Panzer, 1795)
- *olssoni* (Israelson, 1972)
- *quadricorniger* (Colonnelli, 1986)
- *quadrituberculatus* (Fabricius, 1787)
- *waltoni* (Boheman, 1843)

*Phytobius* Schoenherr, 1833

- *leucogaster* (Marsham, 1802)

*Rhinoncus* Schoenherr, 1825

- *bruchoides* (Herbst, 1784)
- *inconspectus* (Herbst, 1795)
- *leucostigma* (Marsham, 1802) [~ *castor* (Fabricius, 1792) sensu auct.]
- *pericarpus* (Linnaeus, 1758)
- *perpendicularis* (Reich, 1797)

### CONODERITAE Schoenherr, 1833

#### Coryssomerini C.G. Thomson, 1859

*Coryssomerus* Schoenherr, 1825

- *capucinus* (Beck, 1817)

### OROBITIDITAE C.G. Thomson, 1859

#### Orobittidini C.G. Thomson, 1859

*Orobittis* Germar, 1817

- *cyanea* (Linnaeus, 1758)

### COSSONINAE Schoenherr, 1825

#### Choerorhinini Folwaczny, 1973

*Choerorhinus* Fairmaire, 1858

- *squalidus* Fairmaire, 1858

### Cossonini Schoenherr, 1825

*Cossonus* [Clairville], 1798

*Cossonus* (*Caenocossonus*) Voss, 1955

- *paralelepipedus* (Herbst, 1795)
- Cossonus* (*Cossonus*) [Clairville], 1798
- *linearis* (Fabricius, 1775)

*Mesites* Schoenherr, 1838

*Mesites* (*Mesites*) Schoenherr, 1838

- *aquitanus* Fairmaire, 1859
- *cunipes* Boheman, 1838
- *pallidipennis* Boheman, 1838

#### Dryotribini LeConte, 1876

*Amaurorhinus* Fairmaire, 1860

*Amaurorhinus* (*Amaurorhinus*) Fairmaire, 1860

- *bewickianus* (Wollaston, 1860)
- Amaurorhinus* (*Mazagranus*) Pic, 1905

- *obscuripennis* Pic, 1905

*Caulophilus* Wollaston, 1854

- *oryzae* (Gyllenhal, 1838) (+)

*Cotaster* Motschulsky, 1851

- *uncipes* Boheman, 1838
- *uncipes uncipes* Boheman, 1838 (~ *cuneipennis* (Aubé, 1850) sensu auct.)

*Pentatemnus* Wollaston, 1861

- *ochotorenai* Alonso-Zarazaga, 1996

#### Onycholipini Wollaston, 1873

*Brachytemnus* Wollaston, 1873

- *porcatus* (Germar, 1823)

*Hexarthrum* Wollaston, 1860

- *capitulum* (Wollaston, 1858)
- *duplicatum* Folwaczny, 1966 (+)
- *exiguum* (Boheman, 1838)

*Pselactus* Broun, 1866

- *spadix* (Herbst, 1795)
- *spadix spadix* (Herbst, 1795)

*Pseudophloeophagus* Wollaston, 1873

- *truncorum* (Stephens, 1831) (~ *aeneopiceus* (Boheman, 1845))

*Stenoscelis* Wollaston, 1861

*Stenoscelis* (*Stenoscelis*) Wollaston, 1861

- *submuricata* (Schoenherr, 1832)

*Stereocorynes* Wollaston, 1873

- *truncorum* (Germar, 1824)

#### Pentarthrini

*Euophryum* Broun, 1909

- *rufum* (Broun, 1880)

*Pentarthrum* Wollaston, 1854

- *huttoni* Wollaston, 1854

#### Rhyncolini

##### Phloeophagina

*Melicius* Alonso-Zarazaga, 2002

- *cylindrus* (Boheman, 1838)
- *gracilis* (Rosenhauer, 1856)

*Phloeophagus* Schoenherr, 1838

- *lignarius* (Marsham, 1802)
- *thomsoni* (Grill, 1896)

##### Rhyncolina

*Aphanommata* Wollaston, 1873

- *filum* (Mulsant & Rey, 1859)

*Rhyncolus* Germar, 1817

*Rhyncolus* (*Axenomimetes*) Voss, 1955

- *reflexus* Boheman, 1838

*Rhyncolus (Rhyncolus)* Germar, 1817

- *ater* (Linnaeus, 1758)
- *ater ater* (Linnaeus, 1758)
- *elongatus* (Gyllenhal, 1827)
- *punctatulus* Boheman, 1838
- *sculpturatus* Waltl, 1839
- *strangulatus* Perris, 1852

## CURCULIONINAE Latreille, 1802

### Acalyptini C.G. Thomson, 1859

*Acalyptus* Schoenherr, 1833

- *carpini* (Fabricius, 1792)

### Acentrusini Alonso-Zarazaga, 2005

*Acentrus* Desmarest, 1839

- *histrion* (Schoenherr, 1837)

### Anoplini Bedel, 1884

*Anoplus* Germar, 1820

- *plantaris* (Næzén, 1794)

### Anthonomini C.G. Thomson, 1859

*Anthonomus* Germar, 1817

*Anthonomus (Anthonomorphus)* Weise, 1883

- *phyllocola* (Herbst, 1795) (+)
- Anthonomus (Anthonomus)* Germar, 1817
- *conspersus* Desbrochers des Loges, 1868 (+)
- *pedicularius* (Linnaeus, 1758)
- *pomorum* (Linnaeus, 1758)
- *pyri* Gyllenhal, 1835 (~ *piri* Kollar, 1837)
- *rubi* (Herbst, 1795)
- *rufus* Gyllenhal, 1835 (+)
- *pilotus* L. Redtenbacher, 1847
- *ulmi* (DeGeer, 1775)

*Anthonomus (Furcipes)* Desbrochers des Loges, 1868

- *rectirostris* (Linnaeus, 1758)

*Brachonyx* Schoenherr, 1825

- *pineti* (Paykull, 1792)

*Bradybatus* Germar, 1824

*Bradybatus (Bradybatus)* Germar, 1824

- *kellneri* Bach, 1854
- Bradybatus (Nothops)* Marseul, 1868
- *elongatulus* (Boheman, 1843)

*Sphincticraerus* Marseul, 1871

- *lethierryi* (Desbrochers des Loges, 1869)

### Cionini Schoenherr, 1825

*Cionellus* Reitter, 1904

- *gibbifrons* (Kiesenwetter, 1852)

*Cionus* Clairville, 1798

- *alauda* (Herbst, 1784)
- *hortulanus* (Geoffroy, 1785)
- *inexpectatus* Tempère, 1961
- *leonhardi* Wingelmüller, 1914
- *longicollis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
- *longicollis longicollis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
- *nigritarsis* Reitter, 1904
- *olens* (Fabricius, 1792)
- *olivieri* Rosenschöld, 1838
- *schoenherri* Brisout de Barneville, Ch., 1863
- *schoenherri schoenherri* Brisout de Barneville, Ch., 1863
- *scrophulariae* (Linnaeus, 1758)
- *thapsus* (Fabricius, 1792)
- *thapsus thapsus* (Fabricius, 1792)
- *tuberculosus* (Scopoli, 1763)
- *ocellatus* Germar, 1821 (+)

*Cleopus* Dejean, 1821

- *pulchellus* (Herbst, 1795)

*Stereonychus* Suffrian, 1854

- *fraxini* (DeGeer, 1775)
- *phyllireae* (Chevrolat, 1859)
- *telonensis* Grenier, 1864

### Curculionini Latreille, 1802

### Archariina Pelsue & O'Brien, 2011

*Archarius* Gistel, 1856

*Archarius (Archarius)* Gistel, 1856

- *crux* (Fabricius, 1777)
- *ochreateus* (Fähræus, 1843)
- *ochreateus ochreateus* (Fähræus, 1843)
- *pyrrhoceras* (Marsham, 1802)
- *salicivorus* (Paykull, 1792)
- *trogodytes* (Jekel, 1861)

### Curculionina Latreille, 1802

*Curculio* Linnaeus, 1758

*Curculio (Curculio)* Linnaeus, 1758

- *betulae* (Stephens, 1831)
- *elephas* (Gyllenhal, 1835)
- *glandium* Marsham, 1802
- *nucum* Linnaeus, 1758
- *pellitus* (Boheman, 1843)
- *venosus* (Gravenhorst, 1807)
- *venosus venosus* (Gravenhorst, 1807)
- *villosus* Fabricius, 1781

### Derelomini Lacordaire, 1865

*Derelomus* Schoenherr, 1825

- *chamaeropsis* (Fabricius, 1798)
- *piriformis* (Hoffmann, 1938) (+)
- *subcostatus* Boheman, 1844

### Ellescini C.G. Thomson, 1859

### Dorytomina Bedel, 1886

*Dorytomus* Germar, 1817

*Dorytomus (Dorytomus)* Germar, 1817

- *dejeani* Faust, 1883
- *filirostris* (Gyllenhal, 1835)
- *ictor* (Herbst, 1795)
- *longimanus* (Forster, 1771)
- *melanophthalmus* (Paykull, 1792)
- *nebulosus* (Gyllenhal, 1835)
- *puberulus* (Boheman, 1843)
- *rubrirostris* (Gravenhorst, 1807) (~ *edoughensis* Desbrochers des Loges, 1875 sensu auctt.)
- *rufatus* (Bedel, 1886)
- *rufatus rufatus* (Bedel, 1886)
- *schoenherri* Faust, 1883
- *schoenherri schoenherri* Faust, 1883
- *taeniatus* (Fabricius, 1781)
- *tortrix* (Linnaeus, 1760)
- *tremulae* (Fabricius, 1787)

### Ellescina C.G. Thomson, 1859

*Ellescus* Dejean, 1821

- *scanicus* (Paykull, 1792)

### Itini Reitter, 1913

*Geranorhinus* Chevrolat, 1860

- *brannanii* L.W. Schaufuss, 1867
- *pusillus* (Motschulsky, 1851)

*Ita* Tournier, 1878

- *hispanica* Meregalli & Borovec, 2011 (~ *crassirostris* Tournier, 1878)



## Mecinini Gistel, 1848

*Cleopomiarus* Pierce, 1919

- *distinctus* (Boheman, 1845)
- *graminis* (Gyllenhal, 1813)
- *meridionalis* (Brisout de Barneville, H., 1863)
- *micros* (Germar, 1821)
- *plantarum* (Germar, 1823)

*Gymnetron* Schoenherr, 1825

- *aper* Desbrochers des Loges, 1892
- *beccabungae* (Linnaeus, 1760)
- *melinum* Reitter, 1872
- *rostellum* (Herbst, 1795)
- *stimulosum* (Germar, 1821) (+)
- *veronicae* (Germar, 1821)
- *villosulum* Gyllenhal, 1838
- *vittipenne* Marseul, 1876 (+)

*Mecinus* Germar, 1821

- *alboscuteallatus* Hustache, 1913
- *alboscuteallatus alboscuteallatus* Hustache, 1913
- *alternans* Kirsch, 1870
- *aubei* Desbrochers des Loges, 1893
- *barbarus* Gyllenhal, 1838 (~ *longiusculus* Boheman, 1845)
- *circulatus* (Marsham, 1802)
- *collaris* Germar, 1821
- *comosus* Boheman, 1845 (~ *setosus* Kiesenwetter, 1864)
- *dorsalis* Aubé, 1850
- *elongatus* (Brisout de Barneville, H., 1862)
- *haemorrhoidalis* (H. Brisout de Barneville, 1862) (+)
- *humeralis* Tournier, 1873 (~ *lineicollis* Reitter, 1907)
- *ictericus* Gyllenhal, 1838 (+)
- *labilis* (Herbst, 1795)
- *latiusculus* (Jacquelin du Val, 1855)
- *pascuorum* (Gyllenhal, 1813)
- *pyraster* (Herbst, 1795) (~ *sublineellus* Fairmaire, 1880)
- *reichei* Tournier, 1873 (+)
- *seriatus* (Jacquet, 1888) (+)
- *sicardi* Hustache, 1920
- *simus* (Mulsant & Rey, 1859)
- *tavaresi* Caldara & Fogato, 2016 (+)
- *tychioides* (Brisout de Barneville, H., 1862) (~ *aestivus* (Hoffmann, 1956))
- *variabilis* (Rosenhauer, 1856)

*Miarus* Schoenherr, 1826

- *campanulae* (Linnaeus, 1767)
- *simplex* F. Solari, 1947 (+)
- *ursinus* Abeille, 1906 (~ *horni* Franz, 1947)
- *abeillei* Desbrochers des Loges, 1893 (+)

*Rhinusa* Stephens, 1829

- *algerica* (Brisout de Barneville, H., 1867)
- *antirrhini* (Paykull, 1800)
- *asellus* (Gravenhorst, 1807) (+)
- *bipustulata* (Rossi, 1792)
- *depressa* (Rottenberg, 1872)
- *fuentei* (Pic, 1906)
- *griseohirta* (Desbrochers des Loges, 1869) (+)
- *herbarum* (Brisout de Barneville, H., 1862)
- *incana* (Kirsch, 1881)
- *lanigera* (Brisout de Barneville, H., 1863)
- *linariae* (Panzer, 1795)
- *melas* (Boheman, 1838) (~ *heydeni* (Desbrochers des Loges, 1869))
- *moroderi* (Reitter, 1906)
- *neta* (Germar, 1821)
- *subrotundula* (Reitter, 1907)
- *tetra* (Fabricius, 1792) (~ *amicta* (Germar, 1821))
- *verbasci* (Rosenschoeld, 1838) (+)

- *vestita* (Germar, 1821)

## Rhamphini Rafinesque, 1815

### Rhamphina Rafinesque, 1815

*Isochnus* Thomson, C.G., 1859

- *foliorum* (O.F. Mueller, 1776)
- *sequensi* (Stierlin, 1894)

*Orchestes* Illiger, 1798

*Orchestes (Alyctus)* C.G. Thomson, 1859

- *rusci* (Herbst, 1795)
  - *testaceus* (O.F. Mueller, 1776)
- Orchestes (Orchestes)* Illiger, 1798
- *alni* (Linnaeus, 1758)
  - *betuleti* (Panzer, 1795) (~ *rufus* (Schränk, 1781))
  - *erythropus* (Germar, 1821) (~ *tricolor* (Kiesenwetter, 1851))
  - *fagi* (Linnaeus, 1758)
  - *fagi fagi* (Linnaeus, 1758)
  - *hortorum* (Fabricius, 1792) (~ *avellanae* (Donovan, 1797))
  - *hungaricus* (Hajóss, 1938)
  - *irroratus* (Kiesenwetter, 1852)
  - *irroratus irroratus* (Kiesenwetter, 1852)
  - *pilosus* (Fabricius, 1781)
  - *quercus* (Linnaeus, 1758)
  - *sparsus* (Fähræus, 1843)

*Pseudorchestes* Bedel, 1894

- *ermischi* (Dieckmann, 1958)
- *flavidus* (Brisout de Barneville, H., 1865)
- *persimilis* (Reitter, 1911)
- *pratensis* (Germar, 1821) (+)
- *tomentosus* (Olivier, 1807)

*Rhamphus* Clairville, 1798

- *cerdanicus* Tempère, 1982
- *pulicarius* (Herbst, 1795)
- *subaeneus* (Illiger, 1807)

*Rhynchaenus* Clairville, 1798

*Rhynchaenus (Rhynchaenus)* Clairville, 1798

- *xylostei* Clairville, 1798 (+)

*Tachyerges* Schoenherr, 1825

- *decoratus* (Germar, 1821) (+)
- *salicis* (Linnaeus, 1758)
- *stigma* (Germar, 1821)

## Smicronychini Seidlitz, 1891

*Sharpia* Tournier, 1873

- *rubida* (Rosenhauer, 1856)

*Smicronyx* Schoenherr, 1843

*Smicronyx (Chalybodontus)* Desbrochers des Loges, 1897

- *cyaneus* (Gyllenhal, 1835)
- *opacus* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860

*Smicronyx (Smicronyx)* Schoenherr, 1843

- *albosquamosus* Wollaston, 1854
- *coecus* (Reich, 1797)
- *funebri* Tournier, 1874
- *jungermanniae* (Reich, 1797)
- *nebulosus* Tournier, 1874
- *pauperculus* Wollaston, 1864 (~ *rufipennis* Tournier, 1874)
- *syriacus* Faust, 1887
- *reichii* (Gyllenhal, 1835)

## Storeini Lacordaire, 1863 s.l.

*Aubeonymus* Jacquelin du Val, 1855

- *carinicollis* (Lucas, 1846) (~ *scrobiculatus* (Rosenhauer, 1856) (◀))
- *danieli* González, 1968
- *franzi* González, 1968
- *mariaefranciscæ* Roudier, 1981

- *meregallii* Caldara, 1995
  - *pooti* Caldara, 1990
- Pachytychius* Jekel, 1861
- *asperatus* (Dufour, 1843)
  - *deplanatus* (Desbrochers des Loges, 1873)
  - *granulicollis* Tournier, 1874
  - *haematocephalus* (Gyllenhal, 1835)
  - *hordei* (Brullé, 1832)
  - *hordei grandicollis* (Waltl, 1835) (~ *squamosus* (Gyllenhal, 1835)) (◄)
  - *lucasi* Jekel, 1861
  - *lucasi baeticus* (Kirsch, 1870)
  - *maculosus* Reitter, 1907
  - *rotundicollis* Desbrochers des Loges, 1896
  - *sellatus* (Lucas, 1846)
  - *sparsutus* (Olivier, 1807)
  - *strumarius* (Gyllenhal, 1835)
  - *subasper* Fairmaire, 1870
  - *trimacula* (Rosenhauer, 1856)
  - *hypocrita* Tournier, 1874 (+)

#### Styphlini Jekel, 1861

- Orthochaetes* Germar, 1823
- *baeticus* Daniel, K., 1906 (~ *cerdanicus* Hustache, 1930)
  - *estrelanus* Germann & Braunert, 2016 (+)
  - *extensus* (Chevrolat, 1881)
  - *franzi* González, 1967
  - *hirticulus* Hoffmann, 1963
  - *insignis* (Aubé, 1863)
  - *nevadensis* González, 1967
  - *pirenaeus* González, 1967
  - *rectirostris* Hoffmann, 1960
  - *setiger* (Beck, 1817)
  - *villiersi* González, 1967 (+)
- Styphlus* Schoenherr, 1826
- Styphlus* (*Styphlus*) Schoenherr, 1826
- *penicillus* Schoenherr, 1826

#### Tychiini C.G. Thomson, 1859

##### Lignyodina Bedel, 1884

- Lignyodes* Dejean, 1835
- Lignyodes* (*Lignyodes*) Dejean, 1835
- *enucleator* (Panzer, 1798)

#### Tychiina C.G. Thomson, 1859

- Sibinia* Germar, 1817
- Sibinia* (*Dichotychius*) Bedel, 1885
- *albosquamosa* Pic, 1904
  - *exigua* Faust, 1885
  - *gallica* Pic, 1902
  - *gallica gemmans* Desbrochers des Loges, 1908
  - *meridionalis* Brisout de Barneville, Ch., 1867
  - *planiuscula* Desbrochers des Loges, 1873
  - *planiuscula planiuscula* Desbrochers des Loges, 1873
  - *sodalis* Germar, 1823
  - *tychiformis* Pic, 1902 (◄)
  - *umbrosa* Desbrochers des Loges, 1907 (+)
- Sibinia* (*Sibinia*) Germar, 1817
- *arenariae* Stephens, 1831
  - *attalica* Gyllenhal, 1835
  - *femoralis* Germar, 1823 (~ *pozuelica* Fuente, 1910, *seducta* Desbrochers des Loges, 1907)
  - *iberica* Hoffmann, 1960
  - *pellucens* (Scopoli, 1772)
  - *phalerata* Gyllenhal, 1835 (+)
  - *pici* Tournier, 1895
  - *primita* (Herbst, 1795)

- *pyrrhodactyla* (Marsham, 1802)
- *subelliptica* Desbrochers des Loges, 1873
- *variata* Gyllenhal, 1835 (~ *rubripes* Desbrochers des Loges, 1907)
- *viscaria* (Linnaeus, 1760)
- *amplithorax* Desbrochers des Loges, 1873

#### Tychius Germar, 1817

- Tychius* (*Tychius*) Germar, 1817
- *africanus* Franz, 1942 (+)
  - *argentatus* Chevrolat, 1859
  - *aureolus* Kiesenwetter, 1852
  - *aurichalceus* Gyllenhal, 1835
  - *bicolor* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *breviusculus* Desbrochers des Loges, 1873
  - *brisouti* Tournier, 1874
  - *capucinus* Boheman, 1843
  - *chevrolati* Tournier, 1874
  - *cinnamomeus* Kiesenwetter, 1852
  - *conspersus* Rosenhauer, 1856 (+)
  - *consputus* Kiesenwetter, 1864
  - *crassirostris* Kirsch, 1871
  - *cretaceus* Kiesenwetter, 1852
  - *cuprifer* (Panzer, 1799)
  - *cuprinus* Rosenhauer, 1856
  - *curvirostris* C. Brisout de Barneville, 1863 (+)
  - *cylindricollis* F. Solari, 1950
  - *decretus* Tournier, 1874 (+)
  - *elegantulus* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *funicularis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *fuscipes* Chevrolat, 1859
  - *grandicollis* Desbrochers des Loges, 1873 (~ *armatus* Tournier, 1874)
  - *grenieri* Brisout de Barneville, Ch., 1862
  - *hispanus* Velázquez de Castro & Caldara, 1992
  - *immaculicollis* Desbrochers des Loges, 1908 (~ *elegans* Desbrochers des Loges, 1896)
  - *junceus* (Reich, 1797)
  - *laticollis* Perris, 1864
  - *lineatulus* Stephens, 1831
  - *longiclava* Hustache, 1937
  - *longicollis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *lopezi* Hoffmann, 1957
  - *medicaginis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *meliloti* Stephens, 1831
  - *oedemerus* Penecke, 1936
  - *olcese* Tournier, 1874 (+)
  - *paralleus* (Panzer, 1794)
  - *picrostris* (Fabricius, 1787)
  - *podlussanyi* Caldara, 2010 (+)
  - *polylineatus* (Germar, 1823)
  - *pumilus* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *pusillus* Germar, 1842
  - *quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758)
  - *rufipennis* Brisout de Barneville, Ch., 1863
  - *rufipes* Tournier, 1874
  - *schatzmayri* Pic, 1910 (~ *farinosus* Rosenhauer, 1856)
  - *schneideri* (Herbst, 1795) (+)
  - *siculus* Boheman, 1843
  - *similaris* Tournier, 1874
  - *squamulatus* Gyllenhal, 1835
  - *stephensi* Schoenherr, 1835
  - *striatulus* Gyllenhal, 1835
  - *tessellatus* Tournier, 1874
  - *tibialis* Boheman, 1843
  - *mixtus* Desbrochers des Loges, 1873
  - *suturatus* Perris, 1866 (+)

## CYCLOMINAE Schoenherr, 1826

### Dichotrachelini Hoffmann, 1957

*Dichotrachelus* Stierlin, 1853

- *alonsoi* Meregalli, 1987
- *baeticus* Meregalli, 1987
- *cantabricus* Franz, 1936
- *deferreri* Meregalli & Alonso-Zarazaga, 1988
- *dieckmanni* Meregalli, 1987
- *dieckmanni dieckmanni* Meregalli, 1987
- *dieckmanni pretiosus* Meregalli, 1987
- *espanoli* González, 1964
- *graellsii* Perris, 1864
- *graellsii dellabeffai* Meregalli, 1983
- *graellsii graellsii* Perris, 1864
- *graellsii quaeritus* Meregalli, 1987
- *janetscheki* Roudier, 1957
- *laurae* Meregalli, 1987
- *laurae galicianus* Meregalli, 1987 (+)
- *laurae hispaniorum* Meregalli, 1987
- *laurae laurae* Meregalli, 1987
- *linderi* (Fairmaire, 1852)
- *muscorum* (Fairmaire, 1848)
- *negrei* González, 1964
- *negrei inopinatus* Meregalli, 1987
- *negrei negrei* González, 1964
- *osellai* Meregalli, 1983
- *paulinoi* Stierlin, 1887
- *paulinoi noctivagus* Meregalli, 1987
- *paulinoi paulinoi* Stierlin, 1887
- *pyrenaicus* Osella, 1971
- *ribesi* González, 1964
- *subiasi* Alonso-Zarazaga & Meregalli, 1983
- *valdinazzii* Meregalli, 1983
- *verrucosus* (Kiesenwetter, 1852)

### Hipporhinini Lacordaire, 1863

*Entomoderus* Raffray, 1873

*Entomoderus (Balearicola)* Semenov-Tian-Shanskij, 1910

- *aspericollis* (Desbrochers des Loges, 1895)
  - *bonvouloirii* (Brisout de Barneville, Ch., 1866) (◄)
  - *brevis* (F. Solari, 1952)
  - *clitellarius* (Boheman, 1842)
  - *dilatatus* (Fabricius, 1801) (+)
  - *fuentei* (Pic, 1920)
  - *humeralis* (Desbrochers des Loges, 1895) (◄)
  - *incisus* (Desbrochers des Loges, 1910)
  - *interruptus* (Brisout de Barneville, Ch., 1866) (◄)
  - *lamellicostis* (Desbrochers des Loges, 1910) (+)
  - *lateimpressus* (Pic, 1920)
  - *laticollis* (Pic, 1920)
  - *lobothorax* (Desbrochers des Loges, 1910) (+)
  - *mateui* (F. Solari, 1952) (+)
  - *melichari* (Schenkling, 1929)
  - *nevadensis* (Desbrochers des Loges, 1910)
  - *nodifrons* (Boheman, 1834) (~ *ignatii* (L.W. Schaufuss, 1882))
  - *parvus* (Rosenhauer, 1856)
  - *subfasciatus* (Rosenhauer, 1856)
  - *uncifer* (Desbrochers des Loges, 1910) (+)
  - *variegatus* (Lucas, 1846)
  - *tibiellus* (Desbrochers des Loges, 1910) (+)
- Entomoderus (Byrsopidius)* F. Solari, 1940
- *gataensis* (Hoffmann, 1956)
- Entomoderus (Pseudorhinus)* Melichar, 1923
- *ambiguus* (F. Solari, 1940)
  - *brucki* (Allard, 1870)

- *caudatus* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
- *cobosi* (Roudier, 1954)
- *compactus* (Desbrochers des Loges, 1911)
- *gracilipes* (Desbrochers des Loges, 1894) (+)
- *impressicollis* (Boheman, 1834)
- *impressicollis pityusensis* (Compte Sart, 1966)
- *impressicollis portusveneris* (Roudier, 1959)
- *laesirostris* (Fairmaire, 1859)
- *laesirostris bruckianus* (Desbrochers des Loges, 1911)
- *laesirostris stenoderus* (Gemming, 1871)
- *longulus* (Rosenhauer, 1856)
- *longulus longulus* (Rosenhauer, 1856) (~ *plasoni* (Desbrochers des Loges, 1911), *variabilis* (Brisout de Barneville, Ch., 1866))
- *longulus subgracilipes* (Roudier, 1958)
- *moroderi* (Desbrochers des Loges, 1910) (◄)
- *oberthueri* (Desbrochers des Loges, 1910)
- *perplexus* (Desbrochers des Loges, 1910)
- *ruteri* (Roudier, 1954)
- *stableaui* (Fairmaire, 1862)
- *stableaui aubryi* (Tempère, 1972) (+)
- *stableaui punctirostris* (Hoffmann, 1938)
- *stableaui roudieri* (Tempère, 1972) (+)
- *stableaui stableaui* (Fairmaire, 1862) (+)
- *tenuipes* (F. Solari, 1940) (+)
- *parallelipennis* (F. Solari, 1954)

*Gronops* Schoenherr, 1823

*Gronops (Gronopidius)* F. Solari, 1940

- *fasciatus* Küster, 1851

*Gronops (Gronops)* Schoenherr, 1823

- *luctuosus* Chevrolat, 1861
- *lunatus* (Fabricius, 1775)
- *pretiosus* Tournier, 1872

### Listroderini LeConte, 1876

*Listroderes* Schoenherr, 1826

- *costirostris* Schoenherr, 1826
- *difficilis* Germain, 1895

## DRYOPHTHORINAE Schoenherr, 1825

### Dryophthorini Schoenherr, 1825

*Dryophthorus* Germar, 1824

- *corticalis* (Paykull, 1792)

### Rhynchophorini Schoenherr, 1833

#### Litosomina Lacordaire, 1865

*Sitophilus* Schoenherr, 1838

- *granarius* (Linnaeus, 1758)
- *oryzae* (Linnaeus, 1763)
- *zeamais* Motschulsky, 1855 (+)

#### Rhynchophorina Schoenherr, 1833

*Rhynchophorus* Herbst, 1797

- *ferrugineus* (Olivier, 1790)

#### Sphenophorina Lacordaire, 1865

*Cosmopolites* Chevrolat, 1885

- *sordidus* (Germar, 1824) (+)

*Scyphophorus* Schoenherr, 1838

- *acupunctatus* Gyllenhal, 1838 (+)

*Sphenophorus* Schoenherr, 1838

- *abbreviatus* (Fabricius, 1787)
- *meridionalis* Gyllenhal, 1838
- *parumpunctatus* Gyllenhal, 1838
- *piceus* (Pallas, 1771)
- *striatopunctatus* (Goeze, 1777)
- *venatus* (Say, 1831) (+)

- *venatus vestitus* Chittenden, 1904 (+)

## ENTIMINAE Schoenherr, 1823

### Brachyderini Schoenherr, 1826

*Brachyderes* Schoenherr, 1823

*Brachyderes (Brachyderes)* Schoenherr, 1823

- *confusus* Viedma, 1967
- *illaesus* Boheman, 1833 (~ *grisescens* Fairmaire, 1862)
- *incanus* (Linnaeus, 1758)
- *lineolatus* Fairmaire, 1862
- *pubescens* Boheman, 1833
- *suturalis* Graells, 1851

○ *auriger* Desbrochers des Loges, 1884 (+)

*Brachyderes (Brachylophus)* Fischer de Waldheim, 1829

• *lusitanicus* (Fabricius, 1781)

*Brachyderes (Gastraspis)* Flach, 1907

- *marginellus* Graells, 1858

*Caulostrophilus* Desbrochers des Loges, 1905

- *equestris* Boheman, 1833 (~ *ophthalmicus* (Fairmaire, 1869))

*Strophomorphus* Seidlitz, 1867

- *porcellus* (Schoenherr, 1832)

*Strophosoma* Billberg, 1820

*Strophosoma (Morphostrophus)* Flach, 1907

- *edmundi* (Flach, 1907)

*Strophosoma (Neliocarus)* Thomson, C.G., 1859

- *alonsoi* Pelletier, 1993
- *bardenense* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2007 (+)

- *blascoi* Pelletier, 1996

- *burdigalense* (Escalera, 1928)

- *cidacosense* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2006 (+)

- *cobosi* Pelletier, 1994

- *cristatum* (Boheman, 1833)

- *ebenista* (Seidlitz, 1870) (~ *schrammi* Pic, 1915)

- *faber* (Herbst, 1784)

- *flavipes* (Chevrolat, 1869)

- *formosum* (Seidlitz, 1870)

- *gonzalezi* Pelletier, 1994

- *laufferi* (Flach, 1907)

- *luciae* Pelletier, 2001

- *mercheae* Ugarte San Vicente, 2006 (+)

- *mergallii* Pelletier, 1994

- *monachus* (Seidlitz, 1867)

- *moncayense* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2015 (+)

- *monegrense* Pelletier, 2000

- *nebulosum* (Stephens, 1831)

- *perfidum* (Flach, 1907)

- *poricolle* (Fairmaire, 1868)

- *pseudoebenista* (Escalera, 1926)

- *puberulum* (Chevrolat, 1873)

- *sus* (Stephens, 1831)

- *trapezicolle* (Flach, 1907)

- *urbionense* (Escalera, 1928)

- *valderejoi* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2007 (+)

- *zarazagai* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2009 (+)

*Strophosoma (Strophosoma)* Billberg, 1820

- *alticola* (Seidlitz, 1867)

- *constrictum* (Seidlitz, 1867)

- *danieli* (Hoffmann, 1959)

- *erinaceus* (Chevrolat, 1865)

- *ganglbaueri* (Flach, 1907)

- *globulicolle* (Escalera, 1926)

- *globulus* (Seidlitz, 1870)

- *longimanus* (Escalera, 1928)

- *manzanalense* Pelletier, 1995

- *melanogrammum* (Forster, 1771)

- *melanogrammum melanogrammum* (Forster, 1771)

- *palearius* (Pérez Arcas, 1872)

- *pellitum* (Kirsch, 1880) (◄)

- *pericarti* Pelletier, 1995

- *picticolle* (Seidlitz, 1867)

- *tubericolle* (Fairmaire, 1852)

- *umbilicatum* (Flach, 1907)

○ *capitatum* (DeGeer, 1775)

○ *tangerianum* (Hoffmann, 1952) (+)

*Strophosoma (Subcaulostrophus)* Flach, 1907

- *lentisci* (Hoffmann, 1956)

- *sagitta* (Seidlitz, 1870)

### Byrsopagini Lacordaire, 1863

*Graptus* Schoenherr, 1823

- *asturiensis* (Stierlin, 1884)

- *triguttatus* (Fabricius, 1775)

- *triguttatus triguttatus* (Fabricius, 1775)

*Rhytideres* Schoenherr, 1823

*Rhytideres (Rhytideres)* Schoenherr, 1823

- *plicatus* (Olivier, 1790)

*Seidlitzia* Desbrochers des Loges, 1891

- *maroccana* (Fairmaire, 1868)

*Tropiphorus* Schoenherr, 1842

- *cucullatus* Fauvel, 1888

### Cneorhinini Lacordaire, 1863

*Attactagenus* Tournier, 1876

- *carinirostris* (Boheman, 1840)

- *ceballosi* Viedma, 1965

- *cordubensis* (Kirsch, 1870)

- *diecki* (Tournier, 1875)

- *dispar* (Graells, 1858)

- *hypocyanus* (Boheman, 1833)

- *moralesi* Viedma, 1965

- *plumbeus* (Marsham, 1802)

- *pyriformis* (Boheman, 1833)

- *spinipes* (Pérez Arcas, 1872)

- *tarsalis* (Tournier, 1874)

- *zarateae* Viedma, 1965

*Cneorhinus* Schoenherr, 1823

- *argentifer* Marseul, 1866

- *barcelonicus* (Herbst, 1797)

- *serranoi* Alonso-Zarazaga, 1988

*Heydeneonymus* Desbrochers des Loges, 1875

- *ampliocollis* (Boheman, 1840)

- *cneorhinoides* (Desbrochers des Loges, 1909)

*Leptolepurus* Desbrochers des Loges, 1873

- *meridionalis* (Jacquelin du Val, 1854)

*Philopedon* Schoenherr, 1826

- *camerosense* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2012 (+)

- *consentaneum* (Desbrochers des Loges, 1907)

- *cytisarium* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2012 (+)

- *espagnoli* Viedma, 1965

- *lasierrae* Viedma, 1965

- *plagiatum* (Schaller, 1783)

- *vicinum* (Desbrochers des Loges, 1876)

*Polydius* Dejean, 1821

- *bellieri* (Brisout de Barneville, Ch., 1870)

- *bellieri bellieri* (Brisout de Barneville, Ch., 1870)

- *bellieri mirei* (Hoffmann, 1966)
- *heydenii* (Tournier, 1875)
- *heydenii grandis* (Stierlin, 1887)
- *heydenii heydenii* (Tournier, 1875)
- *hispanus* (Herbst, 1797)
- *hispanus hispanus* (Herbst, 1797)
- *hispanus lepesmei* (Roudier, 1962)
- *hispanus ludificator* (Gyllenhal, 1833)
- *prodigus* (Fabricius, 1798)
- *prodigus biungulatus* (Roudier, 1962)
- *prodigus roudieri* (Viedma, 1965)

#### Geonemini Gistel, 1848

*Barynotus* Germar, 1817

*Barynotus* (*Barynotus*) Germar, 1817

- *cantabricus* González, 1972
- *ibericus* González, 1972
- *obscurus* (Fabricius, 1775)
- *sabulosus* (Olivier, 1807)
- *squamosus* Germar, 1823
- *umbilicatus* Dufour, 1851
- *umbilicatus auronubilis* Fairmaire, 1856
- *unipunctatus* Dufour, 1851

*Geonemus* Schoenherr, 1833

- *caudulatus* Fairmaire, 1891
- *flabellipes* (Olivier, 1807)
- *palaui* Español, 1951

#### Gonipterini Lacordaire, 1863

*Gonipterus* Schoenherr, 1833

- *platensis* (Marelli, 1926) (~ *scutellatus* Gyllenhal, 1833)

#### Holcorhinini Desbrochers des Loges, 1898

*Cyclobarus* Faust, 1886

- *moraguesi* (Desbrochers des Loges, 1892) (◀)

*Nucterocephalus* Desbrochers des Loges, 1897

- *desbrochersi* (Reitter, 1906)

*Paracyclomauroides* Pelletier, 2009

- *meiraoides* (Hustache, 1946) (+)

#### Myorhinini Marseul, 1863

*Subhaptomerus* Hoffmann, 1960

- *frieseri* Hoffmann, 1960
- *frieseri avilai* Alonso-Zarazaga, 1983
- *frieseri frieseri* Hoffmann, 1960

#### Naupactini Gistel, 1848

*Naupactus* Dejean, 1821

- *cervinus* Boheman, 1840 (~ *godmani* Crotch, 1867)

#### Omiini Shuckard, 1840

*Baromiamima* Borovec, 2006

- *concinna* (Boheman, 1834) (+)

*Chaerocephalus* Chevrolat, 1861

- *alternans* (Fairmaire, 1866)

*Desbrochersella* Reitter, 1906

- *baetica* (Schaufuss, 1862)
- *castiliana* (K. Daniel, 1900)
- *cobosi* González, 1970
- *reyesae* Alonso-Zarazaga, 1984

#### Otiorhynchini Schoenherr, 1826

*Otiorhynchus* Germar, 1822

*Otiorhynchus* (*Arammichnus*) Gozis, 1882

- *cribricollis* Gyllenhal, 1834
- *juvencus* Gyllenhal, 1834
- *juvencus juvencus* Gyllenhal, 1834 (+)
- *juvencus miramarae* L.W. Schaufuss, 1882
- *valdemosae* L.W. Schaufuss, 1882

*Otiorhynchus* (*Aranihus*) Reitter, 1912

- *almeriacus* (Magnano, 2009) (+)
- *bialookii* (Magnano, 2009) (+)
- *cobosi* Hoffmann, 1957
- *cobosorum* Alonso-Zarazaga, 1984
- *davidi* Alonso-Zarazaga, 1984
- *decorus* Stierlin, 1875
- *ligneus* (Olivier, 1807)
- *ligneus colasi* Roudier, 1954
- *ligneus ligneus* (Olivier, 1807) (+)
- *longiusculus* Stierlin, 1888
- *nevadensis* Stierlin, 1892
- *parvicollis* Gyllenhal, 1834
- *paulinoi* Stierlin, 1886
- *sordidus* Stierlin, 1861
- *squamifer* Boheman, 1842 (+)
- *tenuicostis* Hustache, 1920
- *vitellus* (Gyllenhal, 1834) (+)

*Otiorhynchus* (*Choilisanus*) Reitter, 1912

- *raucus* (Fabricius, 1777) (+)

*Otiorhynchus* (*Dorymerus*) Seidlitz, 1890

- *sulcatus* (Fabricius, 1775)

*Otiorhynchus* (*Edelengus*) Reitter, 1912

- *edelenginus* Reitter, 1913 (◀)
- *intruscollis* Rosenhauer, 1856

*Otiorhynchus* (*Eunihus*) Reitter, 1912

- *levasseuri* Roudier, 1961 (+)

*Otiorhynchus* (*Jelenantus*) Reitter, 1912

- *affaber* Boheman, 1843
- *avariae* (Español, 1978)
- *planophthalmus* Heyden, 1870

*Otiorhynchus* (*Lixorrhynchus*) Reitter, 1914

- *gridellii* (Español, 1949)
- *gridellii bonretorni* (Español, 1952)
- *gridellii gridellii* (Español, 1949)
- *irenae* (Hoffmann, 1956)
- *montigena* Marseul, 1872
- *setiger* (Waltl, 1835)
- *sulcicollis* (Hoffmann, 1956)

- *terricola* Linder, 1863 (+)

- *torressalai* (Español, 1945)

- *torressalai espagnoli* (Vives, 1976)

- *torressalai torressalai* (Español, 1945)

- *zariquieyi* (Clermont, 1949)

*Otiorhynchus* (*Metopiorrhynchus*) Reitter, 1912

- *impressiventris* Fairmaire, 1859
- *procerus* Stierlin, 1875 (~ *cazorlae* Roudier, 1958)
- *pupillatus* Gyllenhal, 1834 (+)
- *singularis* (Linnaeus, 1767)
- *veterator* Uyttenboogaart, 1932

*Otiorhynchus* (*Misenatus*) Reitter, 1912

- *lugens* (Germar, 1817)

*Otiorhynchus* (*Nihus*) Reitter, 1912

- *uncinatus* Germar, 1823

*Otiorhynchus* (*Otirolehus*) Reitter, 1914

- *anthracinus* (Scopoli, 1763) (+)

*Otiorhynchus* (*Otiorhynchus*) Germar, 1822

- *amputatus* Chevrolat, 1872 (~ *caunicus* Stierlin, 1872)
- *aurifer* Boheman, 1842 (+)
- *auropunctatus* Gyllenhal, 1834
- *cancasanus* Reitter, 1913
- *corticalis* Lucas, 1846 (+)
- *curlettii* Meregalli, 1991
- *jaenensis* Stierlin, 1873
- *jaenensis fernandezcortesi* Alonso-Zarazaga, 1987
- *jaenensis jaenensis* Stierlin, 1873

- *lugdunensis* Boheman, 1843
  - *meridionalis* Gyllenhal, 1834
  - *mesnili* Hoffmann, 1936
  - *mirei* Hoffmann, 1964
  - *mirei cornonensis* Meregalli, 1991
  - *mirei mirei* Hoffmann, 1964
  - *pajarensis* Reitter, 1913
  - *pajarensis evanescens* A. Solari & F. Solari, 1922
  - *pajarensis pajarensis* Reitter, 1913
  - *pyrenaeus* Gyllenhal, 1834
  - *pyrenaeus occidentalis* Hustache, 1923 (+)
  - *pyrenaeus pyrenaeus* Gyllenhal, 1834
  - *roudieri* González, 1963
  - *stricticollis* Fairmaire, 1859
  - *stricticollis juniperi* Tempère, 1939
  - *stricticollis moncayoanus* Roudier, 1954
  - *sulcogemmatum* Boheman, 1843 (◄)
  - *tenebricosus* (Herbst, 1784) (~ *fuscipes* (Olivier, 1807))
  - *trichophorus* Meregalli, 1991
  - *truncatellus* Graells, 1858
  - *voriseki* Meregalli, 1991
  - *coecus* Germar, 1823 (+)
  - *coecus coecus* Germar, 1823 (+)
  - Otiiorhynchus (Pendragon)* Gozis, 1885
  - *desertus* Rosenhauer, 1847 (+)
  - *ovatus* (Linnaeus, 1758)
  - *ovatus ovatus* (Linnaeus, 1758)
  - Otiiorhynchus (Phalantorrhynchus)* Reitter, 1912
  - *allomorphus* Meregalli, 1986
  - *alonsoi* Meregalli, 1989 (◄)
  - *altaepeniae* Meregalli, 1986
  - *analys* A. Solari & F. Solari, 1922
  - *andarensis* Reitter, 1913
  - *arcticus* (O. Fabricius, 1780)
  - *arcticus arcticus* (O. Fabricius, 1780)
  - *arcticus catalunus* Meregalli, 1992
  - *arcticus jugicola* Stierlin, 1861
  - *arcticus monticola* Germar, 1823
  - *collectivus* Reitter, 1890
  - *daphnes* Meregalli, 1986
  - *demandae* Meregalli, 1986
  - *dentipes* Graells, 1858 (◄)
  - *dentipes ancarenensis* Meregalli, 1987 (◄)
  - *dentipes areolatus* Stierlin, 1881 (◄)
  - *dentipes asturiensis* Chevrolat, 1869 (◄)
  - *dentipes dentipes* Graells, 1858 (◄)
  - *dentipes donostiae* Meregalli, 1987 (◄)
  - *dentipes pericarti* Meregalli, 1987 (◄)
  - *ehlersi* Stierlin, 1881
  - *gertraudae* Zumpt, 1934 (◄)
  - *getschmanni* Stierlin, 1880 (◄)
  - *getschmanni getschmanni* Stierlin, 1880 (◄)
  - *getschmanni mansillae* Meregalli, 1987 (◄)
  - *hirticulus* Meregalli, 1992
  - *johannis* Stierlin, 1881
  - *malefidus* Gyllenhal, 1834
  - *melanopus* Zumpt, 1934 (~ *nigripedes* F. Solari, 1940)
  - *morio* (Fabricius, 1781)
  - *morio estrellaiensis* Zumpt, 1934
  - *morio morio* (Fabricius, 1781)
  - *morio navaricus* Gyllenhal, 1834 (~ *hispanicus* Stierlin, 1862)
  - *nimius* Meregalli, 1986
  - *noui* Fairmaire, 1862
  - *oliveri* Meregalli, 1992
  - *reynosae* Ch. Brisout de Barneville, 1866
  - *reynosae reynosae* Ch. Brisout de Barneville, 1866
  - *reynosae subreynosae* Hoffmann, 1964
  - *sagax* Reitter, 1915 (◄)
  - *seriehispidus* Stierlin, 1872
  - *sparsiridis* Reitter, 1890
  - *sylvestris* Chevrolat, 1866
  - *sylvestris sylvestris* Chevrolat, 1866
  - *sylvestris telenoensis* Meregalli, 1986
  - *urbionensis* Meregalli, 1989
  - *uyttenboogaarti* Zumpt, 1936
  - *validus* Stierlin, 1881 (◄)
  - Otiiorhynchus (Podoropelmus)* Reitter, 1912
  - *paucillus* Rosenhauer, 1847 (+)
  - Otiiorhynchus (Postaremus)* Reitter, 1912
  - *nodosus* (O.F. Müller, 1764)
  - Otiiorhynchus (Provadilus)* Reitter, 1912
  - *rugifrons* (Gyllenhal, 1813) (+)
  - Otiiorhynchus (Zadrehus)* Reitter, 1912
  - *atroapterus* (DeGeer, 1775)
  - Otiiorhynchus (Zustalestus)* Reitter, 1912
  - *rugosostriatus* (Goeze, 1777)
- Peritelini Lacordaire, 1863**
- Borovecia* Pierotti & Bellò, 2001
  - *gadorensis* Pierotti & Bellò, 2001
  - Euplister* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010
  - *andalusicus* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *frater* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *hybridus* (Seidlitz, 1872) (◄)
  - *megalophthalmus* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *mimus* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *moroderi* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *setabensis* (Hustache, 1921) (◄)
  - *susanae* (Seidlitz, 1865)
  - *trifolii* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *velazquezi* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - Gymnomorphus* Seidlitz, 1866
  - *mononychus* (Seidlitz, 1865)
  - *nigrans* (Fairmaire, 1862) (+)
  - Heteromeiopsis* Pierotti & Bellò, 2004
  - *valentiana* Pierotti & Bellò, 2004 (+)
  - *zariquieyi* (F. Solari, 1955) (◄)
  - Meira Jacquelin* du Val, 1853
  - *gerundana* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *leptosphaeroides* (Seidlitz, 1868) (◄)
  - *medae* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *tarraconensis* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - Meirella* Pierotti & Bellò, 1997
  - *florentina* (Stierlin, 1885)
  - *suturella* (Fairmaire, 1859)
  - Peritelus* Germar, 1823
  - *sphaeroides* Germar, 1823
  - Pseudomeira* Stierlin, 1881
  - *adusticornis* (Kiesenwetter, 1852)
  - *alonsoi* Pierotti & Bellò, 1994
  - *baetica* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *eremita* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *gougeletii* (Seidlitz, 1865)
  - *grenierii* (Seidlitz, 1865)
  - *inviridis* (Pic, 1908)
  - *kiesenwetterii* (Seidlitz, 1865)
  - *lepida* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010 (+)
  - *prolixa* (Kiesenwetter, 1852)
  - *quadraticollis* (Desbrochers des Loges, 1905)
  - *temuicornis* (L.W. Schaufuss, 1882)

- *clairi* (Stierlin, 1881) (+)
- *necessaria* (Gyllenhal, 1834)
- *parvula* (Seidlitz, 1865)
- *rustica* (Boheman, 1843)

*Pseudoperitelus* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010

- *espanoli* (Roudier, 1958) (◄)
- *globulicollis* (Seidlitz, 1872) (◄)
- *lopezi* (Hoffmann, 1961) (◄)
- *senex* (Boheman, 1834) (◄)

*Simmeiropsis* Pierotti & Bellò, 2013

- *algharbensis* Pierotti, Germann & Braunert, 2013
- *lusitana* Pierotti, Germann & Braunert, 2013
- *cremieri* (Boheman, 1843)
- *planidorsis* (Seidlitz, 1865)
- *schoenherri* (Boheman, 1843)

*Simo* Dejean, 1821

- *hirticornis* (Herbst, 1795) (+)

### Phyllobiini Schoenherr, 1826

*Phyllobius* Germar, 1824

*Phyllobius* (*Dieletus*) Reitter, 1916

- *argentatus* (Linnaeus, 1758)
- *argentatus argentatus* (Linnaeus, 1758)

*Phyllobius* (*Metaphyllobius*) Smirnov, 1913

- *glaucus* (Scopoli, 1763) (+)
- *pomaceus* Gyllenhal, 1834 (+)

*Phyllobius* (*Nemoicus*) Dillwyn, 1829

- *oblongus* (Linnaeus, 1758)

*Phyllobius* (*Phyllobius*) Germar, 1824

- *arborator* (Herbst, 1797) (+)
- *betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
- *betulinus betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
- *korbi* Schilsky, 1908
- *pyri* (Linnaeus, 1758)
- *squamosus* Ch. Brisout de Barneville, 1866
- *tuberculifer* Chevrolat, 1866
- *xanthocnemus* Kiesenwetter, 1852 (~ *alpinus* Stierlin, 1859)

*Phyllobius* (*Pterygorrhynchus*) Pesarini, 1969

- *maculicornis* Germar, 1823

*Phyllobius* (*Subphyllobius*) Schilsky, 1911

- *virideaeris* (Laicharting, 1781)
- *virideaeris virideaeris* (Laicharting, 1781)

*Pseudomyllocerus* Desbrochers des Loges, 1872

- *sinuatus* (Fabricius, 1801)

### Polydrusini Schoenherr, 1823

*Homapterus* Fairmaire, 1857

- *affinis* Chevrolat, 1865
- *brevipennis* (Kirsch, 1880)
- *nevadensis* Hoffmann, 1936
- *punctulatus* (Ch. Brisout de Barneville, 1866)
- *subnudus* (Fairmaire, 1856)

*Liophloeus* Germar, 1817

*Liophloeus* (*Liophloeus*) Germar, 1817

- *paulinoi* Desbrochers des Loges, 1875
- *tessulatus* (O.F. Müller, 1776)

*Pachyrhinus* Schoenherr, 1823

*Pachyrhinus* (*Pachyrhinus*) Schoenherr, 1823

- *dentipes* (Seidlitz, 1867)
- *eusomoides* Desbrochers des Loges, 1904 (+)
- *glabratus* (Chevrolat, 1866)
- *javeti* (Desbrochers des Loges, 1872) (~ *balearicus* Voss, 1936)
- *lethierryi* (Desbrochers des Loges, 1875) (+)
- *lopezi* (Hoffmann, 1956)
- *squamosus* (Kiesenwetter, 1852)

- *squamosus* (Herbst, 1795) (~ *mustela* (Herbst, 1797))

*Polydrusus* Germar, 1817

*Polydrusus* (*Chaerodrys*) Jacquelin du Val, 1854

- *setifrons* Jacquelin du Val, 1852
- *setifrons setifrons* Jacquelin du Val, 1852

*Polydrusus* (*Chlorodrusus*) K. Daniel & J. Daniel, 1898

- *abeillei* Desbrochers des Loges, 1869 (+)
- *abeillei abeillei* Desbrochers des Loges, 1869 (+)
- *alchemillae* Hustache, 1929 (+)
- *castilianus* K. Daniel & J. Daniel, 1898

○ *amoenus* (Germar, 1824) (+)

*Polydrusus* (*Chomatocryptus*) Desbrochers des Loges, 1902

- *xanthopus* Gyllenhal, 1834

*Polydrusus* (*Eudipnus*) Thomson, C.G., 1859

- *formosus* (Mayer, 1779) (+)
- *lateralis* Gyllenhal, 1834 (+)
- *mollis* (Strøm, 1768)

*Polydrusus* (*Eurodrusus*) Korotyaev & Meleshko, 1997

- *alveolus* Desbrochers des Loges, 1869
- *andalusicus* F. Solari, 1954
- *bohemani* Kiesenwetter, 1852
- *cervinus* (Linnaeus, 1758)
- *chrysomela* (Olivier, 1807)
- *confluens* Stephens, 1831
- *dilutus* Motschulsky, 1849
- *falsosus* Hoffmann, 1963
- *fuscroseus* Desbrochers des Loges, 1872
- *ibericus* Stierlin, 1884
- *pilosulus* Chevrolat, 1865
- *pilosus* Gredler, 1866
- *pilosus pilosus* Gredler, 1866
- *planifrons* Gyllenhal, 1834
- *planifrons planifrons* Gyllenhal, 1834 (~ *prasinus* (Olivier, 1790))
- *pulchellus* Stephens, 1831
- *pulchellus baeticus* Roudier, 1963
- *pulchellus roudieranus* Yunakov, 2017 (~ *lusitanicus* Roudier, 1963)
- *smaragdulus* (Fairmaire, 1859)
- *subglaber* Desbrochers des Loges, 1870
- *tinauti* Alonso-Zarazaga, 2013 (~ *korbi* Stierlin, 1890)

*Polydrusus* (*Eustolus*) Thomson, C.G., 1859

- *corruscus* Germar, 1823
- *flavipes* (DeGeer, 1775)
- *flavipes flavipes* (DeGeer, 1775)
- *impressifrons* Gyllenhal, 1834
- *interstitialis* Perris, 1864
- *pterygomalis* Boheman, 1840

○ *luctuosus* (Desbrochers des Loges, 1875)

*Polydrusus* (*Leucodrusus*) Stierlin, 1884

- *clermonti* Pic, 1919
- *senex* Chevrolat, 1866
- *tibialis* Gyllenhal, 1834

*Polydrusus* (*Metallites*) Germar, 1824

- *aeratus* (Gravenhorst, 1807) (+)
- *aeratus aeratus* (Gravenhorst, 1807) (+)
- *lusitanicus* (Chevrolat, 1880)
- *marginatus* Stephens, 1831
- *viridinitens* Gravenhorst, 1807 (~ *impar* Gozis, 1882)

*Polydrusus* (*Polydrusus*) Germar, 1817

- *tereticollis* (DeGeer, 1775)
- *leucaspis* Boheman, 1840

*Polydrusus* (*Rhinocoetus*) Desbrochers des Loges, 1902

- *desbrochersi* (Stierlin, 1884)

### Sciaphilini Sharp, 1891

*Barypeithes* Jacquelin du Val, 1854

- *hispanus* Formánek, 1908
- *inflaticeps* (Reitter, 1915)
- *paganettii* F. Solari, 1948
- *sulcifrons* (Boheman, 1843)
- *sulcifrons andalusicus* Seidlitz, 1868
- *sulcifrons sulcifrons* (Boheman, 1843)

*Brachysomus* Schoenherr, 1823

*Brachysomus* (*Brachysomus*) Schoenherr, 1823

- *hirtus* (Boheman, 1845)

*Chiloneus* Schoenherr, 1842

*Chiloneus* (*Chiloneus*) Schoenherr, 1842

- *belloi* Borovec & Weill, 2016 (+)
- *chevrolati* Tournier, 1874
- *cinerascens* (Rosenhauer, 1856) (◀)
- *franzi* González, 1970 (◀)
- *mediterraneus* González, 1970 (◀)
- *omiasformis* Borovec & Weill, 2016 (+)
- *pennatus* (Faust, 1885)

*Chionostagon* Alonso-Zarazaga, 1988

- *albosquamulata* (Reitter, 1907)

*Exomias* Bedel, 1883

- *indigenus* (Boheman, 1834)
- *indigenus indigenus* (Boheman, 1834)
- *pyrenaeus* (Seidlitz, 1868) (+)

*Foucartia* Jacquelin du Val, 1854

- *cremieri* Jacquelin du Val, 1854 (+)
- *elongata* Tournier, 1876
- *squamulata* (Herbst, 1795) (◀)

*Pleurodirus* Chevrolat, 1878

*Pleurodirus* (*Pleurodirus*) Chevrolat, 1878

- *carinula* (Olivier, 1807)
- *fairmairii* (Kiesenwetter, 1852)

*Pleurodirus* (*Pseudometallites*) D'Amore-Fracassi, 1907

- *murinus* (Gyllenhal, 1834)
- *pubescens* (Allard, 1868)

*Sciaphilus* Schoenherr, 1823

- *asperatus* (Bonsdorff, 1785)
- *costulatus* Kiesenwetter, 1852 (~ *freyi* Zumpt, 1933)
- *ebeninus* (Chevrolat, 1873)

### Sitonini

*Andrion* Velázquez de Castro, 2007

- *regensteinense* (Herbst, 1797) (◀)

*Charagmus* Schoenherr, 1826

- *cachectus* (Gyllenhal, 1834) (◀)
- *gressorius* (Fabricius, 1792) (◀)
- *griseus* (Fabricius, 1775) (◀)
- *intermedius* (Küster, 1847) (◀)
- *variegatus* (Fåhræus, 1840) (◀)

*Coelositona* González, 1971

- *cambricus* (Stephens, 1831) (◀)
- *cinerascens* (Fåhræus, 1840) (◀)
- *limosus* (Rossi, 1792) (◀)
- *ocellatus* (Küster, 1849) (◀)
- *puberulus* (Reitter, 1903) (◀)
- *ribesi* (González, 1971) (◀)

*Sitona* Germar, 1817

- *ambiguus* Gyllenhal, 1834
- *brucki* Allard, 1870
- *callosus* Gyllenhal, 1834
- *cinnamomeus* Allard, 1863
- *cylindricollis* Fåhræus, 1840
- *cylindricollis cylindricollis* Fåhræus, 1840

- *cylindricollis maculosus* Allard, 1865 (+)
- *discoideus* Gyllenhal, 1834
- *gemellatus* Gyllenhal, 1834
- *giraudi* Hoffmann, 1938
- *hispidulus* (Fabricius, 1777)
- *humeralis* Stephens, 1831
- *inops* Schoenherr, 1832
- *lateralis* Gyllenhal, 1834 (+)
- *lineatus* (Linnaeus, 1758)
- *lividipes* Fåhræus, 1840
- *lividipes lividipes* Fåhræus, 1840
- *longulus* Gyllenhal, 1834
- *macularius* (Marsham, 1802)
- *macularius macularius* (Marsham, 1802)
- *maroccanus* Stierlin, 1886 (+)
- *mateui* Roudier, 1959
- *niger* Allard, 1865
- *obsoletus* (Gmelin, 1790)
- *obsoletus obsoletus* (Gmelin, 1790) (~ *lepidus* Gyllenhal, 1834)
- *puncticollis* Stephens, 1831
- *striatellus* Gyllenhal, 1834 (+)
- *sulcifrons* (Thunberg, 1798)
- *sulcifrons argutulus* Gyllenhal, 1834
- *suturalis* Stephens, 1831
- *tenuis* Rosenhauer, 1847
- *virgatus* Fåhræus, 1840
- *waterhousei* Walton, 1846
- *waterhousei waterhousei* Walton, 1846
- *concavirostris* Hochhuth, 1851 (+)
- *languidus* Gyllenhal, 1834
- *lineellus* (Bonsdorff, 1785)
- *verecundus* (Rossi, 1790) (-)

### Tanymecini Lacordaire, 1863

#### Tainophthalmina Desbrochers des Loges, 1873

*Aspidiotes* Schoenherr, 1847

*Aspidiotes* (*Aspidiotes*) Schoenherr, 1847

- *gonzalezi* Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1994
- *westringii* Schoenherr, 1847

#### Tanymecina Lacordaire, 1863

*Chlorophanus* C.R. Sahlberg, 1823

- *pollinosus* (Fabricius, 1792) [~ *gibbosus* (Paykull, 1792)]
- *rugicollis* Gyllenhal, 1834
- *viridis* (Linnaeus, 1758) (+)
- *viridis viridis* (Linnaeus, 1758) (+)

*Cycloderes* C.R. Sahlberg, 1823

*Cycloderes* (*Aramorius*) Desbrochers des Loges, 1908

- *affinis* F. Solari, 1954
- *auricollis* (Desbrochers des Loges, 1872) (◀)
- *auricollis aurithorax* (Desbrochers des Loges, 1884) (◀)
- *dispar* (Desbrochers des Loges, 1895) (◀)
- *exiguus* (Faust, 1887)
- *franzi* Hoffmann, 1960
- *fuentei* (Desbrochers des Loges, 1903)
- *guinardi* (Jacquelin du Val, 1853)
- *pusillus* (Seidlitz, 1867)

*Cycloderes* (*Cycloderes*) C.R. Sahlberg, 1823

- *araneiformis* (Chevrolat, 1866)
- *argenteus* (Perris, 1866)
- *argenteus argenteus* (Perris, 1866)
- *argenteus persulcatus* (Fairmaire, 1871) (+)
- *barrosi* (Desbrochers des Loges, 1904)
- *candidulus* (Desbrochers des Loges, 1872)
- *canescens* (Rossi, 1792)



- *chalcogrammus* (Boheman, 1833) (~ *laufferi* (Desbrochers des Loges, 1904))
  - *championi* F. Solari, 1954
  - *depilis* (Fairmaire, 1863) (+)
  - *distinctus* (Desbrochers des Loges, 1903)
  - *elongatus* (Pérez Arcas, 1872) (~ *subvittatus* (Desbrochers des Loges, 1892))
  - *espanoli* Roudier, 1954
  - *fritillum* (Panzer, 1794)
  - *fullo* (Erichson, 1841)
  - *glabratus* (Gyllenhal, 1833)
  - *granithorax* (Desbrochers des Loges, 1896)
  - *gredosensis* Hoffmann, 1959
  - *hirtellus* (Desbrochers des Loges, 1872)
  - *inflaticollis* (Fairmaire, 1879)
  - *insidiosus* (Fairmaire, 1859) (~ *emarginatus* (Desbrochers des Loges, 1873), *heliophilus* (Chevrolat, 1866))
  - *intermedius* (Desbrochers des Loges, 1884)
  - *lasius* (Boheman, 1833) (~ *ahenus* (Desbrochers des Loges, 1847), *longipilis* (Seidlitz, 1867), *uhagonis* (Desbrochers des Loges, 1871))
  - *latithorax* (Desbrochers des Loges, 1872)
  - *lusitanicus* (Desbrochers des Loges, 1884)
  - *mus* (Herbst, 1795)
  - *planicollis* (Pérez Arcas, 1872)
  - *preciosus* (L.W. Schaufuss, 1862)
  - *pulchellus* F. Solari, 1954
  - *punicus* (Desbrochers des Loges, 1872) (+)
  - *serripes* (Desbrochers des Loges, 1872)
  - *squameus* (Desbrochers des Loges, 1884)
  - *submetallicus* (Desbrochers des Loges, 1872)
  - *substriatus* (Desbrochers des Loges, 1884)
  - *tessellatus* (Gyllenhal, 1833)
  - *tessellatus tessellatus* (Gyllenhal, 1833)
  - *tomentosus* (Desbrochers des Loges, 1872)
  - *tonsus* (Chevrolat, 1866)
  - *umbrinus* (Gyllenhal, 1833)
  - *vittatus* (Boheman, 1840)
  - *vitticollis* (Desbrochers des Loges, 1896)
  - *subahenus* (Desbrochers des Loges, 1892) (-)
- Tanymecus* Germar, 1817
- Tanymecus* (*Geomecus*) Reitter, 1903
- *fausti* Desbrochers des Loges, 1884
  - *submaculatus* Chevrolat, 1860
- Tanymecus* (*Tanymecus*) Germar, 1817
- *albicans* Rosenhauer, 1856
  - *metallinus* Fairmaire, 1866
  - *nevadensis* Desbrochers des Loges, 1872
  - *palliatus* (Fabricius, 1787)
  - *vagabundus* Chevrolat, 1880
- Trachyphloeini Gistel, 1848**
- Caenopsis* Bach, 1854
- *andalusiensis* Behne, 2008 (+)
  - *assmanni* Behne, 2008 (+)
  - *bermejaensis* Behne, 2008 (+)
  - *breviscapus* Behne, 2008 (+)
  - *brevisetis* Desbrochers des Loges, 1896
  - *crestellinensis* Behne, 2008 (+)
  - *fissirostris* (Walton, 1847)
  - *formaneki* Leonhard, 1912
  - *gracilicornis* Behne, 2008 (+)
  - *larraldi* (Perris, 1858)
  - *reichei* Tournier, 1874
  - *stuebeni* Behne, 2008 (+)
  - *waltoni* (Boheman, 1842)
- *zerchei* Behne, 2008 (+)
- Cathormiocerus* Schoenherr, 1842
- *acalophilus* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *aristatus* (Gyllenhal, 1827) (+)
  - *attaphilus* Brisout de Barneville, Ch., 1880 (~ *fageli* Hoffmann, 1963)
  - *bacaresensis* Escalera, 1918 (~ *palmaensis* Hoffmann, 1957)
  - *barrosi* Pic, 1909
  - *behnei* Borovec & Bahr, 2008
  - *bolivarii* Uhagón, 1885
  - *brevirostris* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
  - *carpetanus* Uhagón, 1885 (~ *estrellanus* Escalera, 1918)
  - *championi* Escalera, 1918
  - *chevrolati* Seidlitz, 1868
  - *churchevillei* Desbrochers des Loges, 1900
  - *cobosi* Roudier, 1959
  - *curvipes* (Wollaston, 1854)
  - *cylindrus* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *diecki* Seidlitz, 1873
  - *discors* Desbrochers des Loges, 1875 (~ *reitteri* (Stierlin, 1885))
  - *elongatulus* Uhagón, 1885 (~ *densestriatus* Reitter, 1901)
  - *escaleraei* Hustache, 1946 (+)
  - *excursor* (Stierlin, 1862) (~ *lusitanicus* Stierlin, 1885)
  - *fuenta* Desbrochers des Loges, 1896
  - *gadorensis* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *gigas* Borovec & Bahr, 2008 (+)
  - *globoicollis* (Stierlin, 1896) (◄)
  - *gracilior* Fairmaire, 1871
  - *gracilis* Seidlitz, 1868 (~ *tenuepilus* Cobos, 1955)
  - *hircus* Desbrochers des Loges, 1896 (+)
  - *hirticulus* Seidlitz, 1873
  - *horrens* (Gyllenhal, 1834)
  - *hustachei* Borovec & Bahr, 2008 (+)
  - *inflatipennis* Escalera, 1926 (~ *espanoli* Roudier, 1958)
  - *inflatiscapus* Escalera, 1918
  - *jeani* Borovec, 1989 (+)
  - *lapidicola* Chevrolat, 1866
  - *lethierryi* (Chevrolat, 1866) (~ *cantabricus* Escalera, 1918, *irrasus* Seidlitz, 1868, *janetscheki* Roudier, 1957, *salinus* Escalera, 1918, *transmontanus* Escalera, 1918)
  - *longithorax* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *maderae* (Wollaston, 1854) (~ *balearicus* Desbrochers des Loges, 1910, *curviscapus* Seidlitz, 1868, *gaditanus* Escalera, 1918, *insularis* Escalera, 1918)
  - *malacensis* Escalera, 1918 (+)
  - *martinezi* Escalera, 1918
  - *mergallii* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *meyeri* Germann, Borovec & Braunert, 2015 (+)
  - *minutus* Pic, 1908 (~ *cordubensis* Escalera, 1926, *pozuelensis* Escalera, 1918, *seguranus* Escalera, 1918)
  - *morrissi* Borovec & Bahr, 2008 (+)
  - *myrmecophilus* (Seidlitz, 1868)
  - *nevadensis* Escalera, 1918
  - *peteri* Borovec & Bahr, 2008 (+)
  - *porculus* Uhagón, 1885
  - *proximus* Uhagón, 1885
  - *pseudogracilis* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *pygmaeus* Seidlitz, 1868
  - *sagrensis* Escalera, 1918
  - *sinuatiscapus* Pic, 1915 (~ *crassiscapus* Escalera, 1918)
  - *solarii* Cobos, 1952
  - *spinus* (Goeze, 1777) (◄)
  - *stuebeni* Borovec & Bahr, 2006 (+)
  - *tarragonensis* Borovec & Bahr, 2005 (+)

- *tenuicornis* Escalera, 1918
- *tenuiscapus* Fairmaire, 1884
- *terolensis* Escalera, 1918 (~ *baraudi* Hoffmann, 1953)
- *validiscapus* Rouget, 1857
- *variegatus* Küster, 1849 (~ *perforatus* Hoffmann, 1954)
- *vauloegeri* Pic, 1904 (~ *biseriatus* Escalera, 1918)
- *viedmai* Alonso-Zarazaga, 1983
- *socius* Boheman, 1842 (~ *maritimus* Rye, 1874) (-)

#### *Romualdius* Borovec, 2009

- *angustisetulus* (Hansen, 1915) (◄)
- *canaliculatus* (L.W. Schaufuss, 1867) (◄) (~ *setiger* Seidlitz, 1868)
- *peyerinhoffi* (Formánek, 1910) (+)
- *scaber* (Linnaeus, 1758) (◄) (~ *bifoveolatus* (Beck, 1817))
- *algerinus* Seidlitz, 1868 (◄)

#### *Trachyphloeus* Germar, 1817

*Trachyphloeus* (*Lacordairius*) Brisout de Barneville, Ch., 1866

- *algesiranus* Escalera, 1923
- *seidlitzii* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
- *subsetulosus* Escalera, 1923
- *muralis* Bedel, 1893
- *pici* Formánek, 1907

*Trachyphloeus* (*Pseudolacordairius*) Escalera, 1923

- *orbipennis* Desbrochers des Loges, 1901
- *pseudodenticulatus* Borovec, 2014
- *pustulatus* Seidlitz, 1868
- *solitus* Borovec, 1999

*Trachyphloeus* (*Trachyphloeus*) Germar, 1817

- *alternans* Gyllenhal, 1834
- *crassicornis* Borovec, 1996
- *elongatus* Borovec, 1992
- *gonzalezi* Borovec, 2014 (+)
- *guadarramus* Seidlitz, 1868
- *heymesi* Hubenthal, 1934 (+)
- *hispanicus* Borovec, 1989
- *laticollis* Boheman, 1842
- *muricatus* Stierlin, 1885
- *nodipennis* Chevrolat, 1860
- *scabriculus* (Linnaeus, 1771)
- *spinimanus* Germar, 1823
- *tenuipes* Formánek, 1909
- *tenuis* Borovec, 1999
- *brevicornis* Solari & Solari, 1905

## HYPERINAE Marseul, 1863 (1848)

### Hyperini Marseul, 1863 (1848)

#### *Brachypera* Capiomont, 1868

*Brachypera* (*Antidonus*) Bedel, 1886

- *brevirostris* (Capiomont, 1868) (◄)
- *dauci* (Olivier, 1807) (◄)
- *externesinuata* (Desbrochers des Loges, 1896) (+)
- *lunata* (Wollaston, 1854) (◄)
- *zoilus* (Scopoli, 1763) (◄)

*Brachypera* (*Brachypera*) Capiomont, 1868

- *crinita* (Boheman, 1834) (◄)
- *deyrollei* (Capiomont, 1868) (◄)
- *fallax* (Capiomont, 1868) (◄)
- *perplexa* (Capiomont, 1868) (◄)
- *proxima* (Capiomont, 1876) (◄)
- *solarii* (Roudier, 1959) (◄)
- *tumida* (Capiomont, 1868) (◄)

#### *Bubalocephalus* Capiomont, 1868

- *espagnoli* González, 1965
- *kiesenwetteri* Capiomont, 1868
- *rotundicollis* Capiomont, 1868

- *vivesi* González, 1965

#### *Coniatus* Germar, 1817

*Coniatus* (*Bagoides*) Capiomont, 1868

- *suavis* Gyllenhal, 1834
- Coniatus* (*Coniatus*) Germar, 1817
- *deyrollei* Capiomont, 1868
  - *repandus* (Fabricius, 1792)
  - *tamarisci* (Fabricius, 1787)

#### *Donus* Jekel, 1865

- *austerus* (Boheman, 1834)
- *austerus austerus* (Boheman, 1834) (+)
- *austerus lusitanicus* (Capiomont, 1868)
- *biglobosus* (Kirsch, 1880)
- *chevrolati* (Capiomont, 1868)
- *corrosus* (Desbrochers des Loges, 1900)
- *delarouzei* (Capiomont, 1868)
- *elegans* (Boheman, 1842)
- *globosus* (Fairmaire, 1859)
- *globosus globosus* (Fairmaire, 1859)
- *hispanicus* (Capiomont, 1868)
- *ibericus* (Capiomont, 1868)
- *intermedius* (Boheman, 1842)
- *intermedius aubei* (Capiomont, 1868)
- *intermedius intermedius* (Boheman, 1842)
- *longicollis* (Petri, 1901)
- *montivagus* (Capiomont, 1868)
- *oblongus* (Boheman, 1842)
- *obtusus* (Rosenhauer, 1856)
- *obtusus cazorlae* Roudier, 1959
- *obtusus obtusus* (Rosenhauer, 1856)
- *perrisi* (Capiomont, 1868)
- *philanthus* (Olivier, 1807)
- *quadratocollis* (Petri, 1901)
- *rudicollis* (Capiomont, 1868)
- *salviae* (Schränk, 1789) (+)
- *sierranus* (Capiomont, 1868)
- *tristis* (Capiomont, 1868)
- *tessellatus* (Boheman, 1834) (+)

#### *Hypera* Germar, 1817

*Hypera* (*Dapalinus*) Capiomont, 1868

- *dapalis* (Boheman, 1834)
- *maculipennis* (Fairmaire, 1859)
- *meles* (Fabricius, 1792)
- *pseudotenuirostris* Skuhrovec & Winkelmann, 2008 (+)
- *striata* (Boheman, 1834) (+)

*Hypera* (*Eririnomorphus*) Capiomont, 1868

- *arundinis* (Paykull, 1792)
- *conmaculata* (Herbst, 1795) (~ *adpersa* (Fabricius, 1792))
- *rumicis* (Linnaeus, 1758)

*Hypera* (*Hypera*) Germar, 1817

- *constans* (Boheman, 1834)
- *egregia* (Capiomont, 1868)
- *gracilentata* (Capiomont, 1868) (◄)
- *incompta* (Boheman, 1834)
- *jucunda* (Capiomont, 1868)
- *lethierryi* (Capiomont, 1868)
- *melancholica* (Fabricius, 1792) (~ *fuscocinerea* (Marsham, 1802))
- *melarynchus* (Olivier, 1807)
- *miles* (Paykull, 1792) (~ *suspiciosa* (Herbst, 1795))
- *nigrirostris* (Fabricius, 1775)
- *ononidis* (Chevrolat, 1863)
- *plantaginis* (DeGeer, 1775)
- *postica* (Gyllenhal, 1813)
- *scolymi* (Capiomont, 1868)
- *venusta* (Fabricius, 1781)

- *viciae* (Gyllenhal, 1813)
- Hypera (Kippenbergia)* Alonso-Zarazaga, 2005
- *arator* (Linnaeus, 1758) (◄)
- *pandellei* (Capiomont, 1868) (◄)
- *pandellei pandellei* (Capiomont, 1868) (◄)
- Hypera (Tigrinellus)* Capiomont, 1868
- *pastinacae* (Rossi, 1790)
- Limobius* Schoenherr, 1843
- *borealis* (Paykull, 1792)
- *borealis borealis* (Paykull, 1792)
- *mixtus* (Boheman, 1834)
- *winkelmanni* Skuhrovec & Alonso-Zarazaga, 2017 (+)
- Metadonus* Capiomont, 1868
- *fernandoi* Ugarte San Vicente, 2016 (+)
- *vuillefroyanus* (Capiomont, 1868)
- Pachypera* Capiomont, 1868
- *kraatzi* (Capiomont, 1868)

## LIXINAE Schoenherr, 1823

### Cleonini Schoenherr, 1826

- Asproparthenis* Gozis, 1886
- *crotchi* (Chevrolat, 1873)
- *lusca* (Chevrolat, 1869) (~ *meridionalis* auctt. hisp.)
- *punctiventris* (Germar, 1823)
- Bothynoderes* Schoenherr, 1823
- *affinis* (Schränk, 1781)
- Cleonis* Dejean, 1821
- *pigra* (Scopoli, 1763)
- Coniocioleonus* Motschulsky, 1860
- Coniocioleonus (Augustecleonus)* Arzanov, 2006
- *nebulosus* (Linnaeus, 1758)
- *turbatus* (Fähræus, 1842) (~ *hollbergii* auctt. iber.)
- Coniocioleonus (Plagiographus)* Chevrolat, 1869
- *amori* (Marseul, 1868)
- *cicatricosus* (Hoppe, 1795)
- *crinipes* (Fähræus, 1842)
- *excoriatus* (Gyllenhal, 1834)
- *graellsii* (Chevrolat, 1873)
- *megalographus* (Fähræus, 1842)
- *nigrosuturatus* (Goeze, 1777)
- *planidorsis* (Fairmaire, 1874)
- *riffensis* (Fairmaire, 1884)
- *sejunctus* (Faust, 1904)
- *tabidus* (Latreille, 1804)
- *variolosus* (Wollaston, 1864)
- Cyphocleonus* Motschulsky, 1860
- *dealbatus* (Gmelin, 1790)
- *testatus* (Gyllenhal, 1834) (~ *morbillosus* (Fabricius, 1792))
- *trisulcatus* (Herbst, 1795)
- Ephimeronotus* Faust, 1904
- *miegii* (Fairmaire, 1855)
- Leucomigus* Motschulsky, 1860
- *tesselatus* (Fairmaire, 1849)
- Leucophyes* Marshall, 1946
- *martorellii* (Fairmaire, 1879)
- *pedestris* (Poda, 1761) (+)
- *quadratithorax* (Desbrochers des Loges, 1884)
- *occidentalis* (Dieckmann, 1982) (+)
- Lixoglyptus* Reitter, 1916
- *spartii* (Olivier, 1807) (◄)
- Lixomorphus* Faust, 1904
- *algirus* (Linnaeus, 1758)
- Mecaspis* Schoenherr, 1823
- *alternans* (Hellwig, 1795)
- *bedeli* Faust, 1904

- *emarginata* (Fabricius, 1787)
- *nana* Gyllenhal, 1834
- *striatella* (Fabricius, 1792)
- Pachycerus* Schoenherr, 1823
- *segnis* (Germar, 1823) (~ *cordiger* (Germar, 1819))
- *madidus* (Olivier, 1807) (+)
- Pseudocleonus* Chevrolat, 1872
- Pseudocleonus (Neopseudocleonus)* Arzanov, 2005
- *grammicus* (Panzer, 1789)
- Pseudocleonus (Pseudocleonus)* Chevrolat, 1872
- *carinatus* (Gyllenhal, 1834)
- *cinereus* (Schränk, 1781)
- Rhabdorrhynchus* Motschulsky, 1860
- *echii* (Brahm, 1790) (~ *varius* (Herbst, 1795))
- *seriegranosus* Chevrolat, 1873 (+)
- *vilhelmseni* Gültekin, 2006 (~ *mixtus* (Fabricius, 1792))
- Temnorhinus* Chevrolat, 1872
- Temnorhinus (Fabiocleonus)* Arzanov, 2006
- *mendicus* (Gyllenhal, 1834) (◄)
- Temnorhinus (Temnorhinus)* Chevrolat, 1872
- *brevirostris* (Gyllenhal, 1834) (◄)
- *martini* Faust, 1904 (◄)
- *mixtus* (Fabricius, 1792) (◄) (~ *conicirostris* (Olivier, 1807))
- *turbinatus* (Chevrolat, 1869) (+)
- Trachydemus* Chevrolat, 1872
- *rugosus* (Lucas, 1846)
- Xanthochelus* Chevrolat, 1872
- *cinctiventris* (Fähræus, 1842)

### Lixini Schoenherr, 1823

- Bangasternus* Gozis, 1882
- *planifrons* (Brullé, 1832) (+)
- *siculus* (Capiomont, 1873)
- *villosus* (Capiomont, 1873) (~ *dieckii* (Capiomont, 1873))
- Gasteroclisus* Desbrochers des Loges, 1904
- Gasteroclisus (Gasteroclisus)* Desbrochers des Loges, 1904
- *augurius* (Boheman, 1835)
- Lachnaeus* Schoenherr, 1826
- *crinitus* (Schoenherr, 1826)
- Larinus* Dejean, 1821
- Larinus (Cryphopus)* Petri, 1907
- *ferrugatus* Gyllenhal, 1835 (~ *suborbicularis* Capiomont, 1874)
- *maroccanus* Capiomont, 1874 (~ *obesulus* Desbrochers des Loges, 1896) (◄)
- *reichei* Capiomont, 1874
- Larinus (Larinomesius)* Reitter, 1924
- *canescens* Gyllenhal, 1835 (+)
- *minutissimus* Desbrochers des Loges, 1891 (~ *adjectus* Fuente, 1897)
- *obtusus* Gyllenhal, 1835
- *ochreateus* (Olivier, 1807) (~ *scolymi* auctt.)
- *scolymi* (Olivier, 1807) (~ *flavescens* Germar, 1823)
- *nubeculosus* Gyllenhal, 1835 (+)
- Larinus (Larinus)* Dejean, 1821
- *buccinator* (Olivier, 1807)
- *cynarae* (Fabricius, 1787)
- *pollinis* (Laicharting, 1781) (~ *brevis* (Herbst, 1795))
- *siculus* Boheman, 1843
- *ursus* (Fabricius, 1792) (~ *albarius* Boheman, 1843, *pseudovittatus* Hoffmann, 1954)
- *vulpes* (Olivier, 1807)
- *maurus* (Olivier, 1807) (-)
- Larinus (Phyllonomeus)* Gistel, 1856
- *adpersus* Hochhuth, 1847 (~ *brenskei* Faust, 1890)

- *afer* Gyllenhal, 1835
- *albocinctus* Chevrolat, 1866
- *carlinae* (Olivier, 1807) (~ *sulphurifer* Boheman, 1843)
- *centaurii* (Olivier, 1807) (+)
- *gravidus* (Olivier, 1807) (~ *schoenherri* Capiomont, 1874)
- *iaceae* (Fabricius, 1775) (~ *immitis* Gyllenhal, 1835)
- *lethierryi* Brisout de Barneville, Ch., 1866
- *leuzeae* Fabre, 1870 (+) (~ *immitis* Capiomont et auctt.)
- *longirostris* Gyllenhal, 1835
- *nanus* Lucas, 1847 (~ *meridionalis* Rosenhauer, 1856, *escorialensis* Brisout de Barneville, Ch., 1866)
- *planus* (Fabricius, 1792) (~ *rusticanus* Gyllenhal, 1835)
- *sturnus* (Schaller, 1783)
- *turbinatus* Gyllenhal, 1835

*Lixus* Fabricius, 1801

*Lixus (Broconius)* Desbrochers des Loges, 1904

- *rubicundus* Zubkov, 1833 (+)

*Lixus (Callistolixus)* Reitter, 1916

- *cylindrus* (Fabricius, 1781)
- *furcatus* Olivier, 1807
- *hypocrita* Chevrolat, 1866

*Lixus (Compsolixus)* Reitter, 1916

- *albomarginatus* Boheman, 1843
- *anguinus* (Linnaeus, 1767)
- *ascanii* (Linnaeus, 1767) (~ *laufferi* Petri, 1904)
- *castellanus* Chevrolat, 1866
- *cruciferae* Hoffmann, 1956
- *juncii* Boheman, 1835
- *ochraceus* Boheman, 1843

*Lixus (Dilixellus)* Reitter, 1916

- *abdominalis* Boheman, 1835 (~ *punctiventris* Boheman, 1835) (1)
- *linearis* Olivier, 1807 (~ *cribricollis* Boheman, 1835)
- *pulverulentus* (Scopoli, 1763) (~ *angustatus* (Fabricius, 1775), ~ *algius* auctt.)
- *rumicis* Hoffmann, 1956
- *bardanae* (Fabricius, 1781) (+)

*Lixus (Epimeces)* Billberg, 1820

- *cardui* Olivier, 1807
- *filiformis* (Fabricius, 1781)
- *flaveolus* Motschulsky, 1849
- *scolopax* Boheman, 1835
- *ulcerosus* Petri, 1904

*Lixus (Eulixus)* Reitter, 1916

- *iridis* Olivier, 1807
- *professus* (Faust, 1885) (◄)
- *puncticollis* Brisout de Barneville, Ch., 1866 (◄)
- *umbellatarum* (Fabricius, 1787)
- *myagri* Olivier, 1807 (+)

*Lixus (Lixus)* Fabricius, 1801

- *paraplecticus* (Linnaeus, 1758) (+)

*Lixus (Ortholixus)* Reitter, 1916

- *acicularis* Germar, 1823
- *cinerascens* Schoenherr, 1832 (+) (~ *elegantulus* Boheman, 1843)

- *curvirostris* Capiomont, 1875
- *mucronatus* (Olivier, 1791)
- *rosenschoeldi* Boheman, 1842
- *trivittatus* Capiomont, 1875
- *vilis* (Rossi, 1790) (◄)

*Lixus (Phillixus)* Petri, 1904

- *brevipes* Brisout de Barneville, Ch., 1866 (◄)
- *brevirostris* Boheman, 1835 (◄)
- *scabricollis* Boheman, 1842 (◄)

*Microlarinus* Hochhuth, 1847

- *lareynii* (Jacquelin du Val, 1853) (~ *diecki* Faust, 1890)
- *lypriformis* (Wollaston, 1861) (+)

*Rhinocyllus* Germar, 1817

- *conicus* (Frölich, 1792)
- *oblongus* Capiomont, 1873

## MESOPTILIINAE Lacordaire, 1863

### Magdalidini Pascoe, 1870

*Magdalis* Germar, 1817

*Magdalis (Edo)* Germar, 1819

- *ruficornis* (Linnaeus, 1758)

*Magdalis (Laemosaccidius)* Smreczyński, 1972

- *exarata* C. Brisout de Barneville, 1862

*Magdalis (Magdalis)* Germar, 1817

- *duplicata* Germar, 1819
- *frontalis* (Gyllenhal, 1827)
- *memnonia* (Gyllenhal, 1837)
- *phlegmatica* (Herbst, 1797)
- *punctulata* (Mulsant & Rey, 1859) (+)
- *rufa* (Germar, 1823)
- *violacea* (Linnaeus, 1758)
- *nitida* (Gyllenhal, 1827) (+)

*Magdalis (Odontomagdalis)* Barrios, 1984

- *armigera* (Geoffroy, 1785)
- *carbonaria* (Linnaeus, 1758)

*Magdalis (Panopsis)* Daniel, K., 1903

- *fuscicornis* Desbrochers des Loges, 1870

*Magdalis (Panus)* Schoenherr, 1823

- *barbicornis* (Latreille, 1804)

*Magdalis (Porrothus)* Dejean, 1821

- *cerasi* (Linnaeus, 1758)

## MOLYTINAE Schoenherr, 1823

### Cryptorhynchini Schoenherr, 1825

#### Cryptorhynchina Schoenherr, 1825

*Cryptorhynchus* Illiger, 1807

*Cryptorhynchus (Cryptorhynchus)* Illiger, 1807

- *lapathi* (Linnaeus, 1758)

*Rhyephenes* Schoenherr, 1837

- *humeralis* (Guérin-Méneville, 1830) (+)

### Tylodina Lacordaire, 1865

*Acalles* Schoenherr, 1825

*Acalles (Acalles)* Schoenherr, 1825

- *alcarazensis* Stüben, 2009 (+)
- *almeriaensis* Stüben, 2001
- *breiti* A. Solari & F. Solari, 1909
- *camelus* (Fabricius, 1792) (+)
- *cazorlaensis* Stüben, 2004 (+)
- *cytisi* Stüben, 2004 (+)
- *fallax* Boheman, 1844 (+)
- *gadorensis* Stüben, 2001
- *guadarramaensis* Stüben, 2004 (+)
- *maraoensis* Stüben, 2001
- *misellus* Boheman, 1844 (+)

1 *Lixus punctiventris* Boheman, 1835 es un homónimo primario de *L. punctiventris* Germar, 1823, actualmente *Asproparthenis punctiventris*. El nombre de Boheman no puede calificarse como *nomen protectum* y debe reemplazarse por un sinónimo porque el Art. 23.9.1.1 del Código no se cumple, ya que la especie de Germar está en uso ininterrumpido desde su descripción y, por tanto, no puede ser calificada como *nomen oblitum*. Hay dos sinónimos disponibles con la misma fecha para sustituir la especie de Boheman y no parece que nadie haya dado precedencia a uno sobre el otro. Actuando como Primer Revisor (Art. 24.2) elijo como nombre válido *Lixus abdominalis* Boheman, 1835 sobre *Lixus angusticollis* Boheman, 1835.

- *monasterialis* Stüben, 2004 (+)
  - *ptinoides* (Marsham, 1802) (+)
  - *sarothamni* Stüben, 2003 (+)
  - *sierrae* Brisout de Barneville, H., 1865 (~ *bazaensis* Stüben, 2001)
  - *sintraniensis* Stüben, 1999
  - *vorstii* Stüben, 2015 (+)
  - *lemur* (Germar, 1823)
  - *lemur lemur* (Germar, 1823)
  - *parvulus* Boheman, 1837
  - *parvulus parvulus* Boheman, 1837
  - Acalles (Origoacalles)* Stüben & Astrin, 2010
    - *globulipennis* Wollaston, 1854 (+)
  - Acallocrates* Reitter, 1913
    - *minutesquamosus* Reiche, 1860 (+)
  - Acallorneuma* Mainardi, 1906
    - *ibericum* Stüben, 2005 (+)
  - Calacalles* Peyerimhoff, 1925
    - Calacalles (Calacalles)* Peyerimhoff, 1925
      - *moraguesi* (Desbrochers des Loges, 1898)
      - *theryi* (Peyerimhoff, 1925)
  - Coloracalles* Astrin & Stüben, 2008
    - *edoughensis* (Desbrochers des Loges, 1892) (~ *hederae* González, 1965) (◀)
    - *humerosus* (Fairmaire, 1862) (◀)
  - Dichromacalles* Stüben, 1998
    - Dichromacalles (Balcanacalles)* Stüben & Behne, 1998
      - *lentisci* (Chevrolat, 1861)
    - Dichromacalles (Dichromacalles)* Stüben, 1998
      - *algecirasensis* Stüben, 2013 (+)
      - *andalusiensis* Stüben, 2014 (+)
      - *diocletianus* (Germar, 1817)
      - *dromedarius* (Boheman, 1844)
      - *tuberculatus* (Rosenhauer, 1856)
      - *querilhaci* (Brisout de Barneville, H., 1865)
  - Echinodera* Wollaston, 1863
    - Echinodera (Echinodera)* Wollaston, 1863
      - *andalusiensis* Stüben, 2003 (+)
      - *bulbosa* Stüben & Astrin, 2008 (+)
      - *ceutaensis* Stüben, 2002 (+)
      - *globulus* (Meyer, 1896) (+)
      - *roudieri* Stüben, 1998
      - *spinosa* Stüben, 2006 (+)
      - *brisouti* (Reitter, 1985) (-)
      - *brisouti brisouti* (Reitter, 1985) (-)
      - *peragalloi* (Chevrolat, 1863)
  - Echinodera (Ruteria)* Roudier, 1954
    - *cognita* Stüben, 2006 (+)
    - *incognita* (Hoffmann, 1956)
    - *lusitanica* Stüben, 2014 (+)
    - *paganettii* (F. Solari, 1952) (◀)
    - *hypocrita* (Boheman, 1837) (◀)
  - Elliptacalles* Astrin & Stüben, 2008
    - *baeticus* Stüben, 2008 (+)
  - Kykliacalles* Stüben, 1999
    - Kykliacalles (Glaberacalles)* Stüben & Astrin, 2010
      - *erinaceus* Stüben, 2003 (+)
      - *oblongus* Stüben, 2018 (+)
      - *olceseii* (Tournier, 1873) (◀)
      - *punctaticollis* (Lucas, 1846)
      - *punctaticollis meteoricus* (Meyer, 1909)
      - *punctaticollis punctaticollis* (Lucas, 1846) (+)
    - Kykliacalles (Kykliacalles)* Stüben, 1999
      - *alcornocalensis* Stüben, Torres & Astrin, 2011 (+)
      - *almadophilus* Stüben, 2004 (+)
      - *anthyllis* Stüben, 2004 (+)
  - *astragali* Stüben, 2003 (+)
  - *bupleuri* Stüben, 2004 (+)
  - *plantapilosus* Stüben & Astrin, 2010 (+)
  - *pulchellus* (H. Brisout de Barneville, 1864) (+)
  - *reginae* Stüben, 2003 (+)
  - *reinosae* (Brisout de Barneville, H., 1867)
  - *subglaber* Rosenhauer, 1856
  - *yestensis* Stüben, 2003 (+)
  - *aubei* (Boheman, 1837) (◀)
  - *barbarus* (Lucas, 1846) (-)
  - *pyrenaeus* (Boheman, 1844) (+)
  - *teter* (Boheman, 1844) (-)
  - Kykliacalles (Palaeocacalles)* Stüben, 2003
    - *naviesi* (Boheman, 1837) (+)
    - *roboris* (Curtis, 1834) (+)
  - Montanacalles* Astrin & Stüben, 2008
    - *nevadaensis* (Stüben, 2001) (◀)
  - Onyxacalles* Stüben, 1999
    - Onyxacalles (Onyxacalles)* Stüben, 1999
      - *balearicus* Stüben, 2005 (+)
      - *bermejaensis* Stüben, 2001
      - *gibraltarensis* Stüben, 2002 (+)
      - *luigionii* (A. Solari & F. Solari, 1907)
      - *maginaensis* Stüben, 2004 (+)
      - *portusveneris* (Mayet, 1903)
      - *seguraensis* Stüben, 2003 (+)
      - *valencianus* Germann, 2005 (+)
      - *henoni* (Bedel, 1888) (-)
- Gasterocercini Zherikhin, 1991**
- Gasterocercus* Laporte & Brullé, 1828
    - *depressirostris* (Fabricius, 1792) (+)
    - *depressirostris hispanicus* Alonso-Zarazaga, Jover & Micó, 2009 (+)
- Ithyporini Lacordaire, 1865**
- Camptorhinus* Schoenherr, 1825
    - *simplex* Seidlitz, 1867
    - *statua* (Rossi, 1790)
    - *erectisquamis* G.A.K. Marshall, 1928 (+)
- Lepyrini W. Kirby, 1837**
- Lepyrus* Germar, 1817
    - *capucinus* (Schaller, 1783)
    - *palustris* (Scopoli, 1763) (+)
- Molytini Schoenherr, 1823**
- Hylobiina W. Kirby, 1837**
- Hylobius* Germar, 1817
    - Hylobius (Callirus)* Dejean, 1821
      - *abietis* (Linnaeus, 1758)
      - *transversovittatus* (Goeze, 1777)
      - *pinastri* (Gyllenhal, 1813)
- Molytina Schoenherr, 1823**
- Anisorhynchus* Schoenherr, 1842
    - *aratus* Boheman, 1842
    - *barbarus* (Boheman, 1834)
    - *costatus* Boheman, 1842 (+)
    - *fallax* Desbrochers des Loges, 1875 (+) (~ *monachus* (Germar, 1817))
    - *ferus* (Erichson, 1841)
    - *hespericus* Desbrochers des Loges, 1875
    - *laufferi* (Desbrochers des Loges, 1909)
    - *punctatosulcatus* Desbrochers des Loges, 1875
    - *scabrosus* (Geoffroy, 1785) (~ *barbatus* (Rossi, 1794))

*Leiosoma* Stephens, 1829

- *deflexum* (Panzer, 1795)
- *muscorum* Brisout de Barneville, Ch., 1863
- *oblongulum* Boheman, 1842
- *pyrenaeum* Brisout de Barneville, Ch., 1867
- *reynosae* Brisout de Barneville, Ch., 1866
- *robustum* Seidlitz, 1867

*Liparus* Olivier, 1807

*Liparus* (*Liparus*) Olivier, 1807

- *coronatus* (Goeze, 1777)
- *glabrirostris* (Kuester, 1849)

#### **Plinthina Lacordaire, 1863**

*Adexius* Schoenherr, 1834

- *scrobipennis* Gyllenhal, 1834 (+)

*Iberoplinthus* Meregalli, 1986

- *casalei* Meregalli, 1988
- *curvirostris* Meregalli, 1986
- *imbricatus* (Dufour, 1852)
- *kricheldorfii* (Reitter, 1910)
- *perezii* (Brisout de Barneville, Ch., 1866)
- *vidanoi* Meregalli, 1990

*Minyops* Schoenherr, 1823

- *carinatus* (Linnaeus, 1767)

*Mitoplinthus* Reitter, 1897

- *caliginosus* (Fabricius, 1775)
- *caliginosus caliginosus* (Fabricius, 1775)
- *caliginosus meridionalis* Meregalli, 1986

*Neoplinthus* Bedel, 1884

- *tigratus* (Rossi, 1792)
- *tigratus porculus* (Fabricius, 1801) [~ *porcatus* (Panzer, 1798)]
- *tigratus tigratus* (Rossi, 1792)

*Plinthus* Germar, 1817

*Plinthus* (*Plinthus*) Germar, 1817

- *findelii* Boheman, 1842

#### **Pissodini Gistel, 1848**

#### **Pissodina Gistel, 1848**

*Pissodes* Germar, 1817

*Pissodes* (*Pissodes*) Germar, 1817

- *castaneus* (DeGeer, 1775)
- *piceae* (Illiger, 1807)
- *pini* (Linnaeus, 1758)
- *pini pini* (Linnaeus, 1758)
- *piniphilus* (Herbst, 1797)
- *validirostris* (Sahlberg, C. R., 1834)

#### **Torneumatini Bedel, 1884**

*Pseudotorneuma* F. Solari, 1937

- *zariquieyi* Roudier, 1954

*Torneuma* Wollaston, 1860

*Torneuma* (*Paratorneuma*) Roudier, 1956

- *meseguerei* González, 1971
- *meseguerei lineae* Stüben, 2009 (+)
- *meseguerei meseguerei* González, 1971

*Torneuma* (*Paratyphlorus*) F. Solari, 1937

- *besucheti* (González, 1966) (◀)
- *Torneuma* (*Somodytes*) González, 1970

- *escolai* (González, 1970) (◀)

*Torneuma* (*Torneuma*) Wollaston, 1860

- *alhaurinense* Stüben, 2008 (+)
- *baeticum* Stüben, 2007 (+)
- *bensusani* Stüben, 2010 (+)
- *cadizense* Stüben, 2016 (+)
- *istanense* Stüben, 2008 (+)
- *longipenne* Pic, 1910

- *mateui* Roudier, 1954
- *morandae* Hoffmann, 1959
- *penaense* Germann & Braunert, 2014 (+)
- *serpentinum* Stüben, 2007 (+)
- *stanviti* Stüben, 2008 (+)
- *torresi* Stüben, 2009 (+)

#### **Typoderini Voss, 1965**

*Anchonidium* Bedel, 1884

*Anchonidium* (*Anchonidium*) Bedel, 1884

- *unguiculare* (Aubé, 1850)

*Styphloderes* Wollaston, 1873

*Styphloderes* (*Styphloderes*) Wollaston, 1873

- *exsculptus* (Boheman, 1843)
- *paulinoi* (Stierlin, 1886)

### **PLATYPODINAE Shuckard, 1840**

#### **Platypodini Shuckard, 1840**

*Euplatypus* Wood, 1993

- *hintzi* (C.F.C. Schaufuss, 1897)

*Platypus* Herbst, 1793

- *cylindrus* (Fabricius, 1792)

*Treptoplatypus* Schedl, 1972

- *oxyurus* (Dufour, 1843)

### **SCOLYTINAE Latreille, 1804**

#### **Corthylini LeConte, 1876**

#### **Corthyliina LeConte, 1876**

*Gnathotrichus* Eichhoff, 1869

- *materiarius* (Fitch, 1858) (+)

#### **Pityophthorina Eichhoff, 1878**

*Pityophthorus* Eichhoff, 1864

- *buyssoni* Reitter, 1901
- *buyssoni buyssoni* Reitter, 1901
- *glabratus* Eichhoff, 1878
- *lichtensteinii* (Ratzeburg, 1837)
- *micrographus* (Linnaeus, 1758)
- *micrographus micrographus* (Linnaeus, 1758)
- *pinsapo* Pfeffer, 1982
- *pityographus* (Ratzeburg, 1837)
- *pityographus pityographus* (Ratzeburg, 1837)
- *ramulorum* (Perris, 1856) [~ *pubescens* (Marshall, 1802)]
- *solus* (Blackman, 1928) (+)

#### **Cryphalini Lindemann, 1876**

*Cryphalus* Erichson, 1836

- *asperatus* (Gyllenhal, 1813) [~ *abietis* (Ratzeburg, 1837)]
- *numidicus* Eichhoff, 1878
- *piceae* (Ratzeburg, 1837)
- *saltuarius* Weise, 1891

*Ernoporicus* Berger, 1917

- *caucasicus* (Lindemann, 1876)
- *fagi* (Fabricius, 1798) (+)

*Ernoporus* C. G. Thomson, 1859

- *tiliae* (Panzer, 1793)

*Hypothenemus* Westwood, 1834

- *eruditus* (Westwood, 1834)
- *hampei* (Ferrari, 1867) (+)

*Trypophloeus* Fairmaire, 1864

- *binodulus* (Ratzeburg, 1837) [~ *spiculatus* Eggers, 1927]
- *granulatus* (Ratzeburg, 1837)
- *rybinskii* Reitter, 1895
- *rybinskii rybinskii* Reitter, 1895

### **Crypturgini LeConte, 1876**

*Aphanarthrum* Wollaston, 1854

- *alhauadi* (Peyerimhoff, 1923) (+)

*Cisurgus* Reitter, 1895

- *hystrix* (Abeille de Perrin, 1894) (~ *ragusae* Reitter, 1906)

*Crypturgus* Erichson, 1836

- *cinereus* (Herbst, 1793)
- *cribrellus* Reitter, 1895 (+)
- *dubius* Eichhoff, 1872 (+)
- *mediterraneus* Eichhoff, 1869
- *numidicus* Ferrari, 1867
- *pusillus* (Gyllenhal, 1813)

### **Dryocoetini Lindemann, 1876**

*Coccotrypes* Eichhoff, 1878

- *dactyliperda* (Fabricius, 1801)
- *carpophagus* (Hornung, 1842)

*Dactylotrypes* Eggers, 1927

- *longicollis* (Wollaston, 1864)

*Dryocoetes* Eichhoff, 1864

- *alni* (Georg, 1856) (+)
- *autographus* (Ratzeburg, 1837)
- *villosus* (Fabricius, 1792)
- *villosus villosus* (Fabricius, 1792)

*Lymantor* Løvendal, 1889

- *coryli* (Perris, 1855)

*Pseudothamnurgus* Eggers, 1912

- *scrutator* (Pandellé, 1883)

*Taphrorychus* Eichhoff, 1878

- *bicolor* (Herbst, 1793)
- *villifrons* (Dufour, 1843)

*Thamnurgus* Eichhoff, 1864

*Thamnurgus (Macrothamnurgus)* Mandelshtam, Petrov & Korotyayev, 2011

- *delphinii* (Rosenhauer, 1856)

*Thamnurgus (Parathamnurgus)* Mandelshtam, Petrov & Korotyayev, 2011

- *kaltenbachii* (Bach, 1849)

*Thamnurgus (Thamnurgus)* Eichhoff, 1864

- *characiae* Rosenhauer, 1878
- *euphorbiae* (Küster, 1845)
- *varipes* Eichhoff, 1878 (+)

*Triotemmus* Wollaston, 1864

- *subretusus* Wollaston, 1864

*Xylocleptes* Ferrari, 1867

- *bispinus* (Duftschmidt, 1825)
- *biuncus* Reitter, 1894

### **Hylastini LeConte, 1876**

*Hylastes* Erichson, 1836

- *angustatus* (Herbst, 1793)
- *attenuatus* Erichson, 1836
- *brunneus* (Erichson, 1836) (+)
- *cunicularius* Erichson, 1836 (+)
- *linearis* Erichson, 1836
- *pinicola* (Bedel, 1888) [~ *ater* (Paykull, 1800)(2)]

---

2 *Bostrichus ater* Paykull, 1800 es una identificación errónea de *B. ater* Fabricius, 1792, como reconoce Paykull mismo y, por tanto, no es un nombre disponible. Resulta difícil imaginar qué clase de inercia ha permitido que un nombre como éste se perpetúe como un espúreo nombre válido, a pesar del reemplazo efectuado por Bedel y que se sigue aquí. Esta situación ya ha sido advertida en Alonso-Zarazaga *et al.* (2016, 2017).

*Hylurgops* LeConte, 1876

- *glabratus* (Zetterstedt, 1828)
- *palliatu*s (Gyllenhal, 1813)

### **Hylesinini Erichson, 1836**

*Hylastinus* Bedel, 1888

- *obscurus* (Marshall, 1802)

*Hylesinus* Fabricius, 1801

- *crenatus* (Fabricius, 1787)
- *taranio* (Danthoine, 1788)
- *varius* (Fabricius, 1775)
- *wachtli* Reitter, 1887
- *wachtli orni* Fuchs, 1906

*Kissophagus* Chapuis, 1869

- *vicinus* (Comolli, 1837) [~ *hederae* (Schmidt, 1843)]

*Pteleobius* Bedel, 1888

- *kraatzii* (Eichhoff, 1864)
- *vittatus* (Fabricius, 1792)

### **Hylurgini Gistel, 1848**

*Chaetoptelius* Fuchs, 1913

- *vestitus* (Mulsant y Rey, 1861)

*Dendroctonus* Erichson, 1836

- *micans* (Kugelann, 1794)

*Hylurgus* Latreille, 1806

- *ligniperda* (Fabricius, 1787)
- *micklitzii* Wachtl, 1881

*Tomicus* Latreille, 1802

- *destruens* (Wollaston, 1865)
- *minor* (Hartig, 1834)
- *piniperda* (Linnaeus, 1758)

### **Hypoborini Nüsslin, 1911**

*Hypoborus* Erichson, 1836

- *ficus* Erichson, 1836

*Liparthrum* Wollaston, 1854

- *colchicum* Semenov-Tian-Shanskij, 1903
- *genistae* (Aubé, 1862)
- *genistae genistae* (Aubé, 1862)
- *mandibulare* Wollaston, 1854
- *mori* (Aubé, 1862)

### **Ipini Bedel, 1888**

*Ips* DeGeer, 1775

- *acuminatus* (Gyllenhal, 1827)
- *sexdentatus* (Boerner, 1766)
- *typographus* (Linnaeus, 1758)
- *duplicatus* (C.R. Sahlberg, 1836) (-)

*Orthotomicus* Ferrari, 1867

- *erosus* (Wollaston, 1857)
- *laricis* (Fabricius, 1792)
- *longicollis* (Gyllenhal, 1827)
- *mannsfeldi* (Wachtl, 1880) (◀)
- *proximus* (Eichhoff, 1868)
- *suturalis* (Gyllenhal, 1827)

*Pityogenes* Bedel, 1888

- *bidentatus* (Herbst, 1783)
- *bistridentatus* (Eichhoff, 1878)
- *calcaratus* (Eichhoff, 1878)
- *chalcographus* (Linnaeus, 1760)
- *quadridens* (Hartig, 1834)
- *trepanatus* (Nördlinger, 1848)
- *conjunctus* (Reitter, 1887)

*Pityokteines* Fuchs, 1911

- *curvidens* (Germar, 1823)
- *spinidens* (Reitter, 1895)
- *vorontzowi* (Jakobson, 1895)

### Phloeosinini Nüsslin, 1912

*Phloeosinus* Chapuis, 1869

- *aubei* (Perris, 1855) (~ *bicolor* auctt. iber.)
- *cedri* Brisout de Barneville, Ch., 1883
- *thujae* (Perris, 1855)

### Phloeotribini Chapuis, 1869

*Phloeotribus* Latreille, 1797

- *cristatus* (Fauvel, 1889)
- *hercegovinensis* (Seitner, 1920)
- *perfoliatus* (Wollaston, 1854)
- *peyerimhoffi* (Eggers, 1913)
- *pubifrons* (Guillebeau, 1893)
- *rhododactylus* (Marsham, 1802)
- *scarabaeoides* (Bernard, 1788)

### Polygraphini Chapuis, 1869

*Carphoborus* Eichhoff, 1864

- *minimus* (Fabricius, 1798)
- *perrisi* (Chapuis, 1869)
- *pini* Eichhoff, 1881

*Polygraphus* Erichson, 1836

- *poligraphus* (Linnaeus, 1758) (+)

### Scolytini Latreille, 1804

*Scolytus* Geoffroy, 1762

- *amygdali* Guérin-Méneville, 1847
- *carpini* (Ratzeburg, 1837)
- *intricatus* (Ratzeburg, 1837)
- *kirschii* Skalitzky, 1876
- *kirschii fasciatus* Reitter, 1890
- *kirschii kirschii* Skalitzky, 1876 (+)
- *laevis* Chapuis, 1869
- *mali* (Bechstein, 1805)
- *multistriatus* (Marsham, 1802)
- *pygmaeus* (Fabricius, 1787)
- *ratzeburgii* E.W. Janson, 1856
- *rugulosus* (P.W.J. Müller, 1818)
- *scolytus* (Fabricius, 1775)
- *sulcifrons* Rey, 1892 (+)

### Xyleborini LeConte, 1876

*Amasa* Lea, 1894

- *resecta* (Eggers, 1927) (+)

*Anisandrus* Ferrari, 1867

- *dispar* (Fabricius, 1792) (◄)

*Xyleborinus* Reitter, 1913

- *attenuatus* (Blandford, 1894)
- *saxesenii* (Ratzeburg, 1837)

*Xyleborus* Eichhoff, 1864

- *cryptographus* (Ratzeburg, 1837)
- *dryographus* (Ratzeburg, 1837)
- *eurygraphus* (Ratzeburg, 1837)
- *monographus* (Fabricius, 1792)
- *pfeilii* (Ratzeburg, 1837)
- *xylographus* (Say, 1826) (+)

*Xylosandrus* Reitter, 1913

- *crassiusculus* Motchulsky, 1866 (+)
- *germanus* (Blandford, 1894) (+)

### Xyloterini LeConte, 1876

*Trypodendron* Stephens, 1830

- *domesticum* (Linnaeus, 1758)
- *lineatum* (Olivier, 1795)
- *signatum* (Fabricius, 1792)

### Especies definitivamente eliminadas de la lista

*Asproparthenis carinata* (Zubkov, 1829), un probable error de identificación, especie de Europa oriental y Asia.

*Brachycerus aegyptiacus* Olivier, 1807, un probable error de identificación, especie del Mediterráneo oriental.

*Alocentron curvirostre* (Gyllenhal, 1833), especie Europea oriental que está ampliando actualmente su área hacia el oeste, pero las citas son errores anteriores a este desplazamiento.

*Mecinus marmota* (Fairmaire, 1883). La cita de Alonso-Zarazaga (1983) corresponde a *Mecinus comosus* Boheman, 1845.

*Chromonotus pictus* (Pallas, 1771), especie del sur de Rusia y centro de Asia.

*Cleopomiarus hispidus* (Bovie, 1909) (~ *hispidulus* (LeConte, 1876)), especie norteamericana, citada de Andalucía sobre ejemplares erróneamente etiquetados (Caldara, 2016).

*Coelositona latipennis* Gyllenhal, 1834. Las citas de esta especie de Portugal deben referirse al archipiélago de Madeira, donde está presente.

*Coniatus (Bagoides) splendidulus* (Fabricius, 1781), error de identificación por *C. (B.) suavis*, especie muy similar.

*Hylesinus wachtli wachtli* Reitter, 1887, subespecie endémica de Francia, aunque su validez es dudosa, estando su área rodeada por la otra subespecie.

*Hypera (Eririnomorpha) kunzei* Germar, 1822, especie de Europa centro-oriental.

*Larinus (Larinus) idoneus* Gyllenhal, 1835. Las citas de esta especie de la Península Ibérica corresponden a un error con la Iberia del Cáucaso, es decir, Georgia.

*Larinus (Larinus) latus* (Herbst, 1783) es una especie del sureste europeo que tan sólo llega al Adriático. Es muy parecida a *L. (L.) cynarae*, de la que se distingue con dificultad por caracteres morfológicos. De vez en cuando, aparece un ejemplar ibérico de esta última especie que recuerda a *L. latus*.

*Larinus (Larinus) onopordi* (Fabricius, 1787). Todas las citas ibéricas que se han podido comprobar (las de Torres Sala, 1962) corresponden a *L. vulpes*. El material gallego de López Seoane (1866) probablemente se identificó mal, dado que el insecto prefiere climas marcadamente mediterráneos o subáridos.

*Sibinia modesta* Desbrochers des Loges, 1895, especie del Cercano Oriente.

*Omius haematopus* Rosenhauer, 1856, especie italiana, probablemente citada de España por haber aparecido su descripción en el libro de este autor dedicado a la fauna andaluza. De todos modos, su identidad se desconoce.

*Otiiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici* (Linnaeus, 1758). La única cita existente de esta especie en España es anónima y la indica comiendo almendro en Almería. Evidentemente se trata de un error de identificación. La especie no parece pasar los Pirineos.

*Otiiorhynchus (Tithonus) chrysocomus* Germar, 1823 es una especie del centro y Este de Europa que alcanza en Francia tan sólo los Alpes de Saboya. En la colección Martorell y Peña del MZB los ejemplares existentes de esta especie son de Suiza y Carniola, no encontrándose ejemplares catalanes bajo este nombre.

*Phloeotribus spinulosus* (Rey, 1883): El único ejemplar con las etiquetas originales coincidentes con la cita y perteneciente a la colección de Jorge Lauffer en el MNCN ha sido reidentificado por mí como un *Hylastinus obscurus*.

*Phyllobius (Phyllobius) pellitus* Boheman, 1843 es una especie corso-sarda, citada por error de La Granja por Perris (1866). Podría ser una confusión por *Phyllobius (Phyllobius) squamosus* C. Brisout de Barneville, 1866.



*Polydrusus (Eurodrusus) armipes* Brullé, 1832. Especie del mediterráneo oriental. Actualmente, en la colección Martorell y Peña (MZB) no existen ejemplares con esta identificación.

*Rhinomias forticornis* (Boheman, 1843). Es una especie centro-europea cuya presencia en Francia incluso es controvertida (citada de los Vosgos y Alsacia en Hoffmann (1950), ausente en el catálogo francés de Pelletier (2014), presente en el catálogo Paleártico de Alonso-Zarazaga *et al.* (2017)), por lo que su presencia en la Península Ibérica es poco probable. Los ejemplares de la colección Martorell y Peña (MZB) son extranjeros, curiosamente uno lleva la etiqueta "Francia".

*Scleropterus offensus* Boheman, 1837 (~ *Acalles rufipes* Chevrolat, 1879). Especie de distribución centro y sudeuropea oriental. El error puede deberse a un etiquetado defectuoso de los ejemplares citados de España por parte de su colector, Augustin Joseph de Léséleuc, un cirujano de la Marina francesa que estuvo con su barco, el brick *Voligeur*, en Cádiz en 1841.

*Sitona bicolor* Fähræus, 1840 fue citado de Andalucía por Allard (1865) sobre material colectado por Lucas von Heyden. La distribución de esta especie no llega a España, tratándose de una especie rara del mediterráneo oriental (citada asimismo de Uzbekistán). Es posible un error de identificación por *S. brucki* Allard, 1870.

*Sitona hispanicus* Tournier, 1876, citada en algunos trabajos, es una especie inexistente, que nunca se ha descrito.

*Tropiphorus styriacus* (Bedel, 1885) fue citada de España septentrional como localidad típica de su sinónimo *Dochorhynchus caudulatus* Desbrochers des Loges, 1897, cuando los ejemplares tipo llevan claramente en sus etiquetas "Barcelona". Aparte de la dejadez manifiesta de Desbrochers des Loges, que convierte una localidad exacta en un área mucho más extensa, se trata evidentemente, de un error de etiquetado, puesto que la especie habita los Alpes orientales y zonas aledañas.

### Agradecimientos

Un trabajo como éste no puede llevarse a cabo sin la colaboración, el apoyo o el desprendimiento de muchos colegas y amigos. Reciban, pues, mis más sentidos agradecimientos todos los depositarios mencionados en la sección "Material y métodos", incluyendo los responsables de las colecciones institucionales y los colectores de los ejemplares reseñados.

Además quisiera dar las gracias *in memoriam* a mi maestro, mentor y amigo el Dr. Antonio Cobos Sánchez (†) por permitirme el estudio de ejemplares de su colección y la de la EEZA, cuando era un novato en la labores entomológicas.

Quiero dedicar asimismo un cariñoso abrazo a mi amigo y compañero de fatigas José Ignacio López Colón (Rivas-Vaciamadrid) por recoger y regalarme todos los gorgojos que lleva capturando durante un número incontable de años.

Mercedes París García se merece, por su apoyo, su paciencia cuando meto las narices en la colección del MNCN y "quiero reorganizar a mi modo" los animales y por sus acertados consejos sobre la gestión de la colección, mi más cariñoso agradecimiento.

El mismo agradecimiento cordial debo a Hélène Perrin (París) por todas las facilidades dadas a lo largo de tantos años para el estudio de las diversas colecciones del MNHN, entre ellas las colecciones de R. Oberthür y de A. Hoffmann.

Quiero hacer una especial mención de la desinteresada labor de Marcos Toribio (Tres Cantos) de coleccionar gorgojos y cederlos a la colección del MNCN, lo que merece todo mi agradecimiento.

Por último, pero con no menos cariño, quisiera agradecer a mi querido amigo Antonio J. Velázquez de Castro la revisión de este manuscrito, sus acertados consejos y su gentil recordatorio de dos determinaciones más de ejemplares de su colección que yo no había apuntado y que se han incluido.

Este trabajo ha sido subvencionado en parte por el proyecto CGL2015-66571-P (MINECO/FEDER) (Ministerio de Economía y Competitividad, España).

### Bibliografía

- ALLARD, E. 1865. Notes pour servir à la classification des coléoptères du genre *Sitones*. [Cont.] *Annales de la Société Entomologique de France*, (4) 4 (3) [1864]: 357-382.
- ALONSO-ZARAZAGA, M.A. 1983. Contribución al conocimiento de los Curculionioidea (Col.): II. Notas taxonómicas, faunísticas y ecológicas sobre especies ibéricas y canarias. *Boletín de la Asociación española de Entomología*, 7: 69-79.
- ALONSO-ZARAZAGA, M.A. 2002. Lista preliminar de los Coleoptera Curculionioidea del área ibero-balear, con descripción de *Melicus* gen. nov. y nuevas citas. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, 31: 9-33. Disponible en [www.sea-entomologia.org](http://www.sea-entomologia.org)
- ALONSO-ZARAZAGA, M.A. & C.H.C. LYAL 1999. *A world catalogue of families and genera of Curculionioidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae)*. Barcelona: Entomopraxis S.C.P., 315 pp.
- ALONSO-ZARAZAGA, M.A., R. CALDARA, A. MACHADO, N. MAUGHAN, J. PELLETIER, H. PIEROTTI, L. REN, A. SFORZI, H. SILFVERBERG & J. SKUHROVEC 2016. Addenda and Corrigenda to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, volumes 7 and 8 (Curculionioidea). *Graellsia*, 72(1): e043: 1-42. doi: 10.3989/graellsia.2016.v72.155.
- ALONSO-ZARAZAGA, M.A., H. BARRIOS, R. BOROVEC, P. BOUCHARD, R. CALDARA, E. COLONNELLI, L. GÜLTEKIN, P. HLAVÁČ, B. KOROTYAEV, C.H.C. LYAL, A. MACHADO, M. MEREGALLI, H. PIEROTTI, L. REN, M. SÁNCHEZ-RUIZ, A. SFORZI, H. SILFVERBERG, J. SKUHROVEC, M. TRÝZNA, A.J. VELÁZQUEZ DE CASTRO & N.N. YUNAKOV 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionioidea. *Monografías electrónicas S.E.A.*, 8: 1-729. Disponible en: <http://sea-entomologia.org/monoelec.html>
- BRIESE, D.T., C. ESPIAU & A. POUCHOT-LERMANS 1996. Microevolution in the weevil genus *Larinus*: The formation of host biotypes and speciation. *Molecular Ecology*, 5(4): 531-545.
- CALDARA, R. 2016. Systematics of the Holarctic species of the weevil genus *Cleopomiarus* Pierce (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Insect Biodiversity*, 4(6): 1-47.
- COBOS, A. 1950. Datos para el Catálogo de los Coleópteros de España. Especies de los alrededores de Málaga. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 47(9-10) [1949]: 563-609.
- COLONNELLI, E. 2004. *Catalogue of Ceutorhynchinae of the World, with a key to genera (Insecta: Coleoptera: Curculionidae)*. Argania Editio, Barcelona. 124 pp.
- DIECK, G. 1870. Eine entomologische Wintercampagne in Spanien. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 14(1-2): 145-184.
- DIOTTI, L., C. PESARINI & R. CALDARA 2015. Revisión sistemática del género *Cotaster* Motschulsky: nuove sinonimie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). *Giornale italiano di Entomologia*, 14(60): 223-240.
- FAUST, J. 1904. Revision der Gruppe cléonides vrais. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1904: 177-284.

- FLACH, K.. 1908. Bionomische Notizen. *Wien. Entomol. Zeit.*, **27**(4-5): 130-132.
- FOLWACZNY, B. 1973. Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae (Col. Curc.), ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen, nebst Angaben zur Verbreitung. *Entomol. Bl.*, **69**(2): 65-180.
- HEYDEN, L. VON. 1870. *Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen*. Berlin. Entomologischer Verein in Berlin. 218 pp. + 2 pl.
- HOFFMANN, A. 1950. Faune de France 52. *Coléoptères curculionides (Première partie)*. Paris: Lechevalier, 486 págs.
- IGLESIAS IGLESIAS, L. 1922. Enumeración de los Curculiónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Bol. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. y Nat.*, **18**: 1-117. [Reedición: 1988. Área de Ciencias Biológicas. Facsímil, Ediciós do Castro, A. Coruña].
- KIESENWETTER, H.VON. 1852. Énumération des Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne (Ile Partie). *Ann. Soc. ent. Fr.*, (2)**9**(4): 577-656.
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Reseña de la Historia Natural de Galicia*. Lugo, Imprenta de Soto Freire. 66 pp. Facsímil publicado en: Publicacións da Área de Ciencias Biológicas do Seminario de Estudos Galegos, con un prólogo de 28 págs. de X.A. Fraga Vázquez.
- MAGNANO, L. 1973. Gli "Otiorthynchus" dei gruppi "singularis" L. e "carnagnolae" Villa e considerazioni sulla partenogenesi di alcune di esse. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste*, **28**(2): 305-396.
- MEREGALLI, M. 2018. *World Catalogue of the Curculionidae: Lixinae: Cleonini* (<http://weevil.info/content/world-catalogue-curculionidae-lixinae-cleonini>) (consulted on 22nd September 2018)
- MOTSCHULSKY, V. DE. 1849. Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handschuh dans le Midi de l'Espagne, énumérés et suivis de notes. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, **22**(3): 52-163.
- OLIVEIRA, M.P. DE. 1889. Catalogue des Coléoptères du Portugal. *O Instituto: jornal científico e litterario*, **36**(8): 489-494.
- OLIVEIRA, M.P. DE. 1890a. Catalogue des Coléoptères du Portugal. *O Instituto: jornal científico e litterario*, **37**(7): 433-440.
- OLIVEIRA, M.P. DE. 1890b. Catalogue des Coléoptères du Portugal. *O Instituto: jornal científico e litterario*, **37**(12): 830-839.
- PELLETIER, J. 2014. Tribu Omiini Shuckard, 1840. Pp. 695. En: Tronquet, M. (coord.). *Catalogue des Coléoptères de France*. Association Roussillonnaise d'Entomologie. Perpignan, [3] + 1052 págs.
- PERRIS, E. 1866. Descriptions de quelques nouvelles espèces de Coléoptères, rectifications et notes. *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **5**(4) [1865]: 505-512.
- ROSENHAUER, W.G. 1856. *Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten*. Erlangen: Theodor Blaesing, viii + 429 pp, 3 pls.
- SKUHROVEC, J. 2013. Hyperinae. Pp. 423-437. En: Löbl, I. & Smetana, A. (eds.) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Curculionoidea II*. Brill, Leiden-Boston. 700 págs.
- TENENBAUM, S. 1915. *Fauna Koleopterologiczna wysp Balearskich*. (Faune coléoptérologique des îles Baléares). Warszawa. Gebethner & Wolff. 150 pp.
- TORRES SALA, J. DE. 1962. *Catálogo de la Colección Entomológica "Torres Sala" de Coleópteros y Lepidópteros de todo el mundo. Vol. 1*. Institución Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia. Valencia. 487 págs.
- WANAT, M. 2007. Synonymical notes on Palaearctic Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea). *Genus (Wroclaw)*, **18**(3): 493-501.