


De Monstruos y Prodigios (4):
Forma aberrante de *Lysandra golgus* (Hübner, 1808)
Fidel FERNANDEZ-RUBIO. Castellana, 138. 28046 MADRID.



(Anverso arriba, reverso abajo; izquierda ejemplar normal, derecha ejemplar aberrante. Escala gráfica en cm.)

La especie fue descrita por Hübner en 1808 con ejemplares procedentes de Sierra Nevada (Granada). Su área de dispersión está reducida a ciertas zonas elevadas de Sierra Nevada (Granada).

Descripción del aspecto habitual:

Envergadura 26-30 mm. **Macho:** (A) Anverso: De color azul brillante. Finas líneas negras marginales que se difunden por el final de las nerviaciones. Ala anterior con apex bastante agudo. Ala posterior con serie de minúsculos puntos submarginales, a veces vestigiales, que pueden faltar en los últimos espacios. (B) Reverso: De color canela claro, algo azulado en bases, especialmente en la posterior. Ala anterior con serie de puntos postdiscales muy marcados. Banda submarginal blanca que contiene puntos oscuros y que va precedida de lúnulas oscuras -a veces con escamas amarillentas vestigiales- que tienden a faltar hacia apex. Fina línea terminal oscura. Fimbrias blancas. Ala posterior con las lúnulas de la banda marginal más marcadas y constantes. La serie postdiscal muestra puntos más finos que los del ala anterior y, además, hay otros 2-3 en zona discal. Mancha trianguloide blanca -a veces con un minúsculo punto negro- en el centro del disco y otra mancha blanca cuneiforme sobre N-4. **Hembra:** de similar tamaño, con anverso castaño y a veces con subfusión azul más o menos extendida. Ala anterior con trazo discocelular poco marcado. Serie de lúnulas submarginales naranja, generalmente ausentes en ala anterior e incompleta en ala posterior. Reverso similar al del macho, algo más oscuro.

Descripción del ejemplar aberrante:

Ejemplar macho procedente del Veleta (Sierra Nevada- Granada) 05.vii.1978. Fidel Fernández-Rubio, leg.

Envergadura: 31 mm. (C) Anverso: Algo más claro que lo habitual, especialmente en zonas pre-marginales. (D) Reverso: También más claro, ausencia de dibujos terminales en ala anterior y reducción de ellos en la posterior. Los puntos de la serie postdiscal están convertidos en trazos gruesos bastante elongados.

Diagnos: El aspecto morfológico general y la procedencia del ejemplar hacen segura su determinación.

Especies paleárticas parecidas:

Lysandra dorylas, algo mayor generalmente y con apex más redondeado Ausente de Sierra Nevada (Granada). El macho presenta el anverso de tono azul más pálido y sin puntos premarginales en ala posterior, y el reverso también es más pálido y con los dibujos anaranjados premarginales más netos. La hembra muestra anverso más oscuro, con las lúnulas anaranjadas premarginales más expandidas y presentes generalmente en ala anterior y su reverso es más pálido con lúnulas naranja mas marcadas. *L. nivescens*, algo mayor y de apex más redondeado. Macho con anverso mucho más pálido, de un tono blanco perla y hembra con anverso del ala anterior mostrando, generalmente, una serie (incompleta) de lúnulas anaranjadas y con un reverso más pálido y con las lúnulas anaranjadas mucho menos intensas y extensas.

Observaciones: Esta elongación de los puntos, que llegan a transformarse en pequeños trazos, no es excepcional -aunque sea poco frecuente- en Lepidópteros.