

***Deltote deceptor* (Scopoli, 1763) primera cita para la península Ibérica (Lepidoptera: Noctuidae)**

Josep YLLA¹, Ramón MACIÀ², Xavier BOVER³ & Francisco BLAT⁴

¹ Urbanització Serrabonica; 08503 Gurb, Barcelona.

² Passeig de la Generalitat, 18, 5è D; 08500 Vic, Barcelona.

³ Carrer Sant Marc 2; 08519 Santa Eugènia de Berga, Barcelona.

⁴ 44367 Calle Santa Bárbara, 44; Los Bronchales, Teruel.

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, *Deltote deceptor*, faunística, península Ibérica

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, *Deltote deceptor*, faunistics, Iberian Peninsula.

En el transcurso de la revisión de la colección de uno de los autores (Francisco Blat) fue detectado un ejemplar fácilmente identificable como perteneciente a la especie *Deltote deceptor* (Scopoli, 1763). Lamentablemente, los datos de captura de este ejemplar único no son todo lo completos que cabría desear, puesto que en su etiqueta sólo se puede literalmente leer: "Bronchales (1.585 m.); TERUEL (Hispania); F. BLAT Leg.". Falta pues un dato importante, la fecha de captura. Sin embargo, según el hijo del propio recolector, el ejemplar fue capturado hará unos veinte o veinticinco años y, a pesar de que el mismo sigue viviendo aún en la localidad indicada, hasta el presente no ha podido encontrar ningún otro ejemplar.

Esta especie, perteneciente a la familia Noctuidae y a la subfamilia Acontiinae, no consta en el catálogo de los lepidópteros ibéricos de Vives Moreno (1994), por lo que el hallazgo en cuestión constituye la primera cita para la península Ibérica.

Deltote deceptor es una especie de características mesohigrófilas, con preferencia por los biotopos húmedos, en especial prados situados al margen de los bosques, claros en pendientes y en el interior de los bosques, prados inundados o ríos del fondo de valles. Vuela de mayo a principios de julio en una generación, aunque en zonas más meridionales presenta dos generaciones solapadas desde mayo hasta agosto. Las orugas, polífagas, se alimentan, de junio a septiembre según las localidades y el número de generaciones, de muy diversas gramíneas, con preferencia por las del género *Phleum* (*P. pratense* entre ellas). Crisalidan dentro de un ligero capullo tejido en el suelo, siendo éste el estadio en el que pasan el invierno. Los imagos acuden a la luz (Forster & Wohlfahrt, 1980; Koch, 1984; Rákósy, 1997).

Morfológicamente los ejemplares son inconfundibles, estando la especie muy bien representada en las láminas de una gran cantidad de libros (Forster & Wohlfahrt, 1980; Koch, 1984; Skou, 1991; Rákósy, 1997).

D. deceptor es una especie euroasiática que tiene su límite septentrional a las orillas de los mares del Norte y Báltico, el sureste de Siberia y el norte de China, mientras que su límite meridional se extiende hasta el sur de Francia, la Italia central, el norte de Yugoslavia, el sur de Rumanía y

el sur de Rusia (Rákósy, 1997). Estos últimos años el área de distribución de la especie se expande poco a poco hacia el norte y el noroeste (Forster & Wohlfahrt, 1980).

Los autores son conscientes de que a partir del hallazgo de un único ejemplar siempre es arriesgado inferir la presencia de una determinada especie en una área geográfica concreta, y más aún cuando el ejemplar procede de la revisión de antiguas colecciones, como el caso que nos ocupa. Sin embargo, teniendo en cuenta las características biológicas de *D. deceptor*, son de la opinión de que no es imposible pensar en la existencia de una población ibérica, por lo que, desde estas líneas animan a expertos y aficionados para que intensificando las prospecciones por toda la zona de los Montes Universales se acabe hallando nuevos ejemplares que permitan llegar a incluir, sin duda alguna, dicha especie en el elenco faunístico ibérico.

En este caso, *Deltote deceptor* aumentaría en una las especies de noctuidos conocidos de la península Ibérica y, siguiendo a Leraut (1997), se la debería incluir justo detrás de su congénérica *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775).

Agradecimiento:

Los autores agradecen la colaboración y los comentarios proporcionados por el Dr. José Luis Yela.

Referencias bibliográficas:

- Forster W. & Wohlfahrt, T.A., 1980. *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band IV, Eulen*. 329 pp, 32 pl. Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart.
- Koch, M., 1984. *Wir bestimmen Schmetterlinge*. 792 pp. Neumann Verlag, Leipzig-Radebeul.
- Leraut, P.J.A., 1997. *Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition)*. 526 pp. Supplément à Alexanor. Paris.
- Rákósy, L., 1997. *Die Noctuiden Rumäniens (Lepidoptera Noctuidae)*. 648 pp. Kataloge des O.Ö. Landesmuseums. Linz.
- Skou, P., 1991. *Nordens Ugler*. Danmarks Dyreliv Bind 5. 565 pp. Apollo Books. Stenstrup.
- Vives Moreno, A., 1994. *Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)*. 775 pp. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.