

## MÁS SOBRE *PLAGIONOTUS MARCORUM* LÓPEZ-COLÓN, 1997: PRESENCIA EN ALMERÍA (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)

José Ignacio López-Colón

Plaza de Madrid, 2. 28529 Rivas-Vaciamadrid, MADRID.

**Resumen:** Se confirma, mediante el estudio de una amplia serie de ejemplares, la presencia de *Plagionotus marcorum* López-Colón, 1997 en la provincia de Almería. Al mismo tiempo, se revisan las citas de *Plagionotus scalaris* (Brullé, 1832) en España llegando a la conclusión de que la especie debe ser eliminada del catálogo de especies ibéricas.

*Plagionotus marcorum* López-Colón, 1997 es un cerambícido que hasta el momento actual se conocía como endemismo de la Comunidad de Madrid. Nuestro apreciado colega Juan Jesús de la Rosa Maldonado está efectuando un Trabajo Fin de Carrera para la *Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos Forestales* de la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado una exhaustiva investigación de campo por el solar ibérico, descubriendo que el área de distribución de *P. marcorum* es bastante más amplia de la conocida, siempre ligado a su huésped, la malva trilobada (*Lavatera triloba* L.), no obstante restringida a la mitad meridional (\*).

En el marco de dicho Trabajo Fin de Carrera, el estudio detallado de una numerosa serie de *Plagionotus* de Vélez-Blanco (Almería), procedentes de los cortijos de Casa Nueva y Hoya del Marqués, capturados el 15 de mayo de 1999 (J.J. de la Rosa *leg.*), confirma sin duda que la población pertenece a la especie *Plagionotus marcorum*.

La reciente señalización de la presencia de *Plagionotus scalaris* (Brullé, 1832) en España, basada en una corta serie de seis ejemplares de Vélez-Blanco (Almería) (Ruiz García *et al.*, 1994; López-Colón, 1999) está basada en identificaciones erróneas y hay que asignarla a *P. marcorum*, por lo que *P. scalaris* debe eliminarse definitivamente del catálogo de especies ibéricas.

Por otra parte, otro ejemplar de *Plagionotus scalaris* (Brullé, 1832) conservado en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y etiquetado de "La Peineta, Sierra Quebdana (R. Candel *leg.*)" procede realmente, como se demostró entonces, de Marruecos y se trata de una localización próxima a Melilla (López-Colón, 1999).

Respecto a esta última cuestión, indicaremos que casualmente, al estudiar minuciosamente las publicaciones del gran entomólogo melillense, Anselmo Pardo Alcaide (Melilla, 1913 - Córdoba, 1977), con motivo de una biografía en curso de preparación, hemos encontrado una publicación sobre fauna entomológica marroquí en la que queda perfectamente localizada (Pardo Alcaide, 1950). En

la página 59 se cita *Plagionotus scalaris* (Brullé) de La Peineta I, donde el propio Pardo Alcaide lo capturó en el mes de abril sobre *Lavatera maritima* Gouan (además de citarlo de Muley Rechid, también debido a capturas propias en los meses de mayo y junio sobre la misma malvácea y de Yebel Kerker, donde fue capturado en el mes de junio por Santapau). Al final de ese libro, Pardo Alcaide describe con gran precisión todas las localizaciones indicadas en el texto. Así, en la página 72, precisa: "*La Peineta (situada en la cabila de Kebdana y el territorio de Kert, según la organización administrativa del antiguo Protectorado): Punto culminante (920 mts.), de la Sierra de Kebdana, a unos 40 kms. al S.E. de Melilla*" (Pardo Alcaide, 1950). Queda pues definitivamente aclarado el dilema sobre "La Peineta".

Por tanto, volviendo al origen del artículo, queremos aprovechar esta nota para rectificar ahora la conclusión sobre la presencia en la península Ibérica de *Plagionotus scalaris* (Brullé, 1832), cuyo área de distribución comprende Grecia, Macedonia, Bulgaria, sur de Italia, Caucaso, Asia Menor y norte de África, siendo bastante abundante en Marruecos, Argelia y Túnez, pero que no coloniza nuestra península.

(\*) Las conclusiones provisionales del mencionado estudio serán expuestas en las páginas de esta misma revista en breve, según nos indica D. J.J. de la Rosa Maldonado, que es quien nos ha autorizado a preparar esta breve nota para solventar el error.

**Bibliografía:** LÓPEZ-COLÓN, J.I. 1999. Localización de *Plagionotus scalaris* (Brullé, 1832) en la Península Ibérica (Coleoptera: Cerambycidae). *Bol. de la S.E.A.*, 1998 (1999), 23: 21-22 • PARDO ALCAIDE, A. 1950. *Contribución al conocimiento de la fauna entomológica marroquí. III*. Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-árabe (Publicación fuera de serie), pp. 1-73 • RUIZ GARCÍA, J.L., HERNÁNDEZ RUIZ, J.A. y PÉREZ LÓPEZ, F.J. 1994. Segunda cita de *Plagionotus scalaris* Brullé, 1832 para la Península Ibérica (*Col. Cerambycidae*). *Nouv. Rev. Ent. (N.S.)*, 11, 1: 94.

### Volúmenes SEA reeditados:

Bol. SEA, 16 (vol. monográfico):  
**Paleoentomología**, 1996 (1999, 1ª reed.), 206 pp., 16 artículos, 2000 pta.

Bol. SEA, 24 (vol. monográfico):  
**McM-manifiesto científico por Los Monegros**, 1998 (2000, 1ª reed.), 266 pp., 74 artículos, 3000 pta.

Socios SEA: 25 % descuento. Gastos de envío incluidos para Europa.