

Atrofia antenal bilateral con carácter simétrico en *Rutpela maculata* (Poda, 1761) (Col., Cerambycidae)

Rubén Peña León

Avda. del Pilar, 79; 50660 Tauste; Zaragoza.

Descripción del aspecto habitual del taxón: 13-20 mm. Tegumento de color negro, excepto una parte de las piezas bucales, la base de los artejos antenales a partir del tercero, parte de las patas y el borde apical de los segmentos abdominales, todos ellos de color amarillo.

Cabeza corta y ancha, con ojos muy salientes y un punteado granuloso. Las antenas se encuentran anilladas de amarillo y negro, alcanzando el último tercio de los élitros en los machos. El pronoto, más largo que ancho, presenta los ángulos posteriores agudos; disco densamente punteado y con una línea longitudinal mediana.

Los élitros presentan una gran variación de coloración lo que ha dado lugar a numerosas variedades, siendo lo más normal encontrarlos amarillos con el ápice negro. Presentan también una banda negra en el tercio apical, dos manchas laterales en la mitad de los élitros y una serie de pequeñas manchas en el tercio basal (sutural y lateral). Así mismo poseen una puntuación elitral poco densa y poco profunda, con el ápice muy truncado y el ángulo externo agudo.

Las patas son largas y robustas presentando un claro dimorfismo sexual, así los machos poseen las tibias posteriores muy arqueadas y dentadas.

Biología: La larva se desarrolla sobre numerosos caducifolios como *Alnus*, *Salix*, *Populus*, *Corylus*, *Betula*, *Quercus*, *Crataegus*, *Sorothamnus*, *Fagus*, *Pyrus*, *Evonymus*, *Castanea*, *Ulmus*, *Carpinus*, *Fraxinus*, aunque también se ha encontrado sobre coníferas como *Picea*, *Pinus* y *Juniperus*. Los adultos vuelan durante los meses de verano acudiendo a flores de umbelíferas, *Rosa*, *Sambucus*, *Filipendula*, *Rubus*.

Distribución: Se trata de una especie que se distribuye por toda Europa llegando hasta Siberia, Oriente Medio y el norte de Irán. En la Península Ibérica es abundante en toda la mitad norte.

Descripción del ejemplar teratológico: 1 ♂, Selva de Oza (Huesca); 26-07-2001; R. Peña *leg. et col.*


A simple vista el ejemplar parece tener tan sólo 10 artejos en cada antena, pero ésto es debido a que el 4º artejo se ha reducido y curvado alterando la disposición normal de los artejos siguientes. En el caso de la antena derecha la reducción es tan grande que los artejos 3º y 5º llegan a conectar por su parte externa.

Lo curioso de este ejemplar es que la malformación aparece de manera simétrica en ambas antenas, lo cuál, aunque no suele ser muy frecuente, ya aparece citado por ORTUÑO & HERNÁNDEZ (1993) y BAHILLO (1996).

Bibliografía:

BAHILLO, P. 1996. Algunos casos teratológicos en Coleoptera. *Zool. Baetica*, 7: 11-19.

ORTUÑO, V. M. & HERNÁNDEZ, J. M^a. 1993. Diversos casos teratológicos en Coleoptera. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 89(1-4): 163-179.



SOLICITUD DE COLABORACIÓN (GEOMETRIDAE: STERRHINAE) :

Para la confección de un trabajo en curso sobre la revisión y distribución en España de la tribu Sterrhini (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae), géneros *Idaea*, *Cleta* y *Anthometra*, solicitamos la colaboración de todos los socios. A tal objeto solicitamos el envío, en concepto de préstamo, del material que puedan tener disponible en sus colecciones. Una vez estudiado (y clasificado, en su caso), será debidamente devuelto a los propietarios. En la confianza de obtener una respuesta positiva, anticipamos nuestro agradecimiento.

Víctor REDONDO, c/. Blancas, 8; 50001 Zaragoza.

COLÉMBOLOS

Para la elaboración del **Catalogus de Collembola de Aragón** agradeceré en envío de citas o de todo tipo de material para determinar. Si utilizas cualquier tipo de trampas en el suelo para capturar insectos, o bien los extraes por el método de Berlese-Tullgren, seguro que obtendrás muchos colémbolos. Este material suele terminar en el cubo de la basura. Por favor, no los tires y envíamelos. Si no trabajas con estos métodos, pero no te importa ayudarme en el muestreo, no dudes en ponerte en contacto conmigo para que te indique cómo puedes muestrear.

Javier ARBEA, Departamento de Ciencias Naturales, IES Alhama, Avda. del Villar, 44; 31591 Corella (Navarra). Tef. 948 780660.

e-mail: jarbea@jet.es

COLEOPTEROS DE GALICIA

Intercambio material (sólo coleópteros) de Galicia por familias Geotrupidae y Scarabaeidae (Scarabaeoidea) sin determinar de la península Ibérica. Javier BLANCO. Plaza de Eugenio Fabrique, nº 8 3º B; 36208 Vigo (Pontevedra). Tef. 986 20680.6. javier1974@mixmail.com