

LISTA PRELIMINAR DE LOS COLEOPTERA CURCULIONOIDEA DEL ÁREA IBERO-BALEAR, CON DESCRIPCIÓN DE *MELICIUS* GEN. NOV. Y NUEVAS CITAS

M. A. Alonso-Zarazaga

Depto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC),
José Gutiérrez Abascal, 2, E-28006 Madrid, España

Resumen: Se describe un nuevo género de Curculionidae Cossoninae, *Melicius* gen. nov. (especie tipo: *Phloeophagus gracilis* Rosenhauer, 1856) y se incluyen en él las siguientes siete especies de *Phloeophagus*: *M. gracilis* (Rosenhauer, 1856), *M. cylindrus* (Boheman, 1838), *M. nigripes* (Reitter, 1901), *M. protensus* (Wollaston, 1873), *M. vossi* (Osella, 1975), *M. ulmi* (Kuñka, 1982) y *M. iranicus* (Osella, Zuppa & Lodos, 1993). Se diferencia de *Phloeophagus* fundamentalmente por las escrobas con el borde superior dirigido al ojo, paralelo al dorso rostral en perfil, por las mesocoxas separadas una distancia igual o superior al diámetro mesocoxal y por los élitros usualmente más gráciles. *Phloeophagus pawlowskii* Kuñka, 1984 se transfiere a la tribu Cossonini y se coloca provisionalmente en el género *Pseudocossonus* Wollaston, 1873 (comb. nov.). Se presentan además un género y seis especies nuevas para la Península Ibérica, que se incorporan a una lista preliminar del área ibero-balear que incluye 373 géneros, 1724 especies y 144 subespecies.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionoidea, *Melicius* gen. nov., Península Ibérica, nuevos registros, lista preliminar.

Checklist of the Coleoptera Curculionoidea of the Ibero-Balearic area, with description of *Melicius* gen. nov. and new records

Abstract: The genus *Melicius* gen. nov. is described in Curculionidae Cossoninae (type species: *Phloeophagus gracilis* Rosenhauer, 1856) and the following seven species of *Phloeophagus* are included: *M. gracilis* (Rosenhauer, 1856), *M. cylindrus* (Boheman, 1838), *M. nigripes* (Reitter, 1901), *M. protensus* (Wollaston, 1873), *M. vossi* (Osella, 1975), *M. ulmi* (Kuñka, 1982) and *M. iranicus* (Osella, Zuppa & Lodos, 1993). It differs from *Phloeophagus* Schoenherr, 1838 mainly by the upper margin of scrobe directed towards eye and parallel to rostral upper margin in side view, by the mesocoxae separated by a distance equal or larger than mesocoxal diameter and by the usually more slender elytra. *Phloeophagus pawlowskii* Kuñka, 1984 is transferred to the tribe Cossonini and is placed provisionally in the genus *Pseudocossonus* Wollaston, 1873 (comb. nov.). In addition, one genus and six species are recorded as new for the Iberian fauna, being incorporated to a checklist of the ibero-balearic area including 373 genera, 1724 sp., and 144 spp.

Key words: Coleoptera, Curculionoidea, *Melicius* gen. nov., Iberian Peninsula, new records, checklist.

Introducción

Este trabajo quiere proporcionar una base para el conocimiento de los Curculionoidea (Coleoptera) ibero-baleares. El área que se desea cubrir incluye la parte europea continental de España y Portugal, Andorra, el Archipiélago Balear, la Isla de Alborán y la colonia de Gibraltar. El último catálogo que cubría esta área (IGLESIAS IGLESIAS, 1922) no incluía los Scolytidae y Platypodidae; además, dada su antigüedad, está obsoleto y su utilidad, debido a los numerosos errores, es muy dudosa.

Representa asimismo un primer paso que se verá, esperemos que en breve, seguido y complementado con una clave a nivel de subgéneros para un área más extensa aún que la ibero-balear (Alonso-Zarazaga, *en prep.*) y por un catálogo bibliográfico comentado. Mientras tanto, se presenta una lista preliminar (checklist) que sigue la sistemática ecléctica usada en ALONSO-ZARAZAGA & LYAL (1999) y para Scolytidae y Platypodidae, datos tomados de WOOD & BRIGHT (1987, 1992) y de PFEFFER (1995), si bien de este último no se ha utilizado toda la nomenclatura propuesta, debido a algunas anomalías. El listado (que se

presenta a modo de Apéndice) incluye 14 familias, 33 subfamilias, 120 tribus, 373 géneros, 1724 especies, 144 subespecies y 74 *species inquirendae* (que no se han incluido en su totalidad en la presente lista). El elevado número de estas últimas se debe al desconocimiento aún profundo de nuestra fauna en esta superfamilia, lo que ha provocado que autores anteriores citasen para el área en consideración especies que hoy día se sabe no están presentes. Es necesario buscar los ejemplares testigos de esa cita y reidentificarlos.

Si se me permite hacer de profeta, un análisis comparativo bastante simple (respecto de las faunas francesa e italiana) basado en las especies pendientes de descripción en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y en las colecciones de colegas que trabajan en este grupo, arroja la nada desdeñable cifra de unas 400 especies pendientes de descripción, lo que supone un esfuerzo revisionario que espera manos y ojos que aún desconocen las maravillas que este grupo (complejo y difícil) esconde.

Se agrega aquí un nuevo género para la Ciencia y el registro de seis nuevas especies y un nuevo género para la región tratada.

1. Descripción del nuevo género.

Género *Melicius* nov.

ESPECIE TIPO: *Phloeophagus gracilis* Rosenhauer, 1856.

GÉNERO GRAMATICAL: masculino.

DESCRIPCIÓN:

Con los caracteres de Curculionidae Cossoninae Rhyncolini Phloeophagina. Cuerpo cilíndrico en sección. Rostro en vista dorsal más largo que ancho, al menos tan largo como la mitad de la longitud del pronoto, de lados subparalelos en vista dorsal, ligeramente estrechado hacia el ápice, éste más estrecho que la distancia interocular. Escroba con el borde superior dirigido hacia el ojo, paralelo al borde dorsal del rostro. Siete desmómeros. Base pronotal recta. Élitros usualmente gráciles (ratio L/A = 1,85-2,12), callos humerales más o menos desarrollados. Usualmente alados. Procoxas separadas por una distancia inferior a la mitad del diámetro procoxal. Mesosterno y metasterno aproximadamente en el mismo plano en perfil, sin escalón perceptible al nivel anterior de las mesocoxas; éstas separadas por una distancia aproximadamente igual a su anchura o mayor.

ETIMOLOGÍA:

Género afectuosamente dedicado a mi querido amigo Antonio Melic Blas, fuerza telúrica de la Naturaleza encarnada en ser humano, motor unipersonal y omnipresente de la Entomología en hablas ibéricas de estos últimos años (y que siga muchos más).

TÁXONES INCLUIDOS:

Este nuevo género incluye las siguientes **combinaciones nuevas** (desde *Phloeophagus*): *Melicius gracilis* (Rosenhauer, 1856), *M. cylindrus* (Boheman, 1838), *M. nigripes* (Reitter, 1901) y *M. protensus* (Wollaston, 1873) (Neártica), especies conocidas por mí *in natura*; además, a partir de sus descripciones: *M. vossi* (Osella, 1975), *M. ulmi* (KuÑka, 1982) y *M. iranicus* (Osella, Zuppa & Lodos, 1993). Las restantes especies neárticas adscritas a *Phloeophagus* deberán revisarse.

DIAGNÓSTICO:

El género *Phloeophagus* difiere fundamentalmente por las escrillas dirigidas oblicuamente al borde inferior del rostro, con sus bordes paralelos, por las mesocoxas separadas a lo sumo por aproximadamente los dos tercios del diámetro mesocoxal y por los élitros usualmente más robustos (ratio L/A = 1,48-1,82). Aquí entran: *P. lignarius* (Marsham, 1802), *P. turbatus* Schoenherr, 1845, *P. thomsoni* Grill, 1896, *P. schoenherri* (Hochhut, 1847). Además de estas especies, que conozco *in natura*, pertenecen a este género, según sus descripciones: *P. orientalis* Osella, 1975 y *P. brignolii* Osella, Zuppa & Lodos, 1993. *P. pawlowskii* KuÑka, 1984, del Nepal, por su descripción y las figuras acompañantes, pertenece a la tribu Cossonini y se coloca provisionalmente en el género *Pseudocossonus* Wollaston, 1873, como *P. pawlowskii* (KuÑka, 1984), **comb. nov.**

2. Especies nuevas para la Península Ibérica.

Los ejemplares testigo de estas nuevas citas se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, bien en la Colección General (MNCN) bien en la Colección Alonso-Zarazaga (AZ).

Rhynchitidae: Rhynchitinae: Rhynchitini

Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) vaucheri (Desbrochers, 1896) (fig. 1)

GRANADA: 1 ej., Carril forestal, Soportújar, 29-VI-[19]83 (Alonso Z.), s/. *Quercus pyrenaica*, AZ (comparado a un cotipo). MÁLAGA: 1 h., Río Pereilas, 350 m, S^a Alpujata, Coín, 10-V-[19]89 (Bastazo & Vela), s/. alcornoque, AZ.

Especie conocida por el momento tan sólo de Tánger (Marruecos) (KOCHER, 1961).

Rhynchitidae: Rhynchitinae: Auletini

Auletobius (Auletobius) maroccanus Hoffmann, 1953 (fig. 2)

ALMERÍA: 1 ej., Punta del Sabinar, El Ejido, 30SWF2660, 14-III-[19]92 (Unid. Zool. Granada), s/. *Pistacia*, AZ. Especie conocida exclusivamente de dos localidades marroquíes, la localidad típica (Reggou en el Muluya medio) y el Jebel Amsitten, cerca de Mogador.

Apionidae: Apioninae: Aplemonini

Helianthemapion kefense (Normand, 1921) (fig. 3)

GRANADA: 1 m., Collado de Ruquino, La Zubia, 1-X-[19]97 (M. Baena), pie de plantas, AZ. Especie conocida exclusivamente de la localidad típica en Túnez.

Dryophthoridae: Dryophthorinae

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) (fig. 4)

VIZCAYA: 3 ejs., Zugastieta, 19-II-1989 (P. Bahillo), MNCN. Especie de amplia distribución paleártica en ambiente eurosiberiano y que, hasta el momento, parecía no sobrepasar los Pirineos. Probablemente se encuentre en toda la cornisa cantábrica en madera en descomposición de caducifolios y aciculifolios, donde parece relacionarse con hormigas de los géneros *Lasius* Fabricius 1804 y *Formica* L. 1758.

Curculionidae: Ceutorhynchinae: Phytobiini


Pelenomus olssoni Israelson, 1972 (fig. 5)

CÓRDOBA: 1 m., Pozo Nuevo, S^a Zuheros, 25-V-1987 (M. Baena), AZ. Especie de distribución centroeuropea, llegando en Francia hasta la Gironda y Ariège. Su presencia en Córdoba hace pensar que estará ampliamente distribuida por la Península Ibérica en las áreas húmedas donde crece su planta patrón, *Lythrum portula*.

Curculionidae: Entiminae: Omiini

Chaerocephalus alternans (Fairmaire, 1866) (fig. 6)

CÁDIZ: 1 ej., S^a Luna, Algeciras, 27-XI-1982 (J. de Ferrer), AZ; 2 ejs., id., 9-XII-1983; 1 ej., Ctra. Ubrique - Pto. Gáliz, Cerro El Enemigo, 9-XII-[19]89 (Bastazo & Vela), AZ. MÁLAGA: 1 h., Fuente de la Yedra, Antequera, 800 m, 24-XII-[19]83 (J.A. Fernández Cortés), AZ. Género nuevo para la Península Ibérica, presente en Europa solamente en el sur de la península italiana y en Sicilia, siendo su área principal de distribución norteafricana. Esta especie, descrita originalmente de Tánger, está ampliamente distribuida por el norte de Marruecos (KOCHER, 1961).



Figs. 1-6: Aspectos de: 1. *Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) vaucheri*. 2. *Auletobius (Auletobius) maroccanus*. 3. *Helianthemapion kefense*. 4. *Dryophthorus corticalis*. 5. *Pelenomus olssoni*. 6. *Chaerocephalus alternans*.

Agradecimiento

Quiero expresar desde estas líneas mi más profundo agradecimiento a mi querido amigo el Dr. Christopher H. C. Lyal (The Natural History Museum, Londres, Reino Unido) por la oportunidad de estudiar materiales del género *Phloeophagus* en las colecciones del Museo durante una de mis recientes visitas y sus comentarios sobre los caracteres utilizados. Asimismo a los recolectores de los ejemplares que han tenido la gentileza de depositarlos en las colecciones del MNCN.

Bibliografía

- ALONSO-ZARAZAGA, M. A. & LYAL, C.H.C. 1999. *A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae)*. Entomopraxis, Barcelona. 315 pp.
- IGLESIAS IGLESIAS, L. 1922. Enumeración de los Curculiónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Bol. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. y Nat., XVIII: 1-117. [Reedición: 1988. Área de Ciencias Biológicas. Facsimilar Ediciós do Castro, A. Coruña].
- KOCHER, L. 1961. Catalogue commenté des Coléoptères du Maroc. Fasc. IX. Rhynchophores. *Travaux Inst. Scient. Cherif.*, Ser. Zool., 24: 1-263.
- PFEFFER, A. 1995. *Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer. Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae*. Pro Entomologia, Basel. 310 pp.
- WOOD, S. L. & BRIGHT, D. E. 1987. A Catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Part 1: Bibliography. *Great Basin Naturalist Memoirs*, 11: 1-685.
- WOOD, S. L. & BRIGHT, D. E. 1992. A Catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Part 2: Taxonomic Index. *Great Basin Naturalist Memoirs*, 13: 1-1553. (Vol. A: 1-833; vol. B: 834-1553).

APÉNDICE

Lista preliminar de los Curculionoidea iberobaleares

Para las referencias de autores y fechas de los táxones supragénéricos, consultese ALONSO-ZARAZAGA & LYAL (1999) y WOOD & BRIGHT (1987, 1992) o PFEFFER (1995, con precauciones). Es novedad la colocación de Anoplini e Itini en Molytinae. Otros cambios respecto de las referencias anteriores han sido publicados con anterioridad por diversos autores. No se indican los sinónimos, tan sólo los nombres aceptados para cada especie. Aunque se ha procurado que no existan errores, siempre es posible que se deslice algún paréntesis de más o de menos, o que alguna fecha deba cambiarse a resultas de una investigación más profunda en las publicaciones originales. También puede cambiar la consideración de *species inquirenda* para las especies citadas en el futuro. El uso de *Entomoderus* como se hace en la lista proviene de una comunicación personal del Dr. M. Meregalli, por lo que todas las combinaciones son nuevas.

● = sp./ ssp. citadas. ○ = *species inquirenda*

C U R C U L I O N O I D E A

ANTHRIBIDAE

ANTHRIBINAE

Anthribini

- Anthribus* Geoffroy, 1762
● *fasciatus* (Forster, 1770)
Opanthribus Schilsky, 1907
● *tessellatus* (Bohemian, 1829)

Platyrhinini

- Platyrhinus* [Clairville], 1798
● *resinosus* (Scopoli, 1763)

Platystomini

- Platystomos* Schneider, 1791
● *albinus* (Linnaeus, 1758)

Stenocerini

- Allandrus* LeConte, 1876
● *munieri* (Bedel, 1882)
● *undulatus* (Panzer, 1795)
Enedreytes Schoenherr, 1839
● *hilaris* Fåhraeus, 1839
● *sepicola* (Fabricius, 1792)
Phaenotheriolum Ganglbauer, 1903
● *espagnoli* (González, 1969)

Trigonorhinini

- Trigonorhinus* Wollaston, 1861
● *areolatus* (Bohemian, 1845)

Tropiderini

- Tropideres* Schoenherr, 1823
● *albirostris* (Schaller, 1783)

Zygaenodini

- Dissoleucas* Jordan, 1925
● *niveirostris* (Fabricius, 1798)
Noxius Jordan, 1936
● *curtirostris* (Mulsant & Rey, 1861)
Rhaphitropis Reitter, 1916
● *oxyacanthae* (Brisout, Ch., 1863)

CHORAGINAE

Araecerini

- Araecerus* Schoenherr, 1823
● *coffeeae* (Fabricius, 1801)

Choragini

- Araocerodes* Blackburn, 1900
● *grenieri* (Brisout, Ch., 1867)
Choragus Kirby, 1819
● *sheppardi* Kirby, 1819
Pseudochoragus Petri, 1912
● *nitens* (LeConte, 1884)

URODONTINAE

- Bruchela* Dejean, 1821
● *albida* (Kuester, 1848)
● *argentata* (Kuester, 1847)
● *cana* (Kuester, 1848)
● *carpetana* (Daniel, K., 1906)
● *conformis* (Suffrian, 1845)
● *flavescens* (Kuester, 1850)
● *parallela* (Kuester, 1848)
● *pygmaea* (Gyllenhal, 1833)
● *rufipes* (Olivier, 1790)
● *rufipes rufipes* (Olivier, 1790)
● *suturalis* (Fabricius, 1792)
Cercomorphus Perris & Jacquelín du Val, 1864
● *abbreviatus* Reitter, 1896
● *duvalii* Perris, 1864

APIONIDAE

APIONINAE

Apionitae

- Apion* Herbst, 1797
● *cruentatum* Walton, 1844
● *distincticolle* Desbrochers, 1870
● *frumentarium* (Linnaeus, 1758)
● *haematodes* Kirby, 1808
● *rubens* Stephens, 1839
● *rubiginosum* Grill, 1893
○ *longithorax* Desbrochers, 1889

Aplemonini

- Aizobius* Alonso Zarazaga, 1990
● *schaeferi* (Hoffmann, 1960)
● *sedi* (Germar, 1818)

Cistapion Wagner, 1924
● *cyanescens* (Gyllenhal, 1833)

Helianthemapion Wagner, 1930
● *aciculare* (Germar, 1817)
● *kefense* (Normand, 1921)
● *velatum* (Gerstaecker, 1854)

Onychapion Schilsky, 1901

Onychapion (Aphoplopodapion) Ehret, 1997
● *ferreri* Alonso Zarazaga, 1983
● *poupillieri* (Wencker, 1864)

Onychapion (Onychapion) Schilsky, 1901
● *tamarisci* (Gyllenhal, 1839)

Perapion Wagner, 1907

Perapion (Eroosapion) Ehret, 1994
● *lemoroi* (Brisout, Ch., 1880)

Perapion (Perapion) Wagner, 1907

● *curtiostre* (Germar, 1817)
● *hydrolapathi* (Marsham, 1802)
● *ilvense* (Wagner, 1905)
● *marchicum* (Herbst, 1797)
● *violaceum* (Kirby, 1808)
● *violaceum lopezi* (Hoffmann, 1957)
● *violaceum violaceum* (Kirby, 1808)

Phrissotrichum Schilsky, 1901

Phrissotrichum (Phrissotrichum) Schilsky, 1901
● *boteli* (Normand, 1939)
● *joannium* Ehret, 1997
● *sicanum* (Wencker, 1864)
● *tubiferum* (Gyllenhal, 1839)
● *wenckei* (Brisout, Ch., 1863)

Phrissotrichum (Schilskyapion) Alonso-Zarazaga, 1990

● *grenieri* (Desbrochers, 1875)
● *perrisii* (Wencker, 1859)
● *rugicolle* (Germar, 1817)

Pseudaplemonus Wagner, 1930

● *chevrolati* (Gyllenhal, 1833)
● *limonii* (Kirby, 1808)

Pseudoperapion Wagner, 1930

○ *brevirostre* (Herbst, 1797)

Pseudostenapion Wagner, 1930

○ *simum* (Germar, 1817)

Exapiini

Exapion Bedel, 1887

Exapion (Exapion) Bedel, 1887
● *compactum* (Desbrochers, 1888)
● *elongatissimum* (Desbrochers, 1870)
● *fuscirostre* (Fabricius, 1775)
● *fuscirostre flachi* (Wagner, 1906)
● *fuscirostre fuscirostre* (Fabricius, 1775)
● *genistae* (Kirby, 1811)
● *heikertingeri* (Wagner, 1918)
● *laufferi* (Schilsky, 1906)
● *laufferi laufferi* (Schilsky, 1906)
● *laufferi paganettii* (Wagner, 1914)
● *putoni* (Brisout, Ch., 1866)
● *wagnerianum* Schatzmayr, 1925
○ *dificile* (Herbst, 1797)
○ *subparallelum* (Desbrochers, 1888)

Exapion (Ulapion) Ehret, 1997

● *breviusculum* (Rosenhauer, 1856)
● *lemovicinum* (Hoffmann, 1928)
● *oblongulum* (Desbrochers, 1875)
● *uliciperda* (Pandellé, 1867)
● *ulicis* (Forster, 1771)

Lepidapion Schilsky, 1906

Lepidapion (Hidryocneme) Alonso-Zarazaga, 1990
● *cretaceum* (Rosenhauer, 1856)

Lepidapion (Lepidapion) Schilsky, 1906

● *acuminatum* (Schilsky, 1906)
● *argentatum* (Gerstaecker, 1854)
● *gallaecianum* (Desbrochers, 1894)
● *plagiatum* (Desbrochers, 1891)
● *squamidorsum* (Desbrochers, 1908)
● *squamigerum* (Jacquelin du Val, 1855)

Ixapiini

Ixapion Roudier & Tempère, 1973

● *variegatum* (Wencker, 1864)

Oxystomatini

Catapiina

Catapion Schilsky, 1906

● *burdigalense* (Wencker, 1858)
● *curtisi* (Stephens, 1831)
● *meieri* (Desbrochers, 1901)
● *natricis* (Planet, 1918)
● *pubescens* (Kirby, 1811)
● *seniculus* (Kirby, 1808)
● *seriatosetosulum* (Wencker, 1864)

Oxystomatina

Cyanapion Bokor, 1923

Cyanapion (Bothyorrhynchapion) Bokor, 1923
● *afer* (Gyllenhal, 1833)
● *gyllenhalii* (Kirby, 1808)
● *platalea* (Germar, 1817)
Cyanapion (Cyanapion) Bokor, 1923
● *alcyoneum* (Germar, 1817)
● *alcyoneum hispanicum* (Wencker, 1864)

Eutrichapion Reitter, 1916

Eutrichapion (Cnemapion) Bokor, 1923
● *vorax* (Herbst, 1797)
Eutrichapion (Eutrichapion) Reitter, 1916
● *ervi* (Kirby, 1808)
● *mystriophorum* Alonso-Zarazaga, 1994
● *viciae* (Paykull, 1800)

Eutrichapion (Psilocalymma) Alonso-Zarazaga, 1990

● *punctigerum* (Paykull, 1792)

Hemitrichapion Voss, 1959

Hemitrichapion (Dimesomyops) Alonso-Zarazaga, 1990

● *andalusiaccum* (Desbrochers, 1889)
● *pavidum* (Germar, 1817)
● *rapulum* (Wencker, 1864)

Hemitrichapion (Lotapion) (Alonso-Zarazaga, 1990)

● *sandovali* (Ferragu, 1957)
● *wagneri* (Flach, 1906)

Hemitrichapion (Tinocysba) Alonso-Zarazaga, 1990

● *filicorne* (Wencker, 1864)
● *lanigerum* (Gemminger, 1871)
● *reflexum* (Gyllenhal, 1833)
● *waltoni* (Stephens, 1839)
○ *juniperi* (Boheman, 1839)

Holotrichapion Györffy, 1956

Holotrichapion (Apiops) Alonso Zarazaga, 1990

● *pisi* (Fabricius, 1801)
Holotrichapion (Holotrichapion) Györffy, 1956
● *ononis* (Kirby, 1808)
● *ononis ononis* (Kirby, 1808)

Holotrichapion (Legaricapion) Ehret, 1990

● *aethiops* (Herbst, 1797)
● *gracilicolle* (Gyllenhal, 1839)

Oryxolaemus Alonso Zarazaga, 1990

● *scabiosus* (Weise, 1889)
○ *flavifemoratus* (Herbst, 1797)
○ *crocifemoratus* (Gyllenhal, 1839)

Oxystoma Duméril, 1805

● *craccae* (Linnaeus, 1767)

- *dimidiatum* (Desbrochers, 1897)
- *ochropus* (Germar, 1818)
- *pomonae* (Fabricius, 1798)
- Pirapion* Reitter, 1916
 - *immune* (Kirby, 1808)

Synapiina

- Ischnopterapion* Bokor, 1923
- Ischnopterapion (Chlorapion)* Gyōrffy, 1956
 - *cognatum* (Hochhuth, 1851)
 - *subglabrum* (Desbrochers, 1870)
 - *virens* (Herbst, 1797)
 - Ischnopterapion (Ischnopterapion)* Bokor, 1923
 - *aeneomicans* (Wencker, 1864)
 - *fairmairei* (Wencker, 1864)
 - *lotii* (Kirby, 1808)
 - *modestum* (Germar, 1817)
 - *plumbeomicans* (Rosenhauer, 1856)
 - Protopirapion* Alonso Zarazaga, 1990
 - *atratulum* (Germar, 1817)
 - *kraatzii* (Wencker, 1859)
 - Stenopterapion* Bokor, 1923
 - Stenopterapion (Cobosiotherium)* Alonso-Zarazaga, 1990
 - *cantabricum* (Desbrochers, 1870)
 - *dubium* (Desbrochers, 1896)
 - *scutellare* (Kirby, 1811)
 - *subsquamosum* (Desbrochers, 1891)
 - Stenopterapion (Stenopterapion)* Bokor, 1923
 - *meliloti* (Kirby, 1808)
 - *tenue* (Kirby, 1808)

Trichapiina

- Betulapion* Ehret, 1994
- *simile* (Kirby, 1811)
 - *simile simile* (Kirby, 1811)

Piezotrichelini

- Protapion* Schilsky, 1908
- *apricans* (Herbst, 1797)
 - *apricans apricans* (Herbst, 1797)
 - *apricans mediterraneum* (Wagner, 1908)
 - *assimile* (Kirby, 1808)
 - *dentipes* (Gerstaecker, 1854)
 - *difforme* (Germar, 1818)
 - *dissimile* (Germar, 1817)
 - *fulvipes* (Geoffroy, 1785)
 - *interjectum* (Desbrochers, 1895)
 - *laevicolle* (Kirby, 1811)
 - *nigritarse* (Kirby, 1808)
 - *ononidis* (Gyllenhal, 1827)
 - *pedale* (Mulsant & Rey, 1858)
 - *ruficroides* (Schatzmayr, 1925)
 - *schoenherri* (Bohemian, 1839)
 - *trifolii* (Linnaeus, 1768)
 - *varipes* (Germar, 1817)
- Pseudoprotapion* Ehret, 1990
- *astragali* (Paykull, 1800)
 - *elegantulum* (Germar, 1818)

Aspidapiitae

Aspidapiini

- Alocentron* Schilsky, 1901
 - *curvirostre* (Gyllenhal, 1833)
- Aspidapion* Schilsky, 1901
 - Aspidapion (Aspidapion)* Schilsky, 1901
 - *radiolus* (Marsham, 1802)
 - *soror* (Rey, 1895)
 - Aspidapion (Koestlinia)* Alonso-Zarazaga, 1990
 - *aeneum* (Fabricius, 1775)

Ceratapiiini

- Acentrotypus* Alonso Zarazaga, 1990
 - *brunnipes* (Bohemian, 1839)
- Ceratapion* Schilsky, 1901
 - Ceratapion (Acanephodus)* Alonso Zarazaga, 1990
 - *onopordi* (Kirby, 1808)
 - *onopordi onopordi* (Kirby, 1808)
 - *parens* (Desbrochers, 1870)
 - Ceratapion (Angustapion)* Wanat, 1995
 - *longiclava* (Desbrochers, 1897)
 - *macrorrhynchum* (Eppelsheim, 1888)
 - Ceratapion (Ceratapion)* Schilsky, 1901
 - *armatum* (Gerstaecker, 1854)
 - *carduorum* (Kirby, 1808)
 - *damyi* (Desbrochers, 1894)
 - *gibbirostre* (Gyllenhal, 1813)
 - Ceratapion (Clementiellus)* Alonso-Zarazaga, 1990
 - *robusticorne* (Desbrochers, 1866)
 - Ceratapion (Echinostroma)* Alonso-Zarazaga, 1990
 - *basicorne* (Illiger, 1807)
 - *dentirostre* (Gerstaecker, 1854)
 - *penetrans* (Germar, 1817)
 - *penetrans wanati* Alonso-Zarazaga, 1992
 - *scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)
 - *scalptum scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)
- Diplapion* Reitter, 1916
 - *confluens* (Kirby, 1808)
 - *detritum* (Mulsant & Rey, 1858)
 - *nitens* (Schilsky, 1901)
 - *squamuliferum* (Desbrochers, 1891)
 - *stolidum* (Germar, 1817)

Omphalapion

- Omphalapion* Schilsky, 1901
 - *beuthini* (Hoffmann, Anton, 1874)
 - *buddebergi* (Bedel, 1887)
 - *hookerorum* (Kirby, 1808)
 - *laevigatum* (Paykull, 1792)

Taphrotopium

- Taphrotopium* Reitter, 1916
 - Taphrotopium (Taphrotopium)* Reitter, 1916
 - *sulcifrons* (Herbst, 1797)

Kalcapioniini

- Kalcapion* Schilsky, 1906
 - *pallipes* (Kirby, 1808)
 - *semivittatum* (Gyllenhal, 1833)
 - *semivittatum semivittatum* (Gyllenhal, 1833)
 - *separandum* (Aubé, 1866)

Melanapion

- Melanapion* Wagner, 1930
 - Melanapion (Melanapion)* Wagner, 1930
 - *minimum* (Herbst, 1797)

Squamapion

- Squamapion* Bokor, 1923
 - *atomarium* (Kirby, 1808)
 - *cineraceum* (Wencker, 1864)
 - *elongatum* (Germar, 1817)
 - *flavimanum* (Gyllenhal, 1833)
 - *leucophaeatum* (Wencker, 1864)
 - *minutissimum* (Rosenhauer, 1856)
 - *origani* (Planet, 1918)
 - *vicinum* (Kirby, 1808)

Taeniapion

- Taeniapion* Schilsky, 1906
 - *rufescens* (Gyllenhal, 1833)
 - *rufulum* (Wencker, 1864)
 - *urticarium* (Herbst, 1784)

Malvapiiini

- Malvapion* Hoffmann, 1958
 - *malvae* (Fabricius, 1775)
- Pseudapion* Schilsky, 1906
 - *fulvirostre* (Gyllenhal, 1833)
 - *moschatae* (Hoffmann, 1938)
 - *rufirostre* (Fabricius, 1775)

Rhopalapion Schilsky, 1906
● *longirostre* (Olivier, 1807)

Metapiini

Metapion Schilsky, 1906
● *candidum* (Wencker, 1864)
● *hartmanni* (Desbrochers, 1897)
● *subcandidum* (Schilsky, 1902)

Podapiitae

Podapiini Wanat, 2002
Podapion Riley, 1883
● *baenai* Alonso-Zarazaga, 1998

ATTELABIDAE

APODERINAE

Apoderini

Apoderus Olivier, 1807
● *coryli* (Linnaeus, 1758)

ATTELABINAE

Attelabini

Attelabus Linnaeus, 1758
● *nitens* (Scopoli, 1763)
● *variolosus* Olivier, 1807

BRACHYCYERIDAE

BRACHYCYERINAE

Brachycerini

Brachycerus Olivier, 1789
● *baleanicus* Bedel, 1874
● *barbarus* (Linnaeus, 1758)
● *barbarus lateralis* Gyllenhal, 1833
● *barbarus ramosus* Schaufuss, 1882
● *callousus* Gyllenhal, 1833
● *foveicollis* Gyllenhal, 1833
● *lutosus* Gyllenhal, 1833
● *muricatus* Olivier, 1790
● *plicatus* Gyllenhal, 1833
● *pradieri* Fairmaire, 1856
● *repertus* Roudier, 1958
● *rotundicollis* Escalera, 1918
● *undatus* (Fabricius, 1798)

OCLADIINAE

Ocladiini

Ocladius Schoenherr, 1825
● *grandii* Osella & Meregalli, 1986

BRENTIDAE

BRENTINAE

Arrhenodini

Orfilaia Haedo Rossi, 1955
○ *reichei* (Fairmaire, 1859)

Eremoxenini

Amorphocephala Damoiseau, 1966
● *coronata* (Germar, 1817)

CURCULIONIDAE

BAGOINAE

Bagoini

Bagoous Germar, 1817
● *andalusiacus* González, 1971
● *argillaceus* Gyllenhal, 1836
● *chevrolati* Tournier, 1874
● *cylindricus* Rosenhauer, 1856
● *exilis* Jacquelin du Val, 1854
● *franzi* González, 1967
● *fuentei* Pic, 1908
● *gracilentus* Desbrochers, 1896
● *guttatus* Desbrochers, 1896
● *ibericus* González, 1971
● *limosus* (Gyllenhal, 1827)
● *lutulosus* (Gyllenhal, 1827)
● *perparvulus* Rosenhauer, 1856
● *revelieri* Tournier, 1874
● *rudicollis* Desbrochers, 1896
● *sardiniensis* Brisout, H., 1863
● *septemcostatus* Chevrolat, 1860
● *subruber* Reitter, 1890
● *vivesi* González, 1967
○ *biimpressus* Fahræus, 1845
○ *collignensis* (Herbst, 1797)
○ *diglyptus* Boheman, 1845
○ *frit* (Herbst, 1795)
○ *glabrirostris* (Herbst, 1795)
○ *lutosus* (Gyllenhal, 1813)
○ *lutulentus* (Gyllenhal, 1813)
○ *robustus* Brisout, H., 1863
○ *subcarinatus* Gyllenhal, 1836

Tanysphyrini

Tanysphyrus Germar, 1817
● *lemaiae* (Fabricius, 1792)

BARIDINAE

Baridini

Aulacobaris Desbrochers, 1892
● *andalusiaca* (Brisout, H., 1870)
● *angusta* (Brullé, 1832)
● *chlorizans* (Germar, 1824)
● *coerulescens* (Scopoli, 1763)
● *corsicana* (Schultze, 1904)
● *corynthia* (Fairmaire, 1892)
● *cuprirostris* (Fabricius, 1787)
● *fallax* (Brisout, H., 1870)
● *ignifer* (Fuente, 1901)
● *janthina* (Boheman, 1836)
● *lepidii* (Germar, 1824)
● *malachitica* Chevrolat, 1860
● *nivalis* (Brisout, H., 1870)
● *pertusa* (Kiesenwetter, 1864)
● *picicornis* (Marsham, 1802)
● *prasina* (Boheman, 1836)
● *prasina alcaidei* (Hoffmann, 1957)
● *prasina prasina* (Boheman, 1836)
● *viridipennis* (Rosenhauer, 1856)

Baris Germar, 1817

● *albomaculata* (Brisout, H., 1867)
● *analis* (Olivier, 1790)
● *novaki* Penecke, 1936
● *rufa* (Boheman, 1844)
○ *limbata* (Brisout, H., 1870)

Cosmobaris Casey, 1920

● *scolopacea* (Germar, 1824)

- Labiaticola* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
- *korbi* (Schulze, 1899)
 - *melaena* (Bohemian, 1836)
 - *teruelensis* (Hustache, 1927)
- Malvaevora* Zaslavskij, 1956
- *timida* (Rossi, 1792)
- Melaleucus* Chevrolat, 1883
- *picturatus* (Ménétriés, 1849)
 - *picturatus opiparis* (Jacquelin du Val, 1852)
 - *sellatus* (Bohemian, 1844)
 - *spoliatus* (Bohemian, 1836)
- Melanobaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
- *atronitens* (Chevrolat, 1861)
 - *elevata* (Reitter, 1899)
 - *erysimi* (Chobaut, 1917)
 - *erysimi erysimoides* Hoffmann, 1942
 - *laticollis* (Marsham, 1802)
 - *morio* (Bohemian, 1844)
 - *pyrenaica* (Hoffmann, 1933)
 - *quadraticollis* (Bohemian, 1844)
 - *atramentaria* (Bohemian, 1836)

Madopterini

Zygobardina

- Limnobaris* Bedel, 1885
- *t-album* (Linnaeus, 1758)

CEUTORHYNCHINAE

Ceutorhynchini

- Amalus* Schoenherr, 1825
- *scortillum* (Herbst, 1795)
- Baryoxyonyx* Hustache, 1931
- *rectetus* (Peyerimhoff, 1925)
- Calosirus* C. G. Thomson, 1859
- *apicalis* (Gyllenhal, 1827)
 - *terminatus* (Herbst, 1795)
- Ceutorhynchus* Germar, 1824
- *aeneicollis* Germar, 1824
 - *alternans* Brisout, Ch., 1869
 - *assimilis* (Paykull, 1792)
 - *atomus* Boheman, 1845
 - *barbareae* Suffrian, 1847
 - *carinatus* Gyllenhal, 1837
 - *chalybaeus* Germar, 1824
 - *coarctatus* Gyllenhal, 1837
 - *coerulescens* Gyllenhal, 1837
 - *constrictus* (Marsham, 1802)
 - *curtulus* Schultze, 1903
 - *erysimi* (Fabricius, 1787)
 - *flavomarginatus* Lucas, 1846
 - *fulvipes* Schultze, 1895
 - *fulvitarsis* Gougelet & H. Brisout, 1860
 - *gallorhenanus* Solari, 1949
 - *gracilis* Dieckmann & Smreczynski, 1972
 - *grenieri* Gougelet & H. Brisout, 1860
 - *gypsophilus* Colonnelli, 2000
 - *hirtulus* Germar, 1824
 - *ignitus* Germar, 1824
 - *inaffectatus* Gyllenhal, 1837
 - *insidiosus* Brisout, Ch., 1869
 - *intersetosus* Weise, 1883
 - *laetus* Rosenhauer, 1856
 - *leprieuri* Brisout, Ch., 1881
 - *leucorhamma* Rosenhauer, 1856
 - *micans* Brisout, Ch., 1869
 - *minutus* (Reich, 1797)
 - *mohri* Dieckmann, 1960
 - *napi* Gyllenhal, 1837

- *nevadensis* Hoffmann, 1959
 - *obstrictus* (Marsham, 1802)
 - *pallidactylus* (Marsham, 1802)
 - *pectoralis* Weise, 1895
 - *perrisi* Brisout, Ch., 1869
 - *pictarsis* Gyllenhal, 1837
 - *posthumus* Germar, 1824
 - *pulvinatus* Gyllenhal, 1837
 - *pumilio* (Gyllenhal, 1827)
 - *puncticollis* Boheman, 1845
 - *pyrenaeus* Brisout, Ch., 1869
 - *pyrrhorhynchus* (Marsham, 1802)
 - *querceti* (Gyllenhal, 1813)
 - *rapae* Gyllenhal, 1837
 - *resedae* (Marsham, 1802)
 - *rhenanus* Schultze, 1895
 - *rufipes* Brisout, Ch., 1869
 - *rugicollis* Brisout, Ch., 1869
 - *rusticus* Gyllenhal, 1837
 - *sardeanensis* Schultze, 1903
 - *squamulosus* Brisout, Ch., 1869
 - *steineri* Roudier, 1957
 - *striatellus* Schultze, 1900
 - *subpilosus* Brisout, Ch., 1869
 - *sulcicollis* (Paykull, 1800)
 - *syrites* Germar, 1824
 - *tenuirostris* Rosenhauer, 1856
 - *tibialis* Boheman, 1845
 - *typhae* (Herbst, 1795)
 - *viridanus* Gyllenhal, 1837
 - *viridipennis* Brisout, Ch., 1869
 - *sulcatus* Brisout, Ch., 1869
- Coeliastes* Weise, 1883
- *lamii* (Fabricius, 1792)
- Coeliodes* Schoenherr, 1837
- *ilicis* (Bedel, 1885)
 - *rana* (Fabricius, 1787)
 - *ruber* (Marsham, 1802)
 - *transversealbofasciatus* (Goeze, 1777)
 - *trifasciatus* Bach, 1854
- Datonychus* Wagner, 1944
- *arquatus* (Herbst, 1795)
 - *melanostictus* (Marsham, 1802)
 - *urticae* (Bohemian, 1845)
- Drupenatus* Reitter, 1913
- *nasturtii* (Germar, 1824)
- Ectamnogaster* Schultze, 1903
- *caviventris* (Schultze, 1896)
- Ethelcus* Reitter, 1916
- *denticulatus* (Schrank, 1781)
- Glocianus* Reitter, 1916
- *africanus* (Schultze, 1899)
 - *distinctus* (Brisout, Ch., 1870)
 - *fennicus* (Faust, 1895)
 - *granulithorax* (Schultze, 1900)
 - *inhumeralis* (Schultze, 1897)
 - *lethierryi* (Brisout, Ch., 1866)
 - *nebulosus* (Brisout, Ch., 1866)
 - *pilosellus* (Gyllenhal, 1837)
 - *punctiger* (Sahlberg, C.R., 1835)
- Hadropontus* Thomson, C. G., 1859
- *litura* (Fabricius, 1775)
 - *trimaculatus* (Fabricius, 1775)
- Mesoxoonyx* Korotyaev, 1997
- *hispanicus* (Hustache, 1926)
 - *sicardi* (Hustache, 1931)
- Micrelus* Thomson, C. G., 1859
- *ericae* (Gyllenhal, 1813)
 - *ferrugatus* (Perris, 1847)

- Micropontus* Wagner, 1944
- *campestris* (Gyllenhal, 1837)
 - *molitor* (Gyllenhal, 1837)
 - *rugulosus* (Herbst, 1795)
- Mogulones* Reitter, 1916
- *abbreviatulus* (Fabricius, 1792)
 - *arcasi* (Brisout, Ch., 1869)
 - *asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)
 - *borraginis* (Fabricius, 1792)
 - *cingulatus* (Schultze, 1897)
 - *crucifer* (Pallas, 1771)
 - *diecki* (Brisout, H., 1870)
 - *geographicus* (Goeze, 1777)
 - *gibbicollis* (Schultze, 1897)
 - *gratiosus* (Brisout, Ch., 1869)
 - *larvatus* (Schultze, 1897)
 - *peregrinus* (Gyllenhal, 1837)
 - *sorcinus* (Brisout, Ch., 1869)
 - *t-album* (Gyllenhal, 1837)
 - *tessellatus* (Schultze, 1899)
- Nedyus* Schoenherr, 1825
- *quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758)
- Neoglocianus* Dieckmann, 1972
- *maculaalba* (Herbst, 1795)
- Oprohinus* Reitter, 1916
- *picipennis* (Schultze, 1898)
 - *suturalis* (Fabricius, 1775)
- Paracoeloides* Colonnelli, 1979
- *conformis* (Grilat, 1887)
- Parethelcus* Wagner, 1943
- *pollinarius* (Forster, 1771)
- Paroxyonyx* Hustache, 1931
- *cinctus* (Chevrolat, 1861)
 - *imitator* (Wagner, 1928)
 - *fallaciosus* (Desbrochers, 1896)
- Phrydiuchus* Gozis, 1885
- *quijote* Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1995
 - *topiarius* (Germar, 1824)
- Prisistus* Reitter, 1916
- *biscutellatus* (Chevrolat, 1859)
 - *obsoletus* (Germar, 1824)
- Ranunculiphilus* Dieckmann, 1969
- Ranunculiphilus (Austroceutorhynchus)* Korotyaev, 1980
 - *italicus* (Brisout, Ch., 1869)
- Ranunculiphilus (Ranunculiphilus)* Dieckmann, 1969
- *faeculentus* (Gyllenhal, 1837)
 - *obscurus* (Brisout, Ch., 1869)
- Sirocalodes* Voss, 1958
- *depressicollis* (Gyllenhal, 1813)
 - *mixtus* (Mulsant & Rey, 1858)
 - *quericola* (Paykull, 1792)
- Stenocarus* Thomson, C. G., 1859
- *cardui* (Herbst, 1784)
 - *ruficornis* (Stephens, 1831)
- Thamiocolus* Thomson, C. G., 1859
- *kraatzii* (Brisout, Ch., 1869)
 - *niveus* (Chevrolat, 1859)
 - *pubicollis* (Gyllenhal, 1837)
 - *subulatus* (Brisout, Ch., 1869)
- Theodorinus* Korotyaev, 1982
- Theodorinus (Atlantonyx)* Korotyaev, 1999
 - *hispanicus* Colonnelli, 1995
- Trichosirocalus* Colonnelli, 1979
- *barnevillei* (Grenier, 1866)
 - *briesei* Alonso-Zarazaga & Sánchez-Ruiz, 2002
 - *dawsoni* (Brisout, Ch., 1869)
 - *histrix* (Perris, 1852)
 - *horridus* (Panzer, 1801)
 - *rufulus* (Dufour, 1851)
- *troglodytes* (Fabricius, 1787)
 - *urens* (Gyllenhal, 1837)
- Zacladus* Reitter, 1912
- *exiguus* (Olivier, 1807)
 - *geranii* (Paykull, 1800)
- Hypurini**
- Aphytobius* Wagner, 1937
- *fuentei* (Desbrochers, 1908)
 - *luctuosus* (Desbrochers, 1896)
- Hypurus* Rey, 1882
- *bertrandi* (Perris, 1852)
- Oreorrhynchaeus* Otto, 1894
- *hispanicus* Wagner, 1941
- Pseudophytobius* Desbrochers, 1884
- *saltator* Desbrochers, 1884
- Mononychini**
- Mononychus* Germar, 1824
- *punctumalbum* (Herbst, 1784)
 - *superciliaris* Boheman, 1844
- Phytobiini**
- Neophytobius* Wagner, 1936
- *granatus* (Gyllenhal, 1835)
 - *quadrinodosus* (Gyllenhal, 1813)
- Pelenomus* Thomson, C.G., 1859
- *comari* (Herbst, 1795)
 - *olssonii* Israelson, 1972
 - *quadricorniger* Colonnelli, 1986
 - *quadrituberculatus* (Fabricius, 1787)
 - *waltoni* (Boheman, 1843)
- Phytobius* Schoenherr, 1833
- *leucogaster* (Marsham, 1802)
- Rhinoncus* Schoenherr, 1825
- *bruchoides* (Herbst, 1784)
 - *castor* (Fabricius, 1792)
 - *inconspicetus* (Herbst, 1795)
 - *pericarpius* (Linnaeus, 1758)
 - *perpendicularis* (Reich, 1797)

CONODERINAE

Coryssomerini

- Coryssomerus* Schoenherr, 1825
- *capucinus* (Beck, 1817)

COSSONINAE

Choerorhinini

- Choerorhinus* Fairmaire, 1858
- *squalidus* Fairmaire, 1858

Cossonini

- Cossonus* [Clairville], 1798
- Cossonus (Cossonus)* [Clairville], 1798
- *linearis* (Fabricius, 1775)
 - *parallelepipedus* (Herbst, 1795)

Mesites Schoenherr, 1838

- Mesites (Mesites)* Schoenherr, 1838
- *aquitanus* Fairmaire, 1859
 - *cunipes* Boheman, 1838
 - *pallidipennis* Boheman, 1838

Dryotribini

- Amaurorhinus* Fairmaire, 1860
- Amaurorhinus (Amaurorhinus)* Fairmaire, 1860
- *bewickianus* (Wollaston, 1860)
- Amaurorhinus (Mazagranus)* Pic, 1905
- *obscuripennis* Pic, 1905
- Cotaster* Motschulsky, 1851
- *cuneipennis* (Aubé, 1850)

- Pentatemnus* Wollaston, 1861
 • *ochotorenai* Alonso-Zarazaga, 1995
- Onycholipini**
Brachytemnus Wollaston, 1873
 • *porcatus* (Germar, 1824)
Hexarthrum Wollaston, 1860
 • *capitulum* (Wollaston, 1858)
 • *exiguum* (Bohemian, 1838)
Pselactus Broun, 1866
 • *spadix* (Herbst, 1795)
Pseudophloeophagus Wollaston, 1873
 • *aeneopiceus* (Bohemian, 1845)
Stenoscelis Wollaston, 1861
Stenoscelis (Stenoscelis) Wollaston, 1861
 • *submuricatus* (Bohemian, 1837)
Stereocorynes Wollaston, 1873
 • *truncorum* (Germar, 1824)
- Pentarthrini**
Euophryum Broun, 1909
 • *rufum* (Broun, 1880)
Pentarthrum Wollaston, 1854
 • *huttoni* Wollaston, 1854
- Rhyncolini**
Phloeophagina
Melicius Alonso-Zarazaga, 2002
 • *cylindrus* (Bohemian, 1838)
 • *gracilis* (Rosenhauer, 1856)
Phloeophagus Schoenherr, 1838
 • *lignarius* (Marsham, 1802)
 • *thomsoni* (Grill, 1896)
- Rhyncolina**
Aphanommata Wollaston, 1873
 • *filum* (Mulsant & Rey, 1858)
Rhyncolus Germar, 1817
Rhyncolus (Axenomimetes) Voss, 1955
 • *reflexus* Boheman, 1838
Rhyncolus (Rhyncolus) Germar, 1817
 • *ater* (Linnaeus, 1758)
 • *elongatus* (Gyllenhal, 1827)
 • *punctatulus* Boheman, 1838
 • *sculpturatus* (Waltl, 1839)
 • *strangulatus* (Perris, 1852)
- CRYPTORHYNCHINAE**
- Camptorhinini**
Camptorhinus Schoenherr, 1825
 • *simplex* Seidlitz, 1867
 • *statua* (Rossi, 1790)
- Cryptorhynchini**
Cryptorhynchus Illiger, 1807
 • *lapathi* (Linnaeus, 1758)
- Tylodina**
Acalles Schoenherr, 1825
 • *almeriensis* Stüben, 2001
 • *aubei* Boheman, 1837
 • *bazaensis* Stüben, 2001
 • *breiti* Solari & Solari, 1908
 • *gadorensis* Stüben, 2001
 • *hederae* González, 1965
 • *humerosus* Fairmaire, 1862
 • *lemur* (Germar, 1824)
 • *maraoensis* Stüben, 2001
 • *olcesei* Tournier, 1873
 • *parvulus* Boheman, 1837
- *ptinoides* (Marsham, 1802)
 • *rufipes* Chevrolat, 1879
 • *sierrae* Brisout, H., 1865
 • *sintraniensis* Stüben, 1999
 • *subglaber* Rosenhauer, 1856
Calacalles Peyerimhoff, 1925
Calacalles (Calacalles) Peyerimhoff, 1925
 • *theryi* (Peyerimhoff, 1925)
Calacalles (Saetiocalles) Bahr, 2000
 • *moraguesi* (Desbrochers, 1898)
Dichromacalles Stüben, 1998
Dichromacalles (Dichromacalles) Stüben, 1998
 • *diocletianus* (Germar, 1817)
 • *dromedarius* (Bohemian, 1844)
 • *lentisci* (Chevrolat, 1861)
 • *querilhaci* (Brisout, H., 1865)
 • *tuberculatus* (Rosenhauer, 1856)
Echinodera Wollaston, 1863
Echinodera (Dieckmannia) Stüben, 1998
 • *brisouti* (Reitter, 1985)
 • *brisouti brisouti* (Reitter, 1985)
 • *roudieri* Stüben, 1998
Echinodera (Echinodera) Wollaston, 1863
 • *incognita* (Hoffmann, 1956)
 ○ *variegata* (Bohemian, 1837)
Kyklioacalles Stüben, 1999
 • *barbarus* (Lucas, 1846)
 • *nevadaensis* Stüben, 2001
 • *punctaticollis* (Lucas, 1846)
 • *punctaticollis meteoricus* (Meyer, 1909)
 • *reinosae* (Brisout, H., 1867)
 • *teter* (Bohemian, 1844)
 ○ *punctaticollis punctaticollis* (Lucas, 1846)
Onyxacalles Stüben, 1999
 • *bermejaensis* Stüben, 2001
 • *henoni* (Bedel, 1888)
 • *luigionii* (Solari & Solari, 1907)
 ○ *portusveneris* (Mayet, 1903)
 ○ *pyrenaeus* (Bohemian, 1844)
Ruteria Roudier, 1954
 • *hypocrita* (Bohemian, 1837)
 • *paganettii* (Solari, 1952)
- Torneumatini**
Pseudotorneuma Solari, 1937
 • *besucheti* González, 1966
 • *zariqueyi* Roudier, 1954
Somodytes González, 1970
 • *escolai* González, 1970
Torneuma Wollaston, 1860
Torneuma (Torneuma) Wollaston, 1860
 • *longipenne* Pic, 1910
 • *mateui* Roudier, 1954
 • *mesegueri* González, 1971
 • *morandae* Hoffmann, 1958
- CURCULIONINAE**
- Acentrini**
Acentrus Desmarest, 1839
 • *histrio* (Schoenherr, 1837)
- Anthonomini**
Anthonomus Germar, 1817
Anthonomus (Anthonomus) Germar, 1817
 • *pedicularius* (Linnaeus, 1758)
 • *piri* Kollar, 1837
 • *pomorum* (Linnaeus, 1758)
 • *rubi* (Herbst, 1795)
 • *spilotus* Redtenbacher, 1849

- *ulmi* (DeGeer, 1775)
 - Anthonomus* (*Furcipes*) Desbrochers, 1868
 - *rectirostris* (Linnaeus, 1758)
 - Brachonyx* Schoenherr, 1825
 - *pineti* (Paykull, 1792)
 - Bradybatus* Germar, 1824
 - Bradybatus* (*Bradybatus*) Germar, 1824
 - *kellneri* Bach, 1854
 - Bradybatus* (*Nothops*) Marseul, 1868
 - *elongatulus* (Boheman, 1843)
 - Sphincticraerus* Marseul, 1871
 - *lethierryi* (Desbrochers, 1869)
- Cionini**
- Cionellus* Reitter, 1904
 - *gibbifrons* (Kiesenwetter, 1851)
 - Cionus* Clairville, 1798
 - *alauda* (Herbst, 1784)
 - *hortulanus* (Geoffroy, 1785)
 - *leonhardi* Wingelmüller, 1914
 - *leonhardi inexpectatus* Tempère, 1961
 - *longicollis* Brisout, Ch., 1863
 - *nigritarsis* Reitter, 1904
 - *olens* (Fabricius, 1792)
 - *olivieri* Rosenschöld, 1838
 - *schoenherri* Brisout, Ch., 1863
 - *scrophulariae* (Linnaeus, 1758)
 - *thapsus* (Fabricius, 1792)
 - *tuberculosus* (Scopoli, 1763)
 - Cleopus* Dejean, 1821
 - *pulchellus* (Herbst, 1795)
 - Stereonychus* Suffrian, 1854
 - *fraxini* (DeGeer, 1775)
 - *phyllireae* Chevrolat, 1859
 - *telonensis* Grenier, 1864
- Curculionini**
- Archarius* Gistel, 1856
 - *crux* (Fabricius, 1777)
 - *ochreatus* (Fåhraeus, 1843)
 - *pyrrhoceras* (Marsham, 1802)
 - *salicivorus* (Paykull, 1792)
 - *troglodytes* (Jekel, 1861)
 - Curculio* Linnaeus, 1758
 - *betulae* (Stephens, 1831)
 - *elephas* (Gyllenhal, 1836)
 - *glandium* Marsham, 1802
 - *nucum* Linnaeus, 1758
 - *pellitus* (Boheman, 1843)
 - *venosus* (Gravenhorst, 1807)
 - *villosus* Fabricius, 1781
- Dereolomini**
- Dereolomus* Schoenherr, 1825
 - *chamaeropis* (Fabricius, 1798)
 - *subcostatus* Boheman, 1844
- Ellescini**
- Dorytomus* Germar, 1817
 - Dorytomus* (*Dorytomus*) Germar, 1817
 - *dejeani* Faust, 1883
 - *edoughensis* Desbrochers, 1875
 - *filirostris* (Gyllenhal, 1835)
 - *longimanus* (Forster, 1771)
 - *schoenherri* Faust, 1883
 - *taeniatus* (Fabricius, 1781)
 - *tortrix* (Linnaeus, 1761)
 - *tremulae* (Fabricius, 1787)
 - Dorytomus* (*Euolamus*) Reitter, 1916
 - *ictor* (Herbst, 1795)
- *nebulosus* (Gyllenhal, 1835)
 - Dorytomus* (*Olamus*) Reitter, 1916
 - *melanophthalmus* (Paykull, 1792)
 - *puberulus* (Boheman, 1843)
 - *rufatus* (Bedel, 1886)
 - Ellescus* Dejean, 1821
 - *scanicus* (Paykull, 1792)
- Mecinini**
- Cleopomiarus* Pierce, 1919
 - *distinctus* (Boheman, 1845)
 - *graminis* (Gyllenhal, 1813)
 - *hispidulus* (LeConte, 1876)
 - *meridionalis* (Brisout, H., 1862)
 - *micros* (Germar, 1821)
 - *plantarum* (Germar, 1824)
 - Gymnetron* Schoenherr, 1825
 - *aper* Desbrochers, 1893
 - *beccabungae* (Linnaeus, 1761)
 - *melinum* Reitter, 1872
 - *rostellum* (Herbst, 1795)
 - *veronicae* (Germar, 1821)
 - *villosum* Gyllenhal, 1838
 - Mecinus* Germar, 1821
 - *aestivus* (Hoffmann, 1956)
 - *alternans* Kirsch, 1870
 - *aubei* Desbrochers, 1893
 - *barbarus* Gyllenhal, 1838
 - *circulatus* (Marsham, 1802)
 - *collaris* Germar, 1821
 - *comosus* Boheman, 1845
 - *dorsalis* Aubé, 1850
 - *elongatus* (Brisout, H., 1862)
 - *humeralis* Tournier, 1873
 - *labilis* (Herbst, 1795)
 - *latiusculus* (Jacquelin du Val, 1855)
 - *lineicollis* Reitter, 1907
 - *longiusculus* Boheman, 1845
 - *marmota* (Fairmaire, 1883)
 - *pascuorum* (Gyllenhal, 1813)
 - *pyraster* (Herbst, 1795)
 - *setosus* Kiesenwetter, 1864
 - *sicardi* Hustache, 1920
 - *simus* (Mulsant & Rey, 1858)
 - *sublineellus* Fairmaire, 1880
 - *tychioides* (Brisout, H., 1862)
 - *variabilis* (Rosenhauer, 1856)
 - Miarus* Schoenherr, 1826
 - *campanulae* (Linnaeus, 1767)
 - *horni* Franz, 1947
 - *ursinus* Abeille, 1906
 - Rhinusa* Stephens, 1829
 - *algirica* (Brisout, H., 1862)
 - *amicta* (Germar, 1821)
 - *antirrhini* (Paykull, 1800)
 - *bipustulata* (Rossi, 1792)
 - *depressa* (Rottenberg, 1871)
 - *fuentei* (Pic, 1906)
 - *herbarum* (Brisout, H., 1862)
 - *heydeni* (Desbrochers, 1869)
 - *incana* (Kirsch, 1880)
 - *lanigera* (Brisout, H., 1862)
 - *linariae* (Paykull, 1792)
 - *melas* (Boheman, 1838)
 - *moroderi* (Reitter, 1906)
 - *neta* (Germar, 1821)
 - *subrotundula* (Reitter, 1907)
 - *tetra* (Fabricius, 1792)
 - *vestita* (Germar, 1821)

Rhamphini

- Isochnus* Thomson, C.G., 1859
● *foliorum* (Mueller, 1776)
● *sequensi* (Stierlin, 1893)
- Orchestes* Illiger, 1798
Orchestes (Orchestes) Illiger, 1798
(gr. *alni*)
● *alni* (Linnaeus, 1758)
● *rufus* (Schrank, 1781)
(gr. *avellanae*)
● *avellanae* (Donovan, 1797)
● *erythropus* (Germar, 1821)
● *erythropus tricolor* (Kiesenwetter, 1851)
● *hungaricus* (Hajoss, 1938)
● *irroratus* (Kiesenwetter, 1851)
● *pilosus* (Fabricius, 1781)
● *quercus* (Linnaeus, 1758)
● *sparsus* (Fähraeus, 1843)
○ *erythropus erythropus* (Germar, 1821)
(gr. *rusci*)
● *rusci* (Herbst, 1795)
(gr. *testaceus*)
● *testaceus* (Mueller, 1776)
- Orchestes (Salius)* Schrank, 1798
● *fagi* (Linnaeus, 1758)
- Pseudorchestes* Bedel, 1894
● *ermischi* (Dieckmann, 1958)
● *flavidus* (Brisout, 1865)
● *persimilis* (Reitter, 1911)
● *persimilis persimilis* (Reitter, 1911)
● *tomentosus* (Olivier, 1807)
○ *pratensis* (Germar, 1821)
- Rhamphus* Clairville, 1798
● *cerdanicus* Tempère, 1982
● *pulicarius* (Herbst, 1795)
● *subaeneus* (Illiger, 1807)
- Tachyerges* Schoenherr, 1825
● *salicis* (Linnaeus, 1758)
● *stigma* (Germar, 1821)

Smicronychini

- Sharpia* Tournier, 1874
● *rubida* (Rosenhauer, 1856)
- Smicronyx* Schoenherr, 1843
Smicronyx (Chalybodontus) Desbrochers, 1897
● *cyanus* (Gyllenhal, 1836)
● *opacus* (Brisout, Ch., 1860)
- Smicronyx (Smicronyx)* Schoenherr, 1843
● *albosquamatus* Wollaston, 1854
● *coecus* (Reich, 1797)
● *funebris* Tournier, 1874
● *jungermanniae* (Reich, 1797)
● *nebulosus* Tournier, 1874
● *pauperculus* Wollaston, 1864
● *rufipennis* Tournier, 1874
● *syriacus* Faust, 1887
○ *reichi* (Gyllenhal, 1836)

Storeini

- Aubeonymus* Jacquelin du Val, 1855
● *carinicollis* (Lucas, 1846)
● *danieli* González, 1968
● *franzi* González, 1968
● *mariaefranciscae* Roudier, 1981
● *meregallii* Caldara, 1995
● *pooti* Caldara, 1990
- Pachytychius* Jekel, 1861
● *asperatus* (Dufour, 1843)
● *deplanatus* (Desbrochers, 1873)
● *granulicollis* Tournier, 1874

- *haematocephalus* (Gyllenhal, 1835)
● *hordei* (Brullé, 1832)
● *hordei squamosus* (Gyllenhal, 1836)
● *lucasii* Jekel, 1861
● *lucasii baeticus* (Kirsch, 1870)
● *maculosus* Reitter, 1907
● *rotundicollis* Desbrochers, 1896
● *scrobiculatus* (Rosenhauer, 1856)
● *sellatus* (Lucas, 1846)
● *sparsatus* (Olivier, 1807)
● *strumarius* (Gyllenhal, 1836)
● *subasper* Fairmaire, 1870
● *trimacula* (Rosenhauer, 1856)

Styphlini

- Geranorhinus* Chevrolat, 1860
● *brannanii* Schaufuss, 1867
○ *pusillus* (Motschulsky, 1851)
- Orthochaetes* Germar, 1824
● *baeticus* Daniel, K., 1906
● *cerdanicus* Hustache, 1930
● *extensus* (Chevrolat, 1880)
● *franzi* González, 1967
● *hirticulus* Hoffmann, 1963
● *insignis* (Aubé, 1863)
● *nevadensis* González, 1967
● *pirenaeus* González, 1967
● *rectirostris* Hoffmann, 1959
● *setiger* (Beck, 1817)
- Styphlus* Schoenherr, 1826
● *penicillus* Schoenherr, 1826

Tychiini

- Lignyodes* Dejean, 1835
● *enucleator* (Panzer, 1798)
- Sibinia* Germar, 1817
Sibinia (Dichotychius) Bedel, 1885
● *albosquamosa* Pic, 1904
● *exigua* Faust, 1885
● *gallica* Pic, 1902
● *gallica gemmans* Desbrochers, 1908
● *meridionalis* Brisout, Ch., 1867
● *planiuscula* Desbrochers, 1873
● *planiuscula planiuscula* Desbrochers, 1873
● *sodalis* Germar, 1824
Sibinia (Sibinia) Germar, 1817
● *arenariae* Stephens, 1831
● *attalica* Gyllenhal, 1835
● *femoralis* Germar, 1824
● *iberica* Hoffmann, 1959
● *pellucens* (Scopoli, 1772)
● *pici* Tournier, 1895
● *primita* (Herbst, 1795)
● *pyrrhodactyla* (Marsham, 1802)
● *subelliptica* Desbrochers, 1873
● *tychiiformis* Pic, 1902
● *variata* Gyllenhal, 1836
● *viscariae* (Linnaeus, 1761)
- Sibinia* (Incertae sedis)
● *pozuelica* Fuente, 1910
● *rubripes* Desbrochers, 1907
● *seducta* Desbrochers, 1907
○ *phalerata* Gyllenhal, 1836
○ *amplithorax* Desbrochers, 1873
○ *modesta* Desbrochers, 1895
- Tychius* Germar, 1817
Tychius (Apeltarius) Desbrochers, 1873
● *grandicollis* (Waltl, 1835)
- Tychius (Tychius)* Germar, 1817
● *argentatus* Chevrolat, 1859

- *armatus* Tournier, 1873
 - *aureolus* Kiesenwetter, 1851
 - *aurichalceus* Gyllenhal, 1836
 - *bicolor* Brisout, Ch., 1862
 - *brevisculus* Desbrochers, 1873
 - *brisouti* Tournier, 1873
 - *capucinus* (Boheman, 1843)
 - *chevrolati* Tournier, 1873
 - *cinnamomeus* Kiesenwetter, 1851
 - *consputus* Kiesenwetter, 1864
 - *crassirostris* Kirsch, 1871
 - *cretaceus* Kiesenwetter, 1851
 - *cuprifer* (Panzer, 1799)
 - *cuprinus* Rosenhauer, 1856
 - *cylindricollis* Solari, 1950
 - *elegans* Desbrochers, 1896
 - *elegantulus* Brisout, Ch., 1863
 - *farinosus* Rosenhauer, 1856
 - *funicularis* Brisout, Ch., 1862
 - *fuscipes* Chevrolat, 1859
 - *grenieri* Brisout, Ch., 1861
 - *hispanus* Velázquez de Castro & Caldara, 1989
 - *junceus* (Reich, 1797)
 - *laticollis* Perris, 1864
 - *lineatulus* Stephens, 1831
 - *longicollis* Brisout, Ch., 1863
 - *lopezi* Hoffmann, 1957
 - *medicaginis* Brisout, Ch., 1863
 - *meliloti* Stephens, 1831
 - *nigricollis* (Chevrolat, 1859)
 - *oedemerus* Penecke, 1936
 - *parallelus* (Panzer, 1794)
 - *picrostrois* (Fabricius, 1787)
 - *polylineatus* (Germar, 1824)
 - *pumilus* Brisout, Ch., 1862
 - *pusillus* Germar, 1842
 - *quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758)
 - *rufipennis* Brisout, Ch., 1862
 - *rufipes* Tournier, 1873
 - *siculus* Boheman, 1843
 - *similaris* Tournier, 1873
 - *squamulatus* Gyllenhal, 1836
 - *stephensi* Schoenherr, 1836
 - *striatulus* Gyllenhal, 1836
 - *tessellatus* Tournier, 1873
 - *tibialis* Boheman, 1843
 - *olcesei* Tournier, 1873
 - *mixtus* Desbrochers, 1873
 - *linderi* (Fairmaire, 1852)
 - *muscorum* (Fairmaire, 1848)
 - *negrei* González, 1964
 - *negrei inopinatus* Meregalli, 1987
 - *negrei negrei* González, 1964
 - *osellai* Meregalli, 1983
 - *paulinoi* Stierlin, 1887
 - *paulinoi noctivagus* Meregalli, 1987
 - *paulinoi paulinoi* Stierlin, 1887
 - *pyrenaicus* Osella, 1970
 - *ribesi* González, 1964
 - *subiasi* Alonso-Zarazaga & Meregalli, 1983
 - *verrucosus* (Kiesenwetter, 1851)
 - *verrucosus valdinazzii* Meregalli, 1983
 - *verrucosus verrucosus* (Kiesenwetter, 1851)
- Gonipterini**
- Gonipterus* Schoenherr, 1833
 - *scutellatus* Gyllenhal, 1833
- Rhytirhinini**
- Balearicola* Semenov-Tian-Shanskij, 1910
 - *ignatii* (Schaufuss, 1882)
 - Entomoderus* Raffray, 1873
 - Entomoderus (Asperorhinus)* Melichar, 1923
 - *aspericollis* (Desbrochers, 1895)
 - *brevis* (Solari, 1952)
 - *clitellarius* (Boheman, 1842)
 - *fuentei* (Pic, 1920)
 - *incisus* (Desbrochers, 1910)
 - *lateimpressus* (Pic, 1920)
 - *melichari* (Schenkling, 1929)
 - *moroderi* (Desbrochers, 1910)
 - *nevadensis* (Desbrochers, 1910)
 - *nodifrons* (Boheman, 1834)
 - *parvus* (Rosenhauer, 1856)
 - *subfasciatus* (Rosenhauer, 1856)
 - *variegatus* (Lucas, 1846)
 - *dilatatus* (Fabricius, 1801)
 - *lobothorax* (Desbrochers, 1910)
 - Entomoderus (Horridorhinus)* Solari, 1940
 - *gataensis* (Hoffmann, 1956)
 - Entomoderus (Pseudorhinus)* Melichar, 1923
 - *ambiguus* (Solari, 1940)
 - *bonvouloirii* (Brisout, Ch., 1866)
 - *brucki* (Allard, 1870)
 - *caudatus* (Brisout, Ch., 1866)
 - *cobosi* (Roudier, 1954)
 - *compactus* (Desbrochers, 1911)
 - *humeralis* (Desbrochers, 1895)
 - *impressicollis* (Boheman, 1834)
 - *impressicollis pityusensis* (Compte, 1966)
 - *impressicollis portusveneris* (Roudier, 1959)
 - *interruptus* (Brisout, Ch., 1866)
 - *laesirostris* (Fairmaire, 1859)
 - *laesirostris bruckianus* (Desbrochers, 1910)
 - *laesirostris stenoderus* (Gemminger, 1871)
 - *longulus* (Rosenhauer, 1856)
 - *longulus longulus* (Rosenhauer, 1856)
 - *longulus plasoni* (Desbrochers, 1911)
 - *longulus subgracilipes* (Roudier, 1958)
 - *oberthueri* (Desbrochers, 1911)
 - *parallelipennis* (Solari, 1954)
 - *perplexus* (Desbrochers, 1911)
 - *ruteri* (Roudier, 1954)
 - *stableaui* (Fairmaire, 1862)
 - *stableaui punctirostris* (Hoffmann, 1938)
 - *variabilis* (Brisout, Ch., 1866)
 - *gracilipes* (Desbrochers, 1894)
 - *laesirostris laesirostris* (Fairmaire, 1859)

CYCLOMINAE

Dichotrachelini

- Dichotrachelus* Stierlin, 1853
- *alonsoi* Meregalli, 1987
- *baeticus* Meregalli, 1987
- *cantabricus* Franz, 1936
- *deferreri* Meregalli & Alonso-Zarazaga, 1988
- *dieckmanni* Meregalli, 1987
- *dieckmanni dieckmanni* Meregalli, 1987
- *dieckmanni pretiosus* Meregalli, 1987
- *espanoli* González, 1964
- *graellsii* Perris, 1864
- *graellsii dellabeffai* Meregalli, 1983
- *graellsii graellsii* Perris, 1864
- *graellsii quaeritus* Meregalli, 1987
- *janetscheki* Roudier, 1957
- *laurae* Meregalli, 1987
- *laurae hispaniorum* Meregalli, 1987
- *laurae laurae* Meregalli, 1987

- Gronops* Schoenherr, 1823
- *fasciatus* Kuester, 1851
 - *luctuosus* Chevrolat, 1861
 - *lunatus* (Fabricius, 1775)
 - *lunatus lunatus* (Fabricius, 1775)
 - *pretiosus* Tournier, 1872
- Listoderes* Schoenherr, 1826
- *costirostris* Schoenherr, 1826

ENTIMINAE

Alophini

- Graptus* Schoenherr, 1823
- *asturiensis* (Stierlin, 1888)
 - *triguttatus* (Fabricius, 1775)
 - *triguttatus triguttatus* (Fabricius, 1775)
- Rhytideres* Schoenherr, 1823
- *plicatus* (Olivier, 1790)
- Seidlitzia* Desbrochers, 1892
- *maroccana* (Fairmaire, 1868)

Brachyderini

- Brachyderes* Schoenherr, 1823
- Brachyderes (Brachyderes)* Schoenherr, 1823
- *confusus* Viedma, 1967
 - *grisescens* Fairmaire, 1862
 - *incanus* (Linnaeus, 1758)
 - *lineolatus* Fairmaire, 1862
 - *pubescens* Bohemann, 1833
 - *suturalis* Graells, 1851
- Brachyderes (Brachylophus)* Fischer de Waldheim, 1829
- *lusitanicus* (Fabricius, 1781)
- Brachyderes (Gastraspis)* Flach, 1907
- *marginellus* Graells, 1858
- Caulostrophilus* Desbrochers, 1905
- *ophthalmicus* (Fairmaire, 1869)
 - *equestris* Boheman, 1833
- Caulostrophus* Fairmaire, 1859
- *subsulcatus* (Boheman, 1833)
- Parafoucartia* Solari, 1948
- *squamulata* (Herbst, 1795)
- Strophomorphus* Seidlitz, 1870
- *porcellus* (Schoenherr, 1832)
- Strophosoma* Billberg, 1820
- Strophosoma (Conchostrophus)* Flach, 1907
- *pellitus* Kirsch, 1880
- Strophosoma (Morphostrophus)* Flach, 1907
- *edmundi* (Flach, 1907)
- Strophosoma (Neliocarthus)* Thomson, C.G., 1859
- *alonsoi* Pelletier, 1994
 - *blascoi* Pelletier, 1996
 - *burdigalense* (Escalera, 1928)
 - *cobosi* Pelletier, 1993
 - *cristatum* (Boheman, 1833)
 - *ebenista* (Seidlitz, 1870)
 - *faber* (Herbst, 1784)
 - *flavipes* (Chevrolat, 1869)
 - *formosum* (Seidlitz, 1870)
 - *gonzalezi* Pelletier, 1994
 - *laufferi* (Flach, 1907)
 - *luciae* Pelletier, 2001
 - *meregallii* Pelletier, 1993
 - *monachus* (Seidlitz, 1867)
 - *monegrense* Pelletier, 2000
 - *nebulosum* (Stephens, 1831)
 - *perfidum* (Flach, 1907)
 - *poricolle* (Fairmaire, 1868)
 - *pseudoebenista* (Escalera, 1926)
 - *puberulum* (Chevrolat, 1872)

- *sus* (Stephens, 1831)
 - *trapezicolle* (Flach, 1907)
 - *urbionense* (Escalera, 1928)
 - *schrammi* Pic, 1915
- Strophosoma (Strophosoma)* Billberg, 1820
- *alticola* (Seidlitz, 1867)
 - *capitatum* (DeGeer, 1775)
 - *constrictum* (Seidlitz, 1867)
 - *danieli* (Hoffmann, 1959)
 - *erinaceus* (Chevrolat, 1865)
 - *ganglbaueri* (Flach, 1907)
 - *globulicolle* (Escalera, 1926)
 - *globulus* (Seidlitz, 1870)
 - *longimanus* (Escalera, 1928)
 - *manzanalense* Pelletier, 1996
 - *melanogrammum* (Forster, 1771)
 - *melanogrammum melanogrammum* (Forster, 1771)
 - *palearium* (Pérez Arcas, 1872)
 - *pericarti* Pelletier, 1996
 - *picticolle* (Seidlitz, 1867)
 - *tubericolle* (Fairmaire, 1852)
 - *umbilicatum* (Flach, 1907)
- Strophosoma (Subcaulostrophus)* Flach, 1907
- *lentisci* (Hoffmann, 1925)
 - *sagitta* (Seidlitz, 1870)

Cneorhinini

- Attactagenus* Tournier, 1876
- *carinirostris* (Boheman, 1840)
 - *ceballosi* Viedma, 1965
 - *cordubensis* (Kirsch, 1870)
 - *diecki* (Tournier, 1874)
 - *dispar* (Graells, 1858)
 - *hypocyanus* (Boheman, 1833)
 - *m Moralesi* Viedma, 1965
 - *plumbeus* (Marsham, 1802)
 - *pyriformis* (Boheman, 1833)
 - *spinipes* (Pérez Arcas, 1872)
 - *tarsalis* (Tournier, 1874)
 - *zarateae* Viedma, 1965
- Cneorhinus* Schoenherr, 1823
- *argentifer* Marseul, 1866
 - *barcelonicus* (Herbst, 1797)
 - *serranoi* Alonso-Zarazaga, 1988
- Heydeneonymus* Desbrochers, 1875
- *amplicollis* (Boheman, 1840)
 - *cneorhinoides* (Desbrochers, 1909)
- Leptolepurus* Desbrochers, 1873
- *meridionalis* (Jacquelin du Val, 1854)
- Philopedon* Schoenherr, 1826
- *consentaneum* (Desbrochers, 1907)
 - *espagnoli* Viedma, 1965
 - *lasierrae* Viedma, 1965
 - *plagiatum* (Schaller, 1783)
 - *vicinum* (Desbrochers, 1876)
- Polydius* Dejean, 1821
- *bellieri* (Brisout, Ch., 1869)
 - *bellieri bellieri* (Brisout, Ch., 1869)
 - *bellieri mirei* (Hoffmann, 1965)
 - *heydeni* (Tournier, 1874)
 - *heydeni grandis* (Stierlin, 1887)
 - *heydeni heydeni* (Tournier, 1874)
 - *hispanus* (Herbst, 1797)
 - *hispanus hispanus* (Herbst, 1797)
 - *hispanus lepesmei* (Roudier, 1961)
 - *hispanus ludificator* (Gyllenhal, 1833)
 - *prodigus* (Fabricius, 1798)
 - *prodigus biungulatus* (Roudier, 1961)
 - *prodigus roudieri* (Viedma, 1965)

Geonemini

- Barynotus* Germar, 1817
● *cantabricus* González, 1972
● *ibericus* González, 1972
● *obscurus* (Fabricius, 1775)
● *sabulosus* (Olivier, 1807)
● *squamulosus* Germar, 1824
● *umbilicatus* Dufour, 1851
● *umbilicatus auronubilus* Fairmaire, 1856
● *unipunctatus* Dufour, 1851
Geonemus Schoenherr, 1834
● *caudulatus* Fairmaire, 1891
● *flabellipes* (Olivier, 1807)
● *palaui* Español, 1951

Holcorhinini

- Cyrtolepus* Desbrochers, 1875
Cyrtolepus (Aigelius) Desbrochers, 1898
● *moraguesi* (Desbrochers, 1892)
Nucterocephalus Desbrochers, 1897
● *desbrochersi* (Reitter, 1906)

Myorhinini

- Subhaptomerus* Hoffmann, 1959
● *frieseri* Hoffmann, 1959
● *frieseri avilai* Alonso-Zarazaga, 1983
● *frieseri frieseri* Hoffmann, 1959

Naupactini

- Asynonychus* Crotch, 1867
● *godmanni* Crotch, 1867

Omiini

- Chaerocephalus* Chevrolat, 1861
● *alternans* (Fairmaire, 1866)
Desbrochersella Reitter, 1906
● *baetica* (Schaufuss, 1861)
● *castiliana* (K. Daniel, 1900)
● *cinerascens* (Rosenhauer, 1856)
● *cobosi* González, 1970
● *franzi* González, 1970
● *mediterranea* González, 1970
● *reyesae* Alonso-Zarazaga, 1984
Omias Germar, 1817
○ *haematopus* Rosenhauer, 1856
Rhinomias Reitter, 1894
○ *forticornis* (Bohemian, 1843)

Otiorhynchini

- Otiorhynchus* Germar, 1822
Otiorhynchus (Arammichnus) Gozis, 1882
● *cribricollis* Gyllenhal, 1834
● *juvencus* Gyllenhal, 1834
● *juvencus miramarae* Schaufuss, 1882
● *valdemosae* Schaufuss, 1882
Otiorhynchus (Aranihus) Reitter, 1912
● *cobosi* Hoffmann, 1957
● *cobosorum* Alonso-Zarazaga, 1984
● *davidi* Alonso-Zarazaga, 1984
● *decorus* Stierlin, 1875
● *ligneus* (Olivier, 1807)
● *ligneus colasi* Roudier, 1954
● *longiusculus* Stierlin, 1888
● *nevadensis* Stierlin, 1892
● *parvicollis* Gyllenhal, 1834
● *paulinoi* Stierlin, 1886
● *sordidus* Stierlin, 1861
● *tenuicostis* Hustache, 1920
Otiorhynchus (Dorymerus) Seidlitz, 1890
● *sulcatus* (Fabricius, 1775)

- Otiorhynchus (Edelengus)* Reitter, 1912
● *intrusicollis* Rosenhauer, 1856
Otiorhynchus (Egydelenus) Reitter, 1912
● *edelenginus* Reitter, 1913
Otiorhynchus (Harpinorrhynchus) Reitter, 1912
● *dentipes* Graells, 1858
● *dentipes ancarenensis* Meregalli, 1987
● *dentipes areolatus* Stierlin, 1881
● *dentipes asturiensis* Chevrolat, 1869
● *dentipes dentipes* Graells, 1858
● *dentipes donostiae* Meregalli, 1987
● *dentipes pericarti* Meregalli, 1987
Otiorhynchus (Jelenantus) Reitter, 1912
● *affaber* Boheman, 1843
● *avariae* (Español, 1978)
● *planophthalmus* Heyden, 1870

- Otiorhynchus (Lixorrhynchus)* Reitter, 1914
● *gridellii* (Español, 1949)
● *gridellii bonretorni* (Español, 1952)
● *gridellii gridellii* (Español, 1949)
● *irenae* (Hoffmann, 1956)
● *montigena* Marseul, 1872
● *setiger* (Waltl, 1835)
● *sulcicollis* (Hoffmann, 1956)
● *torressalai* (Español, 1945)
● *torressalai espagnoli* (Vives, 1975)
● *torressalai torressalai* (Español, 1945)
● *zariqueyi* (Clermont, 1949)

- Otiorhynchus (Metopiorrhynchus)* Reitter, 1912
● *impressiventris* Fairmaire, 1859
● *procerus* Stierlin, 1875
● *procerus cazorlae* Roudier, 1958
● *procerus procerus* Stierlin, 1875
● *singularis* (Linnaeus, 1767)
● *veterator* Uyttenboogaart, 1932
Otiorhynchus (Misenatus) Reitter, 1912
● *lugens* (Germar, 1817)
Otiorhynchus (Nihus) Reitter, 1912
● *uncinatus* Germar, 1824
Otiorhynchus (Otiorhynchus) Germar, 1822
(gr. *clavipes*)
● *fuscipes* (Olivier, 1807)
● *lugdunensis* Boheman, 1843
(gr. *pajarensis*)
● *gertraudae* Zumpt, 1934
● *pajarensis* Reitter, 1913
● *pajarensis evanescens* Solari & Solari, 1922
● *pajarensis pajarensis* Reitter, 1913
● *sagax* Reitter, 1915
(gr. *pyrenaeus*)
● *europunctatus* Gyllenhal, 1834
● *meridionalis* Gyllenhal, 1834
● *pyrenaeus* Gyllenhal, 1834
● *roudieri* Gonzalez, 1963
(gr. *stricticollis*)
● *cancasanus* Reitter, 1913
● *caunicus* Stierlin, 1872
● *curlettii* Meregalli, 1991
● *jaenensis* Stierlin, 1873
● *jaenensis fernandezcortesi* Alonso-Zarazaga, 1987
● *jaenensis jaenensis* Stierlin, 1873
● *mirei* Hoffmann, 1964
● *mirei cornonensis* Meregalli, 1991
● *mirei mirei* Hoffmann, 1964
● *stricticollis* Fairmaire, 1859
● *stricticollis juniperi* Tempère, 1939
● *stricticollis moncayoanus* Roudier, 1954
● *trichophorus* Meregalli, 1991

- *truncatellus* Graells, 1858
- *voriseki* Meregalli, 1991
(*Incertae sedis*)
 - *mesnili* Hoffmann, 1936
- Otiorhynchus (Pendragon)* Gozis, 1885
 - *desertus* Rosenhauer, 1847
 - *ovatus* (Linnaeus, 1758)
- Otiorhynchus (Petalorrhynchus)* Reitter, 1912
 - *alonsoi* Meregalli, 1989
 - *getschmanni* Stierlin, 1880
 - *getschmanni getschmanni* Stierlin, 1880
 - *getschmanni mansillae* Meregalli, 1987
 - *validus* Stierlin, 1881
- Otiorhynchus (Phalantorrhynchus)* Reitter, 1912
(gr. *andarensis*)
 - *allomorphus* Meregalli, 1986
 - *altaepeniae* Meregalli, 1986
 - *analisis* Solari & Solari, 1922
 - *andarensis* Reitter, 1913
 - *daphnes* Meregalli, 1986
 - *demandae* Meregalli, 1986
 - *johannis* Stierlin, 1883
 - *nimius* Meregalli, 1986
 - *oliveri* Meregalli, 1992
 - *seriehispidus* Stierlin, 1872
 - *sylvestris* Chevrolat, 1866
 - *sylvestris sylvestris* Chevrolat, 1866
 - *sylvestris telenensis* Meregalli, 1986
 - *urbionensis* Meregalli, 1989
- (gr. *arcticus*)
 - *arcticus* (O. Fabricius, 1780)
 - *arcticus arcticus* (O. Fabricius, 1780)
 - *arcticus catalunus* Meregalli, 1992
 - *arcticus jugicola* Stierlin, 1861
 - *arcticus monticola* Germar, 1824
 - *hirticulus* Meregalli, 1992
- (gr. *ehlersi*)
 - *collectivus* Reitter, 1890
 - *ehlersi* Stierlin, 1883
- (gr. *morio*)
 - *malefidus* Gyllenhal, 1834
 - *morio* (Fabricius, 1781)
 - *morio estrellaiensis* Zumpt, 1934
 - *morio hispanicus* Stierlin, 1862
 - *morio morio* (Fabricius, 1781)
 - *morio navaricus* Gyllenhal, 1834
 - *morio nigripedes* Solari, 1940
 - *noui* Fairmaire, 1862
 - *sparsiridis* Reitter, 1890
- (gr. *sulcogemmatus*)
 - *reynosae* Ch. Brisout, 1866
 - *reynosae reynosae* Ch. Brisout, 1866
 - *reynosae subreynosae* Hoffmann, 1964
 - *sulcogemmatus* Boheman, 1843
 - *uyttenboogaartii* Zumpt, 1936
- Otiorhynchus (Postaremus)* Reitter, 1912
 - *nodosus* (Mueller, 1764)
- Otiorhynchus (Zadrehus)* Reitter, 1912
 - *atroapterus* (Degeer, 1775)
- Otiorhynchus (Zustalestus)* Reitter, 1912
 - *rugosostriatus* (Goeze, 1777)

Peritelini

- Borovecia* Pierotti & Bellò, 2001
 - *gadorensis* Pierotti & Bellò, 2001
- Gymnomorphus* Seidlitz, 1865
 - *mononychus* (Seidlitz, 1865)
- Heteromeira* Solari, 1955
 - *zariquieyi* Solari, 1955

- Leptosphaerotus* Seidlitz, 1865
 - *leptosphaeroides* (Seidlitz, 1863)
- Meirella* Pierotti & Bellò, 1997
 - *florentina* (Stierlin, 1884)
 - *suturella* (Fairmaire, 1859)
- Peritelus* Germar, 1824
 - *espanoli* Roudier, 1959
 - *globulicollis* Seidlitz, 1872
 - *hybridus* Seidlitz, 1872
 - *lopezi* Hoffmann, 1961
 - *senex* Boheman, 1834
 - *setabensis* Hustache, 1921
 - *sphaeroides* Germar, 1824
 - *susanae* Seidlitz, 1865
- Pseudomeira* Stierlin, 1882
 - *adusticornis* (Kiesenwetter, 1851)
 - *alonsoi* Pierotti & Bellò, 1994
 - *gougeletii* (Seidlitz, 1865)
 - *grenieri* (Seidlitz, 1865)
 - *inviridis* (Pic, 1908)
 - *kiesenwetterii* (Seidlitz, 1865)
 - *prolixa* (Kiesenwetter, 1851)
 - *quadraticollis* (Desbrochers, 1905)
 - *tenuicornis* (Schaufuss, 1882)
 - *necessaria* (Gyllenhal, 1834)
 - *parvula* (Seidlitz, 1865)
 - *rustica* (Boheman, 1843)
- Simo* Dejean, 1821
 - *cremieri* (Boheman, 1843)
 - *schoenherri* (Boheman, 1843)
 - *planidorsis* (Seidlitz, 1865)

Phyllobiini

- Phyllobius* Germar, 1824
 - Phyllobius (Dieletus)* Reitter, 1916
 - *argentatus* (Linnaeus, 1758)
 - Phyllobius (Nemoicus)* Dillwyn, 1829
 - *oblongus* (Linnaeus, 1758)
 - Phyllobius (Phyllobius)* Germar, 1824
 - *alpinus* Stierlin, 1859
 - *betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 - *betulinus betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 - *korbi* Schilsky, 1908
 - *pellitus* Boheman, 1843
 - *pyri* (Linnaeus, 1758)
 - *squamosus* Ch. Brisout, 1866
 - *tuberculifer* Chevrolat, 1865
 - *xanthocnemus* Kiesenwetter, 1851
 - Phyllobius (Pterygorrhynchus)* Pesarini, 1969
 - *maculicornis* Germar, 1824
 - Phyllobius (Subphyllobius)* Schilsky, 1911
 - *virideaeris* (Laicharting, 1781)
 - *virideaeris virideaeris* (Laicharting, 1781)
- Pseudomylocerus* Desbrochers, 1873
 - Pseudomylocerus (Pseudomylocerus)* Desbrochers, 1873
 - *sinuatus* (Fabricius, 1801)

Polydrusini

- Liophloeus* Germar, 1817
 - Liophloeus (Liophloeus)* Germar, 1817
 - *paulinoi* Desbrochers, 1875
 - *tessulatus* (Müller, 1776)
- Pachyrhinus* Schoenherr, 1823
 - *dentipes* (Seidlitz, 1867)
 - *glabratus* (Chevrolat, 1866)
 - *ibericus* (Stierlin, 1884)
 - *javeti* (Desbrochers, 1871)
 - *lopezi* (Hoffmann, 1956)
 - *mustela* (Herbst, 1797)
 - *squamulosus* (Kiesenwetter, 1851)

- Polydrusus* Germar, 1817
- *Polydrusus (Chaerodrys)* Jacquelin du Val, 1854
 - *setifrons* Jacquelin du Val, 1852
 - Polydrusus (Chlorodrosus)* Daniel & Daniel, 1898
 - *castilianus* Daniel & Daniel, 1898
 - *abeillei* Desbrochers, 1869
 - Polydrusus (Chomatocryptus)* Desbrochers, 1902
 - *xanthopus* Gyllenhal, 1834
 - Polydrusus (Eudipnus)* Thomson, C.G., 1859
 - *mollis* (Ström, 1768)
 - Polydrusus (Eurodrusus)* Korotyaev & Meleshko, 1997
 - *chrysomela* (Olivier, 1807)
 - *confluens* Stephens, 1831
 - *pulchellus* Stephens, 1831
 - *pulchellus baeticus* Roudier, 1963
 - *pulchellus lusitanicus* Roudier, 1963
 - *smaragdulus* (Fairmaire, 1859)
 - Polydrusus (Eustolus)* Thomson, C.G., 1859
 - *corruscus* Germar, 1824
 - *dilutus* Motschulsky, 1849
 - *flavipes* (DeGeer, 1775)
 - *impressifrons* Gyllenhal, 1834
 - *interstitialis* Perris, 1864
 - *pterygomalis* Boheman, 1840
 - Polydrusus (Leucodrusus)* Stierlin, 1884
 - *clermonti* Pic, 1919
 - *senex* Chevrolat, 1866
 - *tibialis* Gyllenhal, 1834
 - Polydrusus (Metallites)* Germar, 1824
 - *impar* Gozis, 1882
 - *lusitanicus* (Chevrolat, 1879)
 - *marginatus* Stephens, 1831
 - Polydrusus (Neoeustolus)* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
 - *alveolus* Desbrochers, 1870
 - *andalusicus* Solari, 1954
 - *bohemani* Kiesenwetter, 1851
 - *cervinus* (Linnaeus, 1758)
 - *dilutus* Motschulsky, 1849
 - *falsosus* Hoffmann, 1963
 - *fuscoroseus* Desbrochers, 1871
 - *korbi* Stierlin, 1890
 - *pilosulus* Chevrolat, 1865
 - *pilosus* (Gredler, 1866)
 - *prasinus* (Olivier, 1790)
 - *subglaber* Desbrochers, 1870
 - *armipes* Brullé, 1832
 - *leucaspis* Boheman, 1840
 - *luctuosus* Desbrochers, 1875
 - Polydrusus (Parisodrosus)* Voss, 1936
 - *baleanicus* Voss, 1936
 - Polydrusus (Polydrusus)* Germar, 1817
 - *tereticollis* (DeGeer, 1775)
 - Polydrusus (Rhinocoetus)* Desbrochers, 1902
 - *desbrochersi* (Stierlin, 1884)

Sciaphilini

- Barypeithes* Jacquelin du Val, 1854
- Barypeithes (Barypeithes)* Jacquelin du Val, 1854
- *hispanus* Formánek, 1908
 - *inflaticeps* (Reitter, 1915)
 - *paganettii* Solari, 1948
 - *sulcifrons* (Boheman, 1843)
 - *sulcifrons andalusicus* Seidlitz, 1868
 - *sulcifrons sulcifrons* (Boheman, 1843)
- Barypeithes (Exomias)* Bedel, 1883
- *indigens* (Boheman, 1834)
- Brachysomus* Schoenherr, 1823
- *hirtus* (Boheman, 1845)

- Chiloneus* Schoenherr, 1843
- *chevrolati* Tournier, 1874
 - *pennatus* (Faust, 1885)
- Chionostagon* Alonso-Zarazaga, 1988
- *albosquamulata* (Reitter, 1907)
- Eusomus* Germar, 1824
- Eusomus (Elevatosomus)* Zumpt, 1933
- *freyi* Zumpt, 1933
- Foucartia* Jacquelin du Val, 1854
- *elongata* Tournier, 1876
- Homapterus* Fairmaire, 1857
- *affinis* Chevrolat, 1865
 - *brevipennis* (Kirsch, 1880)
 - *nevadensis* Hoffmann, 1936
 - *punctulatus* (Ch. Brisout, 1866)
 - *subnudus* (Fairmaire, 1856)
- Pleurodirus* Chevrolat, 1878
- Pleurodirus (Pleurodirus)* Chevrolat, 1878
- *carinula* (Olivier, 1807)
 - *fairmairei* (Kiesenwetter, 1852)
- Pleurodirus (Pseudometallites)* D'Amore-Fracassi, 1907
- *murinus* (Gyllenhal, 1834)
 - *pubescens* (Allard, 1868)
- Sciaphilus* Schoenherr, 1823
- *asperatus* (Bonsdorff, 1785)
 - *costulatus* Kiesenwetter, 1851
 - *ebeninus* (Chevrolat, 1872)
- Sitonini**
- Sitona* Germar, 1817
- Sitona (Charagmus)* Schoenherr, 1826
- *cachectus* Gyllenhal, 1834
 - *gressorius* (Fabricius, 1792)
 - *griseus* (Fabricius, 1775)
 - *intermedius* Küster, 1847
 - *variegatus* Fähræus, 1840
- Sitona (Coelositona)* González, 1971
- *ribesi* González, 1971
- Sitona (Sitona)* Germar, 1817
- (gr. *Angustifrontes*)
 - *brucki* Allard, 1870
 - *cylindricollis* Fähræus, 1840
 - *discoideus* Gyllenhal, 1834
 - *hispidulus* (Fabricius, 1777)
 - *humeralis* Stephens, 1831
 - *bicolor* Fähræus, 1840
 - (gr. *Callosi*)
 - *callosus* Gyllenhal, 1834
 - *tenuis* Rosenhauer, 1847
 - (gr. *Ciliati*)
 - *cinnamomeus* Allard, 1863
 - *lepidus* Gyllenhal, 1834
 - *longulus* Gyllenhal, 1834
 - *puncticollis* Stephens, 1831
 - (gr. *Convexicolles*)
 - *hispanicus* Tournier, 1876
 - *regensteinensis* (Herbst, 1797)
 - *virgatus* Fähræus, 1840
 - *striatellus* Gyllenhal, 1834
 - (gr. *Eciliati*)
 - *inops* Schoenherr, 1832
 - *lineatus* (Linnaeus, 1758)
 - *mateui* Roudier, 1958
 - *suturalis* Stephens, 1831
 - (gr. *Laterali*)
 - *lividipes* Fähræus, 1840
 - *sulcifrons* (Thunberg, 1798)
 - *sulcifrons argutulus* Gyllenhal, 1834
 - *vereundus* (Rossi, 1790)

(gr. *Oculati*)

- *latipennis* Gyllenhal, 1834
- *latipennis latipennis* Gyllenhal, 1834
- *limosus* (Rossi, 1792)
- *ocellatus* Küster, 1849
- (gr. *Pubiferi*)
- *cambricus* Stephens, 1831
- *cinerascens* Fähraeus, 1840
- *puberulus* Reitter, 1903
- (gr. *Setosi*)
- *ambiguus* Gyllenhal, 1834
- *giraudi* Hoffmann, 1938
- *macularius* (Marsham, 1802)
- *waterhousei* Walton, 1846
- *lineellus* (Bonsdorff, 1785)
- (gr. *Subnudi*)
- *gemellatus* Gyllenhal, 1834
- *niger* Allard, 1864

Tanymecini

Tainophthalmina

- Aspidiotes* Schoenherr, 1847
- Aspidiotes (Aspidiotes)* Schoenherr, 1847
- *gonzalezi* Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1994
 - *westringii* Schönherr, 1847

Tanymecina

- Chlorophanus* Sahlberg, 1823
- *gibbosus* (Paykull, 1792)
 - *rugicollis* Gyllenhal, 1837
 - *viridis* (Linnaeus, 1758)

Cycloderes Sahlberg, 1823

- Cycloderes (Aramorius)* Desbrochers, 1908
- *affinis* Solari, 1953
 - *exiguus* (Faust, 1887)
 - *franzi* Hoffmann, 1959
 - *fuentei* (Desbrochers, 1903)
 - *guinardi* (Jacquelin du Val, 1852)
 - *pussillus* (Seidlitz, 1867)
- Cycloderes (Cycloderes)* Sahlberg, 1823
- *ahenus* (Desbrochers, 1847)
 - *araneiformis* (Chevrolat, 1866)
 - *argenteus* (Perris, 1866)
 - *auricollis* (Desbrochers, 1872)
 - *auricollis aurithorax* (Desbrochers, 1884)
 - *barrosi* (Desbrochers, 1904)
 - *candidulus* (Desbrochers, 1872)
 - *canescens* (Rossi, 1792)
 - *chalcogrammus* (Boheman, 1833)
 - *chalcogrammus albidus* Solari, 1953
 - *chalcogrammus chalcogrammus* (Boheman, 1833)
 - *championi* Solari, 1953
 - *dispar* (Desbrochers, 1895)
 - *distinctus* (Desbrochers, 1903)
 - *elongatus* (Pérez Arcas, 1872)
 - *emarginatus* (Desbrochers, 1873)
 - *espanoli* Roudier, 1954
 - *fritillum* (Panzer, 1794)
 - *fullo* (Erichson, 1841)
 - *glabratus* (Gyllenhal, 1833)
 - *granithorax* (Desbrochers, 1896)
 - *gredosensis* Hoffmann, 1959
 - *helophilus* (Chevrolat, 1866)
 - *hirtellus* (Desbrochers, 1871)
 - *inflaticollis* (Fairmaire, 1879)
 - *insidiosus* (Fairmaire, 1852)
 - *intermedius* (Desbrochers, 1884)
 - *lasius* (Boheman, 1833)
 - *latithorax* (Desbrochers, 1871)

- *laufferi* (Desbrochers, 1904)
- *longipilis* (Seidlitz, 1867)
- *lusitanicus* (Desbrochers, 1884)
- *mus* (Herbst, 1795)
- *planicollis* (Pérez Arcas, 1872)
- *preiosus* (Schaufuss, 1861)
- *pulchellus* Solari, 1953
- *serripes* (Desbrochers, 1871)
- *squamatus* (Desbrochers, 1884)
- *subahenus* (Desbrochers, 1892)
- *submetallicus* (Desbrochers, 1871)
- *substriatus* (Desbrochers, 1884)
- *subvittatus* (Desbrochers, 1892)
- *tessellatus* (Gyllenhal, 1833)
- *tomentosus* (Desbrochers, 1872)
- *tonus* (Chevrolat, 1866)
- *uhagonis* (Desbrochers, 1871)
- *umbrinus* (Gyllenhal, 1833)
- *vittatus* (Boheman, 1840)
- *vitticollis* (Desbrochers, 1896)

Tanymecus Germar, 1817

- Tanymecus (Geomecus)* Reitter, 1903
- *fausti* Desbrochers, 1884
 - *submaculatus* Chevrolat, 1860
- Tanymecus (Tanymecus)* Germar, 1817
- *albicans* Rosenhauer, 1856
 - *metallinus* Fairmaire & Coquerel, 1866
 - *nevadensis* Desbrochers, 1872
 - *palliatus* (Fabricius, 1787)
 - *vagabundus* Chevrolat, 1880

Trachyphloeini

- Caenopsis* Bach, 1854
- *brevisetis* Desbrochers, 1895
 - *fissirostris* (Walton, 1847)
 - *formaneki* Leonhard, 1912
 - *larraldei* Perris, 1857
 - *reichei* Tournier, 1874
 - *waltoni* (Boheman, 1843)
- Cathormiocerus* Schoenherr, 1843
- Cathormiocerus (Cathormiocerus)* Schoenherr, 1843
- *attaphilus* Brisout, Ch., 1880
 - *attaphilus fageli* Hoffmann, 1963
 - *baleanicus* Desbrochers, 1909
 - *bolivari* Uhagón, 1885
 - *carpetanus* Uhagón, 1885
 - *chevrolati* Seidlitz, 1868
 - *curvipes* (Wollaston, 1854)
 - *curviscapus* Seidlitz, 1868
 - *curviscapus curviscapus* Seidlitz, 1868
 - *curviscapus insularis* Escalera, 1918
 - *diecki* Seidlitz, 1873
 - *elongatulus* Uhagón, 1885
 - *estrellanus* Escalera, 1918
 - *gaditanus* Escalera, 1918
 - *granulatus* Seidlitz, 1868
 - *horrens* (Gyllenhal, 1834)
 - *horrens churchevillei* Desbrochers, 1900
 - *horrens horrens* (Gyllenhal, 1834)
 - *maritimus* Rye, 1874
 - *minutus* Pic, 1908
 - *myrmecophilus* (Seidlitz, 1868)
 - *nevadensis* Escalera, 1918
 - *perforatus* Hoffmann, 1954
 - *porculus* Uhagón, 1885
 - *socius* Boheman, 1843
 - *solarii* Cobos, 1952
 - *tenuiscapus* Fairmaire, 1884
 - *validiscapus* Rouget, 1857

Cathormiocerus (Mitomermus) Jacquelin du Val, 1854

- *brevirostris* Brisout, Ch., 1866
- *variegatus* Küster, 1849
- Cathormiocerus (Schaumius)* Brisout, Ch., 1866
 - *bacaresensis* Escalera, 1918
 - *barrosi* Pic, 1909
 - *biseriatus* Escalera, 1918
 - *canaliculatus* (Schaufuss, 1867)
 - *championi* Escalera, 1918
 - *championi championi* Escalera, 1918
 - *championi cobosi* Roudier, 1958
 - *crassiscapus* Escalera, 1918
 - *densestriatus* Reitter, 1901
 - *espanoli* Roudier, 1958
 - *excisor* (Stierlin, 1862)
 - *fuentei* Desbrochers, 1896
 - *gracilior* Fairmaire, 1870
 - *gracilis* Seidlitz, 1868
 - *hirticulus* Seidlitz, 1873
 - *hirticulus baraudi* Hoffmann, 1953
 - *hirticulus hirticulus* Seidlitz, 1873
 - *inflatipennis* Escalera, 1926
 - *inflatiscapus* Escalera, 1918
 - *irrasus* Seidlitz, 1868
 - *irrasus cantabricus* Escalera, 1918
 - *irrasus irrasus* Seidlitz, 1868
 - *irrasus janetscheki* Roudier, 1957
 - *lapidicola* Chevrolat, 1866
 - *lethierryi* (Chevrolat, 1866)
 - *lusitanicus* Stierlin, 1885
 - *martinezii* Escalera, 1918
 - *palmaensis* Hoffmann, 1957
 - *proximus* Uhagón, 1885
 - *pygmaeus* Seidlitz, 1868
 - *sagrensis* Escalera, 1918
 - *salinus* Escalera, 1918
 - *seguranus* Escalera, 1918
 - *seguranus cordubensis* Escalera, 1926
 - *seguranus pozuelensis* Escalera, 1918
 - *seguranus seguranus* Escalera, 1918
 - *sinuaticapus* Pic, 1915
 - *tenuepilosus* Cobos, 1955
 - *tenuicornis* Escalera, 1918
 - *terolensis* Escalera, 1918
 - *transmontanus* Escalera, 1918
 - *viedmai* Alonso-Zarazaga, 1983

Trachyphloeus Germar, 1817

- Trachyphloeus (Lacordairius)* Brisout, Ch., 1866
 - *algesiranus* Escalera, 1923
 - *seidlitzii* (Brisout, Ch., 1866)
 - *subsetulosus* Escalera, 1923
 - *muralis* Bedel, 1893
- Trachyphloeus (Pseudolacordairius)* Escalera, 1923
 - *orbipennis* Desbrochers, 1901
 - *pustulatus* Seidlitz, 1868
 - *solutus* Borovec, 1999
- Trachyphloeus (Trachyphloeus)* Germar, 1817
 - (gr. *alternans*)
 - *alternans* Gyllenhal, 1834
 - *brevicornis* Solari & Solari, 1905
 - *hispanicus* Borovec, 1989
 - (gr. *bifoveolatus*)
 - *algirinus* Seidlitz, 1868
 - *angustisetulus* Hansen, 1915
 - *bifoveolatus* (Beck, 1817)
 - *setiger* Seidlitz, 1868
 - (gr. *crassicornis*)
 - *crassicornis* Borovec, 1996

(gr. *globicollis*)

- *globicollis* Stierlin, 1896
- (gr. *tenuipes*)
- *elongatus* Borovec, 1992
- *tenuipes* Formánek, 1909
- (gr. *muricatus*)
- *muricatus* Stierlin, 1885
- (gr. *laticollis*)
- *laticollis* Boheman, 1843
- *tenuis* Borovec, 1999
- (gr. *nodipennis*)
- *nodipennis* Chevrolat, 1860
- (gr. *scabriculus*)
- *scabriculus* (Linnaeus, 1771)
- (gr. *spinimanus*)
- *spinimanus* Germar, 1824
- (gr. *spinosus*)
- *guadarramus* Seidlitz, 1868
- *reitteri* (Stierlin, 1884)
- *spinosus* (Goeze, 1777)

Tropiphorini

- Tropiphorus* Schoenherr, 1842
 - *cucullatus* Fauvel, 1888
 - *styriacus* (Bedel, 1883)

HYPERINAE

Hyperini

- Bubalocephalus* Capiomont, 1868
 - *espagnoli* González, 1965
 - *kiesenwetteri* Capiomont, 1868
 - *rotundicollis* Capiomont, 1868
 - *vivesi* González, 1965

Coniatus Germar, 1817

- Coniatus (Bagoides)* Capiomont, 1868
 - *suavis* Gyllenhal, 1834
 - Coniatus (Coniatus)* Germar, 1817
 - *deyrollei* Capiomont, 1868
 - *repandus* (Fabricius, 1792)
 - *tamarisci* (Fabricius, 1787)
 - *splendidulus* (Fabricius, 1781)

Donus Jekel, 1864

- Donus (Antidonous)* Bedel, 1886
 - *brevirostris* (Capiomont, 1868)
 - *dauci* (Olivier, 1807)
 - *lunatus* (Wollaston, 1854)
 - *zoilus* (Scopoli, 1763)

Donus (Donus) Jekel, 1864

- *austerus* (Boheman, 1834)
- *austerus lusitanicus* (Capiomont, 1868)
- *biglobosus* (Kirsch, 1880)
- *chevrolati* (Capiomont, 1868)
- *circumvagus* (Boheman, 1842)
- *corrosus* (Desbrochers, 1899)
- *crinitus* (Boheman, 1834)
- *delarouzei* (Capiomont, 1868)
- *deyrollei* (Capiomont, 1868)
- *elegans* (Boheman, 1840)
- *fallax* (Capiomont, 1868)
- *globosus* (Fairmaire, 1858)
- *hispanicus* (Capiomont, 1868)
- *ibericus* (Capiomont, 1868)
- *intermedius* (Boheman, 1842)
- *longicollis* (Petri, 1901)
- *montivagus* (Capiomont, 1868)
- *oblongus* (Boheman, 1840)
- *obtusus* (Rosenhauer, 1856)
- *obtusus caazoriae* Roudier, 1958

- *obtusus obtusus* (Rosenhauer, 1856)
 - *perplexus* (Capiomont, 1868)
 - *perrisi* (Capiomont, 1868)
 - *philanthus* (Olivier, 1807)
 - *proximus* (Capiomont, 1875)
 - *quadratocollis* (Petri, 1901)
 - *rudicollis* (Capiomont, 1868)
 - *sierranus* (Capiomont, 1868)
 - *solaris* Roudier, 1958
 - *tristis* (Capiomont, 1868)
 - *tumidus* (Capiomont, 1868)
- Hypera* Germar, 1817
- Hypera (Dapalinus)* Capiomont, 1868
 - *dapalis* (Boheman, 1834)
 - *maculipennis* (Fairmaire, 1859)
 - *meles* (Fabricius, 1792)
 - *striata* (Boheman, 1834)
 - Hypera (Eririnomorphus)* Capiomont, 1868
 - *adspersa* (Fabricius, 1792)
 - *arundinis* (Paykull, 1792)
 - *rumicis* (Linnaeus, 1758)
 - Hypera (Hypera)* Germar, 1817
 - *arator* (Linnaeus, 1758)
 - *constans* (Boheman, 1834)
 - *egregia* (Capiomont, 1868)
 - *fuscocinerea* (Marsham, 1802)
 - *incompta* (Boheman, 1834)
 - *jucunda* (Capiomont, 1868)
 - *lethierryi* (Capiomont, 1868)
 - *mellarhyncha* (Olivier, 1807)
 - *nigrostris* (Fabricius, 1775)
 - *ononidis* (Chevrolat, 1863)
 - *pandellei* (Capiomont, 1868)
 - *pandellei pandellei* (Capiomont, 1868)
 - *plantaginis* (De Geer, 1775)
 - *postica* (Gyllenhal, 1813)
 - *scolymi* (Capiomont, 1868)
 - *suspiciosa* (Herbst, 1795)
 - *venusta* (Fabricius, 1781)
 - *viciae* (Gyllenhal, 1813)
 - Hypera (Tigrinellus)* Capiomont, 1868
 - *pastinaceae* (Rossi, 1790)
- Limobius* Schoenherr, 1847
- *borealis* (Paykull, 1792)
 - *mixtus* (Boheman, 1834)
- Metadonus* Capiomont, 1868
- *gracilentus* (Capiomont, 1868)
 - *vuillefroyanus* (Capiomont, 1868)
- Pachyphera* Capiomont, 1868
- *kraatzii* (Capiomont, 1868)
- LIXINAE**
- Cleoniini**
- Asproparthenis* Gozis, 1886
- *crotchi* (Chevrolat, 1873)
 - *meridionalis* (Chevrolat, 1874)
 - *punctiventris* (Germar, 1824)
 - *carinata* (Zubkov, 1829)
- Bothynoderes* Schoenherr, 1823
- *affinis* (Schrank, 1781)
- Chromonotus* Motschulsky, 1860
- *pictus* (Pallas, 1771)
- Cleonis* Dejean, 1821
- *pigra* (Scopoli, 1763)
- Coniocleonus* Motschulsky, 1860
- *amori* (Marseul, 1868)
 - *cicatricosus* (Hoppe, 1795)
 - *crinipes* (Fähraeus, 1842)
- *excoriatus* (Gyllenhal, 1834)
 - *graelli* Chevrolat, 1873
 - *hollbergi* (Fähraeus, 1842)
 - *megalographus* (Fähraeus, 1842)
 - *nebulosus* (Linnaeus, 1758)
 - *nigrosuturatus* (Goeze, 1777)
 - *planidorsis* (Fairmaire, 1874)
 - *riffensis* (Fairmaire, 1884)
 - *sejunctus* (Faust, 1904)
 - *tabidus* (Olivier, 1790)
 - *variolosus* (Wollaston, 1864)
- Conorhynchus* Motschulsky, 1860
- Conorhynchus (Pycnodactylus)* Chevrolat, 1873
- *brevirostris* (Gyllenhal, 1834)
 - *conicirostris* (Olivier, 1807)
 - *martini* (Faust, 1904)
 - *mendicus* (Gyllenhal, 1834)
- Cyphocleonus* Motschulsky, 1860
- *dealbatus* (Gmelin, 1790)
 - *morbillosus* (Fabricius, 1792)
 - *trisulcatus* (Herbst, 1795)
- Ephimeronotus* Faust, 1904
- *miegii* (Fairmaire, 1855)
- Leucomigus* Motschulsky, 1860
- *tessellatus* (Fairmaire, 1849)
- Leucophyes* Marshall, 1946
- *martorellii* (Fairmaire, 1879)
 - *quadratithorax* (Desbrochers, 1884)
- Lixomorphus* Faust, 1904
- *algirus* (Linnaeus, 1758)
- Mecaspis* Schoenherr, 1823
- *alternans* (Herbst, 1795)
 - *bedeli* Faust, 1904
 - *emarginata* (Fabricius, 1787)
 - *nana* Gyllenhal, 1834
 - *striatella* (Fabricius, 1792)
- Pachycerus* Schoenherr, 1823
- *cordiger* (Germar, 1818)
- Pseudocleonus* Chevrolat, 1873
- *carinatus* (Gyllenhal, 1834)
 - *cinereus* (Schrank, 1781)
 - *grammicus* (Panzer, 1789)
- Resmecaspis* Hoffmann, 1958
- *pecoudi* (Hoffmann, 1958)
- Rhabdorrhynchus* Motschulsky, 1860
- *mixtus* (Fabricius, 1792)
 - *varius* (Herbst, 1795)
- Trachydemus* Chevrolat, 1873
- *rugosus* (Lucas, 1846)
- Xanthochelus* Chevrolat, 1873
- *cinctiventris* (Fähraeus, 1842)
 - *cinctiventris marmottani* (Brisout, Ch., 1866)

Lixini

- Broconius* Desbrochers, 1904
- *professus* (Faust, 1885)
- Gasteroclysis* Desbrochers, 1904
- *augurius* (Boheman, 1836)
- Lachnaeus* Schoenherr, 1826
- *crinitus* (Boheman, 1836)
- Larinus* Schoenherr, 1823
- Larinus (Cryphopus)* Petri, 1907
- *ferrugatus* Gyllenhal, 1835
 - *reichei* Capiomont, 1874
 - *suborbicularis* Capiomont, 1874
- Larinus (Larinomesius)* Reitter, 1924
- *flavescens* Germar, 1824
 - *meridionalis* Rosenhauer, 1856
 - *minutissimus* Desbrochers, 1891

- *obtusus* Gyllenhal, 1836
- *obtusus adjectus* Fuente, 1897
- *obtusus obtusus* Gyllenhal, 1836
- *scolymi* (Olivier, 1807)
- *rugulosus* Petri, 1907
- Larinus (Larinus)* Schoenherr, 1823
 - *brevis* (Herbst, 1795)
 - *buccinator* (Olivier, 1807)
 - *cynarae* (Fabricius, 1787)
 - *maurus* (Olivier, 1807)
 - *obesulus* Desbrochers, 1896
 - *siculus* Boheman, 1843
 - *ursus* (Fabricius, 1792)
 - *ursus albarius* Boheman, 1843
 - *ursus pseudovittatus* Hoffmann, 1954
 - *vulpes* (Olivier, 1807)
 - *onopordi* (Fabricius, 1787)
- Larinus (Phyllonomeus)* Gistel, 1856
 - *afer* Gyllenhal, 1836
 - *albocinctus* Chevrolat, 1866
 - *brenskei* Faust, 1890
 - *escorialensis* Brisout, Ch., 1866
 - *immitis* Gyllenhal, 1835
 - *jaceae* (Fabricius, 1775)
 - *lethierryi* Brisout, Ch., 1866
 - *longirostris* Gyllenhal, 1835
 - *nanus* Lucas, 1846
 - *planus* (Fabricius, 1792)
 - *rusticanus* Gyllenhal, 1835
 - *schoenherri* Capiomont, 1874
 - *sturnus* (Schaller, 1783)
 - *sulphurifer* Boheman, 1843
 - *turbanatus* Gyllenhal, 1835
- Lixus* Fabricius, 1801
 - Lixus (Callistolixus)* Reitter, 1916
 - *cylindrus* (Fabricius, 1781)
 - *furcatus* (Olivier, 1807)
 - *hypocrita* Chevrolat, 1865
 - Lixus (Compsolixus)* Reitter, 1916
 - *albomarginatus* Boheman, 1843
 - *anguinus* (Linnaeus, 1767)
 - *castellanus* Chevrolat, 1865
 - *cruciferae* Hoffmann, 1956
 - *junci* Boheman, 1836
 - *laufferi* Petri, 1904
 - *ochraceus* Boheman, 1843
 - *ascanii* (Linnaeus, 1767)
 - Lixus (Dilixellus)* Reitter, 1916
 - *angustatus* (Fabricius, 1775)
 - *cribricollis* Boheman, 1836
 - *punctiventris* Boheman, 1835
 - *rumicis* Hoffmann, 1956
 - *vilis* (Rossi, 1790)
 - Lixus (Epimeces)* Billberg, 1820
 - *cardui* Olivier, 1807
 - *filiformis* (Fabricius, 1781)
 - *flaveolus* Motschulsky, 1849
 - *scolopax* Boheman, 1836
 - *ulcerosus* Petri, 1904
 - Lixus (Eulixus)* Reitter, 1916
 - *brevipes* Brisout, Ch., 1866
 - *brevirostris* Boheman, 1836
 - *iridis* Olivier, 1807
 - *scabricollis* Boheman, 1843
 - *umbellatarum* (Fabricius, 1787)
 - Lixus (Lixoglyptus)* Reitter, 1916
 - *spartii* (Olivier, 1807)
 - Lixus (Ortholixus)* Reitter, 1916
 - *acicularis* Germar, 1824
- *curvirostris* Capiomont, 1875
- *mucronatus* Olivier, 1807
- *puncticollis* Brisout, Ch., 1866
- *rosenschoeldi* Boheman, 1843
- *trivittatus* Capiomont, 1873
- *elegantulus* Boheman, 1843

Rhinocyllini

- Bangasternus* Gozis, 1882
 - *diecki* (Capiomont, 1873)
 - *siculus* (Capiomont, 1873)
 - *villosus* (Capiomont, 1873)
 - *planifrons* (Brullé, 1832)
- Microlarinus* Hochhuth, 1847
 - *diecki* Faust, 1890
 - *lareynii* (Jacquelin du Val, 1852)
- Rhinocyllus* Germar, 1817
 - *conicus* (Froelich, 1792)
 - *oblongus* Capiomont, 1873

MESOPTILIINAE

Magdalidini

- Magdalitis* Germar, 1817
 - Magdalitis (Edo)* Germar, 1819
 - *ruficornis* (Linnaeus, 1758)
 - Magdalitis (Laemosaccidius)* Smreczynski, 1972
 - *exarata* Brisout, 1862
 - Magdalitis (Magdalitis)* Germar, 1817
 - *duplicata* Germar, 1819
 - *frontalis* (Gyllenhal, 1827)
 - *memnonia* (Gyllenhal, 1837)
 - *phlegmatica* (Herbst, 1797)
 - *rufa* (Germar, 1824)
 - *violacea* (Linnaeus, 1758)
 - Magdalitis (Odontomagdalitis)* Barrios, 1984
 - *armigera* (Geoffroy, 1785)
 - *carbonaria* (Linnaeus, 1758)
 - Magdalitis (Panopsis)* Daniel, K., 1903
 - *fuscicornis* Desbrochers, 1870
 - Magdalitis (Panus)* Schoenherr, 1823
 - *barbicornis* (Latreille, 1804)
 - Magdalitis (Porrothus)* Dejean, 1821
 - *cerasi* (Linnaeus, 1758)

MOLYTINAE

Anoplini

- Anoplus* Dejean, 1821
 - *plantaris* (Naezen, 1794)

Hylobiini

- Hylobius* Germar, 1817
 - Hylobius (Callirus)* Dejean, 1821
 - *abietis* (Linnaeus, 1758)
 - *pinastri* (Gyllenhal, 1813)
 - *transversovittatus* (Goeze, 1777)

Itini

- Ita* Tournier, 1878
 - *crassirostris* Tournier, 1878

Lepyrini

- Lepyrus* Germar, 1817
 - *capucinus* (Schaller, 1783)
 - *capucinus capucinus* (Schaller, 1783)

Moltytini

Leiosomatina

- Leiosoma* Stephens, 1829

- *deflexum* (Panzer, 1795)
- *muscorum* Brisout, Ch., 1863
- *oblongulum* Boheman, 1842
- *pyrenaeum* Brisout, Ch., 1867
- *reynosae* Brisout, Ch., 1866
- *robustum* Seidlitz, 1867

Molytina

- Anisorrhynchus* Schoenherr, 1842
- *aratus* Boheman, 1842
 - *barbarus* (Boheman, 1834)
 - *barbatus* (Rossi, 1792)
 - *ferus* (Erichson, 1841)
 - *hespericus* Desbrochers, 1875
 - *laufferi* (Desbrochers, 1909)
 - *monachus* (Germar, 1817)
 - *punctatosulcatus* Desbrochers, 1875
- Liparus* Olivier, 1807
- *coronatus* (Goeze, 1777)
 - *coronatus coronatus* (Goeze, 1777)
 - *glabrirostris* Kuester, 1849

Plinthina

- Iberoplinthus* Meregalli, 1986
- *casalei* Meregalli, 1988
 - *curvirostris* Meregalli, 1986
 - *imbricatus* (Dufour, 1851)
 - *kricheldorfii* (Reitter, 1910)
 - *perezii* (Brisout, Ch., 1866)
 - *vidanoi* Meregalli, 1990
- Minyops* Schoenherr, 1823
- *carinatus* (Linnaeus, 1767)
- Mitoplinthus* Reitter, 1897
- *caliginosus* (Fabricius, 1775)
 - *caliginosus caliginosus* (Fabricius, 1775)
 - *caliginosus meridionalis* Meregalli, 1986
- Neoplinthus* Bedel, 1884
- *tigratus* (Rossi, 1792)
 - *porcatus* (Panzer, 1798)
- Plinthus* Germar, 1817
- *findelii* Boheman, 1842

Typoderina

- Anchonidium* Bedel, 1884
- *unguiculare* (Aubé, 1850)
- Styphloderes* Wollaston, 1873
- *exsculptus* (Boheman, 1843)
 - *paulinoi* (Stierlin, 1886)

Pissodini

- Pissodes* Germar, 1817
- *castaneus* (DeGeer, 1775)
 - *piceae* (Illiger, 1807)
 - *pini* (Linnaeus, 1758)
 - *piniphilus* (Herbst, 1797)
 - *validirostris* (Sahlberg, C. R., 1834)

Orobitidinae

- Orobitis* Germar, 1817
- *cyanaea* (Linnaeus, 1758)

DRYOPHTHORIDAE

DRYOPHTHORINAE

Dryophthorini

- Dryophthorus* Germar, 1824
- *corticalis* (Paykull, 1792)

RHYNCHOPHORINAE

Litosomini

- Sitophilus* Schoenherr, 1838
- *granarius* (Linnaeus, 1758)
 - *oryzae* (Linnaeus, 1763)

Rhynchophorini

- Rhynchophorus* Herbst, 1797
- *ferrugineus* (Olivier, 1790)

Sphenophorini

- Sphenophorus* Schoenherr, 1838
- *abbreviatus* (Fabricius, 1787)
 - *meridionalis* (Gyllenhal, 1837)
 - *parumpunctatus* (Gyllenhal, 1837)
 - *piceus* (Pallas, 1776)
 - *striatopunctatus* (Goeze, 1777)

ERIRHINIDAE

ERIRHININAE

Erirhinini

- Notaris* Germar, 1817
- *acridula* (Linnaeus, 1758)
 - *acridula montana* Faust, 1882
 - *scirpi* (Fabricius, 1792)
- Procas* Stephens, 1831
- *armillatus* (Fabricius, 1801)
 - *minutus* Desbrochers, 1893
 - *rasus* Desbrochers, 1897
- Thryogenes* Bedel, 1884
- *festucae* (Herbst, 1795)

NANOPHYIDAE

NANOPHYINAE

Corimaliini

- Allomalia* Alonso Zarazaga, 1989
- *quadrivirgata* (Costa, 1863)
- Corimalia* Gozis, 1885
- *pallida* (Olivier, 1807)
 - *postica* (Gyllenhal, 1838)
 - *tamarisci* (Gyllenhal, 1838)
 - *tetragramma* (Aubé, 1863)
- Hypophyes* Reitter, 1916
- *minutissimus* (Tournier, 1867)
 - *pallidulus* (Gravenhorst, 1807)

Nanophyini

- Ctenomeropsis* Voss, 1939
- *nigra* (Waltl, 1835)
- Dieckmanniellus* Alonso Zarazaga, 1989
- *gracilis* (Redtenbacher, 1849)
 - *helveticus* (Tournier, 1867)
 - *nitidulus* (Gyllenhal, 1838)
- Microon* Alonso Zarazaga, 1989
- *sahlbergi* (Sahlberg, C. R., 1835)
- Nanodiscus* Kiesenwetter, 1864
- *transversus* (Aubé, 1850)
- Nanomimus* Alonso Zarazaga, 1989
- *hemisphaericus* (Olivier, 1807)
- Nanophyes* Schoenherr, 1838
- *brevis* Boheman, 1845
 - *brevis bleusei* Pic, 1899

- *brevis fallax* Rey, 1893
 - *globiformis* Kiesenwetter, 1864
 - *globulus* (Germar, 1821)
 - *marmoratus* (Goeze, 1777)
 - *poecilopterus* Brisout, H., 1869
 - *rubricus* Rosenhauer, 1856
- Pericartiellus* Alonso Zarazaga, 1989
- *durieui* (Lucas, 1846)
 - *flavidus* (Aubé, 1850)

NEMONYCHIDAE

CIMBERIDINAE

Cimberidini

- Cimberis* Gozis, 1881
- *attelaboides* (Fabricius, 1787)

Doydirhynchini

- Doydirhynchus* Dejean, 1821
- *austriacus* (Olivier, 1807)

PLATYPODIDAE

PLATYPODINAE

Platypodini

- Platypus* Herbst, 1793
- *cylindrus* (Fabricius, 1792)
 - *oxyurus* Dufour, 1843

RAYMONDIONYMIDAE

RAYMONDIONYMINAE

Alaocephala

- Ganglbauer*, 1906
- *delarouzei* (Brisout, Ch., 1861)
 - *delarouzei catalonica* Osella, 1977

Coiffaitiella

- Osella*, 1971
- *benjamini* (Marquet, 1875)
 - *benjamini aurouxi* (González, 1965)
 - *benjamini benjamini* (Marquet, 1875)
 - *carinirostris* (Osella, 1971)
 - *hispanica* (Osella, 1971)
 - *lusitanica* (Osella, 1971)
 - *remilleti* (Osella, 1971)

Raymondionymus

- Wollaston*, 1873
- *perrisi* (Grenier, 1864)

RHYNCHITIDAE

RHYNCHITINAE

Auletini

Auletina

- Auletes* Schoenherr, 1826
- *tubicen* Schoenherr, 1826
 - *wagenblasti* Uyttenboogaart, 1935
- Auletobius* Desbrochers, 1869
- Auletobius (Auletobius)* Desbrochers, 1869
- *maroccanus* Hoffmann, 1953

- *Auletobius (Eomesauletes)* Legalov, 2001
- *politus* (Lepeletier & Serville, 1825)
- *Auletobius (Mesauletoebius)* Legalov, 2001
- *pubescens* (Kiesenwetter, 1851)

Byctiscini

- Byctiscus* Thomson, C. G., 1859
- Byctiscus (Byctiscus)* Thomson, C.G., 1859
- *betulae* (Linnaeus, 1758)
 - *populi* (Linnaeus, 1758)

Deporaini

- #### Deporaina
- Deporaus* Samouelle, 1819
- Deporaus (Caenorhinus)* Thomson, C.G., 1859
- *mannerheimii* (Hummel, 1823)
- Deporaus (Deporaus)* Samouelle, 1819
- *betulae* (Linnaeus, 1758)

Rhynchitini

- #### Rhynchitina
- Haplorrhynchites* Voss, 1924
- Haplorrhynchites (Haplorrhynchites)* Voss, 1924
- *pubescens* (Fabricius, 1775)
- Haplorrhynchites (Teretriorhynchites)* Voss, 1938
- *coeruleus* (DeGeer, 1775)
- Involvulus* Schrank, 1798
- Involvulus (Involvulus)* Schrank, 1798
- *cupreus* (Linnaeus, 1758)
- Lasiorhynchites* Jekel, 1860
- Lasiorhynchites (Coccygorrhynchites)* Prell, 1926
- *sericeus* (Herbst, 1797)
- Lasiorhynchites (Lasiorhynchites)* Jekel, 1860
- *olivaceus* (Gyllenhal, 1833)
 - *vaucheri* (Desbrochers, 1896)
- Lasiorhynchites (Stenorhynchites)* Voss, 1932
- *coeruleocephalus* (Schaller, 1783)
- Neocoenorrhinus* Voss, 1951
- *aeneovirens* (Marsham, 1802)
 - *germanicus* (Herbst, 1797)
 - *interpunctatus* (Stephens, 1831)
- Rhynchites* Schneider, 1791
- Rhynchites (Epirhynchites)* Voss, 1969
- *auratus* (Scopoli, 1763)
- Rhynchites (Rhynchites)* Schneider, 1791
- *bacchus* (Linnaeus, 1758)
- Tatianaerhynchites* Legalov, 2002
- *aequatus* (Linnaeus, 1767)
- Temnocerus* Thunberg, 1815
- *nanus* (Paykull, 1792)
 - *tomentosus* (Gyllenhal, 1839)

SCOLYTIDAE

HYLESININAE

Hylastini

- Hylastes* Erichson, 1836
- *angustatus* (Herbst, 1793)
 - *ater* (Paykull, 1800)
 - *attenuatus* Erichson, 1836
 - *linearis* Erichson, 1836
- Hylurgops* LeConte, 1876
- *glabratus* (Zetterstedt, 1828)
 - *palliatus* (Gyllenhal, 1813)

Hylesinini

- Hylastinus* Bedel, 1888
- *obscurus* (Marsham, 1802)

Hylesinus Fabricius, 1801

- *crenatus* (Fabricius, 1787)
- *orni* Fuchs, 1906
- *toranio* (Danthione, 1788)
- *varius* (Fabricius, 1775)
- *wachtli* Reitter, 1887

Kissophagus Chapuis, 1869

- *hederae* (Schmidt, 1843)
- P*teleobius* Bedel, 1888
 - *kraatzi* (Eichhoff, 1864)
 - *vittatus* (Fabricius, 1792)

Hypoborini

Hypoborus Erichson, 1836

- *ficus* Erichson, 1836

Liparthrum Wollaston, 1854

- *colchicum* Semenov-Tian-Shanskij, 1903
- *genistae* (Aubé, 1862)
- *mandibulare* Wollaston, 1854
- *mori* (Aubé, 1862)

Phloeosinini

Phloeosinus Chapuis, 1869

- *bicolor* (Brullé, 1832)
- *cedri* Brisout, 1883
- *cedri cedri* Brisout, 1883
- *thujae* (Perris, 1855)

Phloeotribini

Phloeotribus Latreille, 1796

- *cristatus* (Fauvel, 1889)
- *hercegovinensis* (Seitner, 1920)
- *perfoliatus* (Wollaston, 1854)
- *peyerimhoffi* (Eggers, 1913)
- *pubifrons* (Guillebeau, 1893)
- *rhododactylus* (Marsham, 1802)
- *scarabaeoides* (Bernard, 1788)
- *spinulosus* (Rey, 1885)

Polygraphini

Carphoborus Eichhoff, 1864

- *minimus* (Fabricius, 1801)
- *perrisi* (Chapuis, 1869)
- *pini* Eichhoff, 1881

Tomicini

Chaetoptelius Fuchs, 1913

- *vestitus* (Mulsant y Rey, 1860)

Dendroctonus Erichson, 1836

- *micans* (Kugelann, 1794)

Hylurgus Latreille, 1807

- *ligniperda* (Fabricius, 1787)
- *micklitzi* Wachtl, 1881

Tomicus Latreille, 1802

- *destruens* (Wollaston, 1865)
- *minor* (Hartig, 1834)
- *piniperda* (Linnaeus, 1758)

SCOLYTINAE

Corthylini

Pityophthorus Eichhoff, 1864

- *buyssoni* Reitter, 1901
- *buyssoni buyssoni* Reitter, 1901
- *glabratus* Eichhoff, 1878
- *lichtensteinii* (Ratzeburg, 1837)
- *micrographus* (Linnaeus, 1758)
- *pinsapo* Pfeffer, 1982
- *pityographus* (Ratzeburg, 1837)
- *pubescens* (Marsham, 1802)

Cryphalini

Cryphalus Erichson, 1836

- *asperatus* (Gyllenhal, 1813)
- *numidicus* Eichhoff, 1878
- *piceae* (Ratzeburg, 1837)
- *abietis* (Ratzeburg, 1837)
- *saltuarius* Weise, 1891

Ernoporicus Berger, 1917

- *caucasicus* (Lindemann, 1875)
- *fagi* (Fabricius, 1798)

Ernoporus C. G. Thomson, 1859

- *tiliae* (Panzer, 1793)

Hypothenemus Westwood, 1836

- *eruditus* Westwood, 1836

Trypophloeus Fairmaire, 1868

- *asperatus* (Gyllenhal, 1813)
- *asperatus spiculatus* Eggers, 1927
- *binodulus* (Ratzeburg, 1837)
- *granulatus* (Ratzeburg, 1837)
- *rybinskii* Reitter, 1894

Crypturgini

Cisurgus Reitter, 1894

- *ragusae* Reitter, 1906

Crypturgus Erichson, 1836

- *cinereus* (Herbst, 1793)
- *mediterraneus* Eichhoff, 1869
- *numidicus* Ferrari, 1867
- *pusillus* (Gyllenhal, 1813)
- *dubius* Eichhoff, 1871

Dryocoetini

Coccotypes Eichhoff, 1878

- *dactyliperda* (Fabricius, 1801)
- *carpophagus* (Hornung, 1842)

Dactylotrypes Eggers, 1927

- *longicollis* (Wollaston, 1864)

Dryocoetes Eichhoff, 1864

- *autographus* (Ratzeburg, 1837)
- *villosus* (Fabricius, 1792)

Lymantr Lovendal, 1889

- *coryli* (Perris, 1855)

Xylocleptes Ferrari, 1867

- *bispinus* (Duftschmidt, 1825)
- *biuncus* Reitter, 1894

Ipini

Ips DeGeer, 1775

- *acuminatus* (Gyllenhal, 1827)
- *mannsfeldi* (Wachtl, 1879)
- *sexdentatus* (Boerner, 1767)
- *typographus* (Linnaeus, 1758)

Orthotomicus Ferrari, 1867

- *erosus* (Wollaston, 1857)
- *laricis* (Fabricius, 1792)
- *longicollis* (Gyllenhal, 1827)
- *proximus* (Eichhoff, 1868)
- *suturalis* (Gyllenhal, 1827)

Pityogenes Bedel, 1888

- *bidentatus* (Herbst, 1784)
- *bistridentatus* (Eichhoff, 1878)
- *calcaratus* (Eichhoff, 1878)
- *quadridens* (Hartig, 1834)
- *trepanatus* (Nordlinger, 1848)
- *chalcographus* (Linnaeus, 1761)
- *conjunctus* (Reitter, 1887)

Pityokteines Fuchs, 1911

- *curvidens* (Germar, 1824)
- *spinidens* (Reitter, 1894)
- *vorontzowi* (Jacobson, 1895)

Scolytini

Scolytus Geoffroy, 1762

- *amygdali* Guérin-Méneville, 1847
- *carpini* (Ratzeburg, 1837)
- *intricatus* (Ratzeburg, 1837)
- *kirschii* Skalitzky, 1876
- *kirschii fasciatus* Reitter, 1890
- *mali* (Bechstein, 1805)
- *multistriatus* (Marsham, 1802)
- *pygmaeus* (Fabricius, 1787)
- *ratzeburgi* Janson, 1856
- *rugulosus* (Mueller, 1818)
- *scolytus* (Fabricius, 1775)
- *laevis* Chapuis, 1869

Taphrorychini

Taphrorychus Eichhoff, 1878

- *villifrons* (Dufour, 1843)
- *bicolor* (Herbst, 1793)

Thamnurgini

Pseudothamnurgus Eggers, 1912

- *scrutator* (Pandellé, 1883)

Thamnurgus Eichhoff, 1864

- *characiae* Rosenhauer, 1878
- *delphinii* (Rosenhauer, 1856)
- *euphorbiae* (Kuester, 1845)
- *kaltenbachi* (Bach, 1850)

Triotemnus Wollaston, 1864

- *subretusus* Wollaston, 1864

Xyleborini


Xyleborinus Reitter, 1913

- *attenuatus* (Blandford, 1894)
 - *saxesenii* (Ratzeburg, 1837)
- Xyleborus* Eichhoff, 1864
- *dispar* (Fabricius, 1792)
 - *dryographus* (Ratzeburg, 1837)
 - *eurygraphus* (Ratzeburg, 1837)
 - *monographus* (Fabricius, 1792)
 - *pfeilii* (Ratzeburg, 1837)
 - *cryptographus* (Ratzeburg, 1837)

Xyloterini

Trypodendron Stephens, 1830

- *domesticum* (Linnaeus, 1758)
- *lineatum* (Olivier, 1795)
- *signatum* (Fabricius, 1792)



MONOGRAFIAS S.E.A.

Sociedad Entomológica Aragonesa

Claves de identificación de los géneros de Curculionoidea (Coleóptera) de la Península Ibérica, Islas Baleares, Macaronesia y áreas adyacentes

Dr. Miguel Angel Alonso Zarazaga

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
Museo Nacional de Ciencias Naturales- CSIC
Madrid (España)

El objetivo de esta monografía es dotar a la comunidad interesada en la fauna curculionológica del área ibero-balear y macaronésica de una herramienta de trabajo accesible y útil para ordenar las colecciones, buscar bibliografía y aumentar el conocimiento sobre la mayor familia de coleópteros de la región

Las “áreas adyacentes” a que se refiere el título del volumen son Marruecos y a los cinco departamentos del Pirineo francés. La monografía incluye la descripción de nuevos táxones de nivel tribal, genérico y subgenérico. Claves (sólo) en español e inglés. Se pretende que la mayoría de las entradas de la clave lleven asociada una figura explicativa, así como que todos los táxones genéricos estén representados por un hábitus en dibujo o fotografía.

Bloques temáticos:

- Introducción
- Contenidos
- Área geográfica cubierta
- Problemas de identificación y solución de errores
- Preparación y recolección
- Notas morfológicas
- Clasificación
- Claves (bilingüe) profusamente anotadas
- Referencias

Cheklists:

- I. Táxones de nivel familia y género
Especies y subespecies:
- II. Iberia (incluidas las islas Baleares)
- III. Azores
- IV. Canarias
- V. Madera
- VI. Salvajes
- VII. Marruecos
- VIII. Francia pirenaica

Fecha prevista de publicación: Primer trimestre 2003.

El número asignado a la monografía es vol. 10.

El volumen será gratuito para socios SEA en situación de alta en el ejercicio 2003.

Para asociarse a la SEA: ver página 238 de esta revista o visitar la página web:

<http://entomologia.rediris.es/sea>

Después de su distribución a socios SEA, el volumen saldrá a la venta para no socios, en condiciones que serán indicadas en su momento.