

NUEVAS LOCALIZACIONES DE *HAEMEROSIA RENALIS* (HÜBNER, [1813]) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, STIRIINAE)

F. Javier Pérez-López

Apartado de Correos nº 104. E-18080 Granada

Resumen: Se presentan nuevos registros de *Haemerosia renalis* (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae)

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, *Haemerosia renalis*, Granada, España.

New records of *Haemerosia renalis* (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae)

Abstract: New records of *Haemerosia renalis* (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae) are presented.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, *Haemerosia renalis*, Granada, Spain.

El género *Haemerosia* Boisduval, 1840 comprende dos taxones: *renalis* (Hübner, [1813]) y *vassilini* Bang-Haas, 1912, ésta última propia del Cáucaso (POOLE, 1989). La especie *Haemerosia renalis* es un noctuido de distribución asiático-supramediterránea, que se extiende por la Península Ibérica, Francia meridional, Sicilia, Turquía, Península Balcánica, Crimea, Turkmenistán (HACKER, 1990). En España, esta especie se ha registrado en contadas ocasiones y con escasos ejemplares. Así, a finales del siglo XIX, ZAPATER & KORB (1892) la citan de Alcalá de la Selva en Teruel; y, más recientemente PASCUAL (1990) la da a conocer de dos localidades granadinas: río Cacán, a 650 metros de altitud, un ejemplar macho, el 27-VI-1988; y Sierra de Baza: un ejemplar capturado el 18-VII-1981 depositado en la colección Traugott-Olsen.

En los últimos años, hemos tenido la oportunidad de capturar en la trampa de luz esta especie en dos nuevas localidades de la provincia de Granada. El material estudiado ha sido el siguiente: Fuente Camacho (Loja), 800 m., UTM 30S UG8905, 1%, 30-VII-1997; Tajos de Castro (Padul), 1.100 m., UTM 30S VF3694, 1%, 18-VII-2001; 1&, 26-VII-2001.

La localidad de Fuente Camacho corresponde a un barranco estrecho de sustrato calizo en cuyas laderas encontramos un encinar degradado de la serie termomediterránea bética basófila (*Smilax mauritanicae* - *Quercetum rotundifoliae sigmetum*), donde encontramos un matorral degradado con predominio de lentiscos, palmitos, aladiernos, coscojas entre los arbustivos y lavandas, jaras y tomillos entre los de menor porte.

La localidad de Tajos de Castro está algo más elevada y es más fría, encontrando un matorral serial producto de la degradación del bosque primitivo que correspondería a un encinar de la serie mesomediterránea bética basófila (*Paeonia coriacea* - *Quercetum rotundifoliae sigmetum*) y predominando formaciones de espatales en suelos menos erosionados y tomillares nitrófilos de origen antropozógeno a partir de roturaciones de terrenos o aprovechamientos ganaderos mal planificados.

En cuanto a su biología, las orugas descritas por Hampson en 1909 (POOLE, 1989), se alimentan de las flores de compuestas tales como diversas especies de *Lactuca* y *Chondrilla juncea* L., durante el verano y principios de otoño, tal y como indican CULOT (1914-1917) y SPULER (1910). Y por último, su época de vuelo se centra a finales del mes de junio y mayormente durante julio; así podría calificarse de univoltinal estival con invernación en la fase de pupa.

Bibliografía: CULOT, J. 1914-1917. *Noctuelles et Géometres d'Europe*, 2. Noctuelles: 243 pp., 42 pl. (reimpresión 1986). Apollo Books. Svendborg. • HACKER, H. 1990. Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). *Neue Ent. Nachr.*, 27: 1-706. • PASCUAL, J. 1990. Segunda cita para la Península Ibérica de *Haemerosia renalis* (Hübner, [1813]). *SHILAP Revta. lepid.*, 18(70): 192. • POOLE, R.W. 1989. Noctuidae. En: HEPPNER, J.B.: *Lepidopterorum Catalogus (new series)*, 118 (Part. 1): 500 pp. E.J. Brill/Flora & Fauna Publications. Leiden, New York, København, Köln. • SPULER, A. 1910. *Die Raupen der Schmetterlinge Europas*: 60 pl. (reimpresión 1989). Apollo Books. Svendborg. • ZAPATER, B. & M. KORB 1892. Catálogo de los Lepidópteros de la provincia de Teruel, y especialmente de Albarracín y su Sierra (2ª parte). *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 21: 103-159.

