

Nueva localización de *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]) para el sur de la Península Ibérica (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae)

Francisco J. Pérez-López¹, J. Antonio Jurado Rivera² y Ursula Osuna Aguilera³

¹ Apartado de Correos nº 104, E-18080 Granada.

² C/ Tercia, 8 – 2º C, E-14800 Priego de Córdoba.

³ C/ Ribera, 22 – 2º D, E-14800 Priego de Córdoba.

Resumen: Se presenta un nuevo registro de *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]) (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae).

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, *Hecatera cappa*, Córdoba, España.

New record of *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]) from the south of the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae)

Abstract: New record of *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]) is presented.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, *Hecatera cappa*, Córdoba, Spain.

Hecatera cappa (Hübner, [1809]) es un noctuido muy localizado y raro con una distribución amplia (ponto-mediterránea) por el centro y sureste de Europa, también presente en el norte de África (Marruecos y Argelia) (Hacker, Ronkay y Hreblay, 2002). En España, concretamente se ha registrado en su cuadrante nororiental con contadas citas: BURGOS: La Vid (Calle, 1983). CASTELLÓN: Alcudia de Veo, 600m, 22-VI-1977, 1% (Calle, 1983). CUENCA: Uclés y Vellisca (Calle, 1983). GUADALAJARA: Trillo, 6-VII-1975, 1% (Yela, 1981). HUESCA: Valle de Ordesa (Kitschelt, 1932). Estaña (Pérez de Gregorio, 1979). LÉRIDA: Cervera (Segarra), 27-VI-1915, P.Vila leg. (Codina, 1918). Barbéns (Pla d'Urgell), VI-1923, 1%, J. Grustán leg., Museo de Zoología de Barcelona coll. (Pérez de Gregorio, 1979). TERUEL: Muniesa, 600 m, 4-VIII-1980, 1% (Derra y Hacker, 1981). Albarracín, entre julio y agosto (Koschwitz, Kraus y Blum, 1985). ZARAGOZA: Alfocea, 221 m (Redondo, 1986). Retuerta de Pina (Pina de Ebro), 350 m, UTM 30TYL29, 2 ejemplares, 22-V-1998 y 31-V-1999 (Redondo, Blasco-Zumeta y King, 2001). 8 km. S. de Biel (Fuencaledras), 300 m, 31-VII-1987, 1%, Goater leg. et coll. (Hacker, Ronkay y Hreblay, 2002).

Se trata de una especie típica de estepa, habitando usualmente las tierras bajas y planicies, pero aparece también en localidades xerotérmicas en áreas montañosas. Es un taxon bivoltino que vuela de abril a agosto y cuyas larvas se alimenta de *Delphinium* y *Scrophularia* (Hacker, Ronkay y Hreblay, 2002). Berio (1985) apunta que tiene hábitos migratorios.

Durante un muestreo preliminar que hemos efectuado en el conjunto de las sierras subbéticas en la provincia de Córdoba, hemos tenido la oportunidad de identificar un ejemplar de esta especie que acudió a la trampa de luz. Concretamente el material estudiado ha sido el siguiente: Majamegina, Sierra de la Horconera (Priego de Córdoba), 879 m, UTM 30S UG8537, 1%, 2-VI-2003.

La localidad de Majamegina puede describirse como un bosque mixto de encina y quejigo correspondiente a la serie mesomediterránea bética basófila de la encina (*Paeonio-coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum*) en una faciación mesófila con

quejigo; cuyo estrato arbustivo es muy diversificado predominando cornicabra, majuelo, torvizco, aladierno, retama, etc.

Agradecimientos: Expresar nuestro más sincero agradecimiento a Eduard Guzmán por la inestimable ayuda en la localización de las citas para Cataluña.

Bibliografía: BERIO, E. 1985. Noctuidae, I. Generalità. Hadeninae. Cuculliinae. En: *Fauna d'Italia*, 22 (Lepidoptera): 970 pp., 32pl. Edizioni Calderini. Bologna. ● CALLE PASCUAL, J.A. 1983. *Los Lepidópteros de Castellón de la Plana*: 190 pp. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. ● CODINA, A. 1918. Heteróceros de Cataluña. Segunda serie. *Boln. Soc. aragon. Cienc. Nat.*, 17: 26-58, 75-84. ● DERRA, G. Y H. HACKER 1981. Contribution to the Lepidoptera-fauna of Spain. Heterocera of a three-week visit in summer 1980. *SHILAP Revta. lepid.*, 9(34): 127-138. ● HACKER, H., L. RONKAY & M. HREBLAY 2002. Hadeninae I. *Noctuidae Europaeae*, 4: 419 pp., 14 pl. Entomological Press, Sorø, Denmark. ● KITSCHOLT, B. 1932. Sammelergebnis in den spanischen Zentralpyrenäen. *Int. Ent. Z.*, 26: 447-450, 483-485, 506-508, 526-530. ● KOSCHWITZ, U., W. KRAUS & E. BLUM 1985. Contribution to the butterfly-fauna of Albarracín (Prov. Teruel) and adjacent areas (II). *SHILAP Revta. lepid.*, 13(51): 179-184. ● PÉREZ DE GREGORIO, J.J. 1979. Noctuidae nous per a la fauna catalana i altres citacions interessants (I). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 2: 57-68. ● REDONDO, V.M. 1986. Introducción al conocimiento de los macrolepidópteros del Valle medio del Ebro en Aragón (3ª parte). *SHILAP Revta. lepid.*, 14(55): 29-52. ● REDONDO, V.M., J. BLASCO-ZUMETA & G. E. KING 2001. Macrolepidópteros de un sabinar de *Juniperus thurifera* L. en Los Monegros, Zaragoza, España (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. lepid.*, 29(116): 323-370. ● YELA GARCÍA, J. L. 1981. Nuevas adiciones a los Noctuidae de Trillo (Guadalajara), y algunas consideraciones respecto a las características de dicha localidad. *SHILAP Revta. lepid.*, 9(33): 35-40.