

HALLAZGO DE *HADJINA WICHTI* HIRSCHKE, 1904 Y REENCUENTRO DE *EUCHLOE BELEMIA* (ESPER, 1800) EN ARAGÓN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, PIERIDAE)

Víctor M. Redondo

cl. Blancas, 8; 50001 Zaragoza

Resumen: Se presentan datos sobre la captura de dos interesantes lepidópteros para Aragón.

Palabras clave: Lepidoptera, Aragón.

Fotografía en color disponible en <http://entomologia.rediris.es/ aracnet/8>

Este artículo forma parte de un programa de estudio que la Sociedad Entomológica Aragonesa está llevando a cabo, con el patrocinio del Gobierno de Aragón y que tiene como finalidad el conocimiento de los diferentes órdenes de insectos que se encuentran en La Lomaza y Planerón de Belchite (Zaragoza), catalogadas en la actualidad como Refugio de Fauna Silvestre y Zona de Especial Protección para las aves.

Precisamente, en La Lomaza, se logró coleccionar 1 ♂ y 1 ♀ de *Hadjina wichti* Hirschke, el 25 de agosto del 2001. Especie que resulta ser nueva para Aragón.

El hallazgo de este noctuido en el valle del Ebro, aunque importante, era previsible, ya que se conocían dos citas próximas en el límite con territorio aragonés, en concreto de Serós y Granja d'Escard en Lérida (DE GREGORIO, 1991).

El dato extiende hacia el interior de la península Ibérica, la distribución de este endemismo, ya que únicamente se conocía de provincias próximas a la franja mediterránea árida de Alicante, Cádiz, Lérida y Murcia.

En Aragón se comporta como una especie propia de la estepa con yesos del valle del Ebro.

Euchloe belemia (Esper, 1800), es un piérido de ambiente mediterráneo occidental, ampliamente distribuido en la mitad occidental y meridional de la península Ibérica, pero que parece faltar en una amplia zona del noreste ibérico.

El 24 de abril del 2001, nuestro amigo y especialista en neurópteros, Alfredo Fernández, tuvo la fortuna de coleccionar un macho de *Euchloe belemia*, de la segunda generación, en La Lomaza de Belchite (Zaragoza), a 400 metros de altitud (Fig. 1).

Hasta la fecha, la especie había sido citada de Aragón de la población de Castelserás y de una masada entre Albarracín y Teruel (ZAPATER & KORB, 1883), hace 118 años.

Con este nuevo dato se confirma su presencia en Aragón y se amplía a la provincia de Zaragoza la distribución de este bello piérido.

Bibliografía: PÉREZ DE GREGORIO, J.J. 1991. *Hadjina wichti* Hirschke, 1904, Noctuidae Amphypyrinae nou per a la fauna catalana. *Butll.Soc.Cat.Lep.*, 67: 38-42. • ZAPATER, B. & KORB, M. 1883. Catálogo de los lepidópteros de la provincia de Teruel, y especialmente de Albarracín y su sierra. *An. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 12: 273-318.

UN GINANDROMORFO DE *CHAZARA PRIEURI IBERICA* (OBERTHÜR, 1907)

Rafael Estévez

Plaza de Compostela, 21; 36201 Vigo (Pontevedra).

Fotografía en color disponible en <http://entomologia.rediris.es/ aracnet /8>

En una de las numerosas exploraciones que realicé por tierras de la siempre interesante Sierra de Albarracín, en Teruel, tuve la fortuna de capturar el ginandromorfo de *Chazara prieuri iberica* (Oberthür, 1907) que se ilustra en la figura 1. Datos de captura: Torres de Albarracín (Teruel), 1200 m, 17-VII-1989.

No me consta la existencia de casos previos similares citados en la literatura lepidopterológica.

Fig.1. Ginandromorfo de *Chazara prieuri iberica* (Oberthür). Foto R. Estévez, retocada por Ramón Gimeno.



Fig. 1 . *Euchloe belemia* (Esper, 1800) (reverso), ♂, 24-IV-01 y *Euchloe crameri* (Butler, 1869) (reverso), ♀, 23-V-01, ambas capturadas en Belchite (Zaragoza). Fotografía: Ramón Gimeno

