

CATALOGUS

DE LA ENTOMOFAUNA ARAGONESA Nº 2

Suplemento del BOLETIN SEA nº 6 - JULIO 1.994



Dibujo: D.GRUSTAN-1993.

SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA

c/. Colón, 6 y 8 ; 50007 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Apdo.postal: 3.083 ; 50080 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tef. (976) 324415 ; Fax: (976) 535697

CATALOGUS

DE LA ENTOMOFAUNA ARAGONESA

Suplemento del BOLETIN DE LA S.E.A., compuesto por tres secciones:

1.- El **Catalogo de la Entomofauna Aragonesa**, en el que se listan, por familias ó subfamilias, las especies citadas para la Comunidad Aragonesa.

2.- **News**: recopilación de artículos entomológicos publicados en diversas revistas científicas en los que se incluyan citas sobre artrópodos presentes en la Comunidad Aragonesa.

3.- **Citas Aragonesa**: que incluye las que sean novedosas o interesantes de especies presentes en Aragón.

Director: Antonio MELIC

Edita: Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)
c/. Colón, 6 y 8; 50007-ZARAGOZA
Apdo.Postal: 3083 ; 50080-ZARAGOZA
Tef. 976-32-44-15
Fax. 976-53-56-97

Catalogus publicados:

CATALOGUS 1.

Insecta: Coleoptera 1. Familia Oedemeridae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 2. Familia Mycteridae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 3. Familia Pythidae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 4. Familia Pyrochroidae. X.Vázquez.

CATALOGUS 2.

Insecta: Coleoptera 5. Familia Histeridae. T.Yélamos.

Abreviaturas:

H: Huesca.
T: Teruel.
Z: Zaragoza.
A: Aragón.

CATALOGUS: 2.

INSECTA: COLEOPTERA 5.

Superfamilia: Histeroidea

FAMILIA: *HISTERIDAE*

Tomás Yélamos

- [1.] *Abraeus granulum* Erichson, 1839 :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Vall D'Aran).
- 2. *Abraeus perpusillus* (Marsham, 1802):
H (Ansó).
- 3. *Acritus Komai* Lewis, 1879 :
T (Albarracín).
- 4. *Acritus minutus* (Herbst, 1792) :
H (Ansó).
- 5. *Acritus nigricornis* (Hoffmann, 1803) :
Z
- 6. *Atholus bimaculatus* (Linne, 1758) :
T (Pto.Orihuela).
- [7.] *Atholus corvinus* (Germar, 1817) :
Presencia probable en A. Citado de Navarra (Tafalla).
- 8. *Atholus duodecimstriatus* (Schränk, 1781):
T, Z (Moncayo).
- 9. *Carcinops (s.str.) pumilio* (Erichson, 1834):
Z (Arrabal, Río Ebro).
- 10. *Chalcionellus aemulus* (Illiger, 1807):
Z (Torres Borrellen).
- 11. *Chalcionellus amoenus* (Erichson, 1834):
H (Ansó).
- 12. *Chalcionellus decemstriatus* (Rossi, 1792):
H (Ansó-Roncal, San Juan de la Peña, Villanúa), T (Frías de Albarracín).
- [13.] *Chalcionellus (Izpaniolus) ibericus* Dahlgren, 1969 :
Presencia probable en A. Citado de Guadalajara (Colmenar de la Sierra)].
- [14.] *Dendrophilus (s.str.) punctatus* (Herbst, 1792) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Vall D'Aran).
- [15.] *Euspilotus (Neosaprinus) perrisi* (Marseul, 1872) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Terra Alta).
- [16.] *Exaesiopus grossipes* (Marseul, 1855) :
Presencia probable en A. Citado de Navarra (Cascante).

- [17.] *Gnathoncus nannetensis* (Marseul, 1862) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Vall D'Aran)].
18. *Gnathoncus rotundatus* (Kugelann, 1792):
T, Z (Zuera).
19. *Hister capsirensis* Auzat, 1922 :
T (Pto. Noguera, Sierra de Albarracín).
20. *Hister grandicollis* Illiger, 1807 :
T (Albarracín, Mosqueruela, Pico Javalambre, Pto. Cuarto Pelado, Valdelinares), Z (Bujaraloz, Caspe, El Cisne, Epila, Juslibol).
21. *Hister Illigeri* Duftschmidt, 1805 :
H (Ansó), T.
22. *Hister lugubris* Truqui, 1852 :
Z (Bujaraloz, Sástago).
- [23.] *Hister mediterraneus* Lundgren, 1992 :
Presencia probable en A. Citado de Soria (Montenegro de Cameros).
- [24.] *Hister moerens* Erichson, 1834 :
Presencia probable en A. Citado de Soria (Laguna Negra).
25. *Hister quadrimaculatus* Linnaeus, 1758 :
Z (Mtes.de Castejón).
26. *Hister teter* Truqui, 1852 :
H (San Juan de la Peña).
27. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758 :
H (Borau, Aragón, Circo de Soaso, Jaca, Pantano de la Peña, San Juan de la Peña, Selva de Oza).
28. *Hololepta (s.str.) plana* (Sulzer, 1776):
Z (Juslibol).
29. *Hypocacculus (Colpellus) praecox* (Erichson, 1834) :
Z (Caspe).
- [30.] *Hypocacculus (Nessus) ferreri* Yelamos, 1990 :
Presencia probable en A. Citado de Navarra (Cascante).
- [31.] *Hypocacculus (s str.) metallescens* (Erichson, 1834) :
Presencia probable en A. Citado de Guadalajara (Pinilla de Molina).
- [32.] *Hypocacculus (s str.) spretulus* (Erichson, 1834) :
Presencia probable en A. Citado de Guadalajara (Los cercados, Sierra Colmenar).
33. *Kissister minimus* (Aubé, 1850) :
H (Esquedas).
34. *Margarinotus (Eucalohister) binotatus* (Erichson, 1834) :
H (Barbastro), Z (Juslibol, Villamayor).
35. *Margatinotus (Paralister) ignobilis* (Marseul, 1854) :
T, Z (María de Huerva).
- [36.] *Margarinotus (Paralister) punctiventer* (Marseul, 1854) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Valle d'Aran).
37. *Margarinotus (Paralister) purpurascens* (Herbst, 1792) :
H (Circo de Soaso, Mte. Pérdido, Fanlo).
38. *Margarinotus (Paralister) uncostriatus* (Marseul, 1854) :
T (Griegos), Z (Moncayo).
39. *Margarinotus (Paralister) ventralis* (Marseul, 1854) :
H (Jaca, San Juan de la Peña, Ordesa)

40. *Margarinotus (Promethister) marginatus* (Erichson, 1834) :
Z.
41. *Margarinotus (Ptomister) brunneus* (Fabricius, 1775) :
H (Tolba), T (Pto. Cuarto Pelado), Z (Mtes.de Castejón).
42. *Margatinotus (Stenister) obscurus* (Kugelann, 1792) :
H (San Juan de la Peña, Selva de Zuriza, Ordesa), Z (Moncayo).
- [43.] *Onthophilus globulosus* (Olivier, 1789) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Segria).
- [44.] *Onthophilus striatus* (Forster, 1771) :
Presencia probable en A. Citado de Navarra (Sima Lezegalde).
45. *Pachylister (s.str.) inaequalis* (Olivier, 1789) :
H (Selva de Oza).
46. *Pactolinus major* (Linne, 1767) :
H (Candasnos, Peñalba), Z (Bujaraloz, Sastago).
47. *Paromalus (s.str.) flavicornis* (Herbst, 1792) :
H (Ansó, Hecho, Selva de Oza), Z (Veruela).
48. *Paromalus (s.str.) parallelipipedus* (Herbst, 1792) :
H (Hecho, Selva de Oza, Peña Oroel, San Juan de la Peña), T (Pto. Cuarto Pelado).
49. *Platylomalus complanatus* (Panzer, 1797):
Z (Juslibol).
50. *Platysoma (Cylister) elongatum* (Thunberg, 1787) :
H (San Juan de la Peña), T (Guadalaviar).
51. *Platysoma (Eurylistar) minor* (Rossi, 1792) :
H (Ansó, Siresa, Peña Fosca).
52. *Platysoma (s.str.) compressum* (Herbst, 1783) :
H (Ansó, Peña Oroel, San Juan de la Peña).
- [53.] *Plegaderus (s.str.) caesus* (Herbst, 1792):
Presencia probable en A. Citado de Soria (Agresia).
54. *Plegaderus (s.str.) dissectus* Erichson, 1839 :
H (Selva de Oza, Hecho).
55. *Plegaderus (s.str.) otti* Marseul, 1856 :
Z (Monegros).
56. *Plegaderus (s.str.) sanatus* Truqui, 1852:
H (Distrito forestal).
57. *Plegaderus (s.str.) saucius meridionalis* J.Muller, 1907 :
H (Peña Oroel, San Juan de la Peña, Selva de Oza, Hecho).
58. *Saprinus (Phaonius) Pharaon* Marseul, 1855:
Z (Sástago).
59. *Saprinus (s.str.) acuminatus* (Fabricius, 1798) :
H (Litera, Tolba), T (Frías de Albarracín).
60. *Saprinus (s.str.) aegialius* Reitter, 1884:
H (Toquero, Selva de Zuriza).
61. *Saprinus (s.str.) aeneus* (Fabricius, 1775):
H (Selva de Oza).
- [62.] *Saprinus (s.str.) algericus* (Paykull, 1811) :
Presencia probable en A. Citado de Cataluña (Terra Alta).


63. *Saprinus (s.str.) deterrentus* (Illiger, 1807) :
H (Fraga, Litera, Tolba), Z (Zaragoza, Bujaraloz, Vinuesa).
64. *Saprinus (s.str.) figuratus* Marseul, 1855 :
H (Peñalba), T (Pto. Cuarto Pelado), Z (Zaragoza, Bujaraloz, Sástago).
65. *Saprinus (s.str.) furvus* Erichson, 1834 :
H (Benavarri, Fraga, Llitera, Peñalba, Tolba), Z (Caspe, Mequinenza, Sástago).
66. *Saprinus (s.str.) georgicus* Marseul, 1862 :
H (Benavarri, Fraga, Llitera, Peñalba, Tolba), Z (Caspe, Mequinenza, Sástago).
67. *Saprinus (s.str.) godet* (Brullé, 1832) :
H (Fraga, Peñalba, Tolba), Z (Sástago).
- [68.] *Saprinus (s.str.) inmundus* (Gyllenhal, 1827) :
Presencia probable en A. Citado de Guadalajara (Río Jaramillo).
69. *Saprinus (s.str.) lautus* Erichson, 1839 :
H (Bielsa).
70. *Saprinus (s.str.) maculatus* (Rossi, 1792):
Z (Caspe, Sástago).
71. *Saprinus (s.str.) melas* Kuster, 1849 :
H (Fraga, Peñalba), Z (Bujaraloz, Mtes.de Torrero, Sástago).
72. *Saprinus (s.str.) planiusculus* Motschulsky, 1849 :
H (Hecho, Peñalba).
73. *Saprinus (s.str.) politus* (Brahm, 1790) :
H (Candanchú, Fraga), T (Teruel), Z (Bujaraloz).
74. *Saprinus (s.str.) politus similis* J.Muller, 1900 :
Z (Zaragoza, Bujaraloz).
- [75.] *Saprinus (s.str.) semistriatus* (Scriba, 1790) :
Presencia probable en A. Citado de Navarra (Tafalla).
76. *Saprinus (s.str.) semipunctatus* (Fabricius, 1792) :
H (Fraga, Llitera, Peñalba), Z (Zaragoza, Bujaraloz, Caspe, Sástago).
77. *Saprinus (s.str.) subnitescens* Bickhardt, 1909 :
H (Benavarri, Fraga, Llitera, Tolba, Toquero, Peñalba), Z (Caspe, Mequinenza).
78. *Saprinus (s.str.) tenuistrius sparsutus* Solskiy, 1876 :
H (Fraga, Peñalba, Tolba), Z (Caspe, Mequinenza, Sástago).
79. *Saprinus (s.str.) virescens* (Paykull, 1798) :
Z (Juslibol).
80. *Teretrius (Neotepetrius) parasita* Marseul, 1862 :
Z (Caspe).

FUENTES:

Colección y archivo personal del autor.

Tomás Yélamos
c/.Valencia,109
08028 BARCELONA (ESPAÑA)

NEWS



ALONSO-ZARAZAGA, M.A. 1993.-Diagnosis preliminar de *Ceratopion* (*Echinostroma*) *wanati* sp.n. (Coleoptera, Apionidae). Graellsia, 49: 123.

Descripción de un nuevo apión. Holotipo y un Paratipo en base a material de las Llanuras del La Larri, Bielsa, Huesca (18-8-90).

VALLADARES, L.F. et al. 1993.-Sobre la presencia de *Hydrochara caraboides* (Linnaeus 1758) e *Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758) en la Península Ibérica (Coleoptera: Hydrophilidae). Zool.baetica, 4: 7-12.

Confirmación de la presencia en la Península Ibérica de las 2 especies con material procedente de los Pirineos Orientales (Girona). *Hydrophilus piceus* estaba previamente citada de Zaragoza.

LOPEZ-COLON, J.I. 1993.-Notas taxonómicas y distribución geográfica de los representantes ibéricos del género *Ochodaeus* DEJEAN, 1821 (Coleoptera, Scarabaeoidea). Nouv. Revue Ent. (N.S.), T.10 (3): 289-295.

Estudio de las 4 especies del género presentes en la Península Ibérica, una de las cuales -*O.inermis* REITTER, 1893- fue descrita sobre un ejemplar capturado en Aragón. Existen citas posteriores de la provincia de Teruel.


LOPEZ-COLON, J.I. 1993.- *Salsola vermiculata* L., fito-huésped de

Sphenoptera (*Chilostheta*) *pilosula castellana* Cobos, 1986 (Coleoptera: Buprestidae: Sphenopteridae). Zool. baetica, 4: 177-178.

Datos sobre la biología de la ssp. *castellana*, cuya forma típica está citada de Teruel (Albarracín).

SANCHEZ-PIÑERO, F. et al. 1993.-Nuevas citas de *Ochodaeus inermis* Reitter, 1892 (Coleoptera, Scarabaeoidea: Ochodaeidae). Zool.baetica, 4: 183-184.

Se amplían datos sobre este endemismo ibérico descrito sobre material capturado en Aragón (sin más datos). Posteriormente, existe otra cita de Teruel.



HUEMER, Von Peter 1993. - Subspeziationstrends von *Dichrorampha cacaleana* (HERRICH-SCHAFFER). (Lepidoptera, Tortricidae) Mitt. Munch. Ent. Ges., 83: 109-117. Munich.

Notas sobre tres subespecies de *D. cacaleana*. Modificación del estatus de *D.cacaleana guarramana* (KENNEL, 1921) stat.n., presente en la Sierra del Moncayo.

DOMINGUEZ, M., J.BAIXERAS & J.L.YELA 1993.- Descripción de la femelle de *Rheumaptera gudarica* DUFAY, 1983 (Lepidoptera, Geometridae). Nouv. Revue Ent. (N.S.), T.10(1): 65-68.

La especie fue descrita en 1983 sobre ejemplares capturados en Gúdar (Teruel). El trabajo citada describe la ♀ sobre nuevas capturas de Cuenca, Guadalajara y Teruel (Moscardón).

JUTZELER, D. & R. LEESTMANS. 1994.-Les états préimaginaux et l'écologie de *Satyrus actaea* ESPER (1780) dans le S.E. de la France. Considérations sur la taxinomie et la géonémie des taxons du genre *Satyrus* (s.str.) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyridae). Linneana Belgica, Pars XIV, nº 5: 275-288.

Artículo dividido en dos partes: la primera relativa a la cría en cautividad y desarrollo de *S. actaea*; la segunda comprende notas sobre taxonomía y distribución de varios taxones del género *Satyrus* (s.str.) y especialmente de *S. actaea*, cuya área de repartición incluye todo Aragón.



MONSERRAT, V.J. & F. RODRIGO. 1992.-Nuevas citas sobre los crisópidos ibéricos (Insecta, Neuroptera: Chrysopidae). ZOOLOGICA BAETICA, nº 3. Universidad de Granada.


Datos sobre distribución y biología de 36 especies de crisópidos de la fauna ibérica. Se citan las siguientes 13 sp. para Aragón (señalado con * las 1ª citas cada provincia):

Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836): T
Nineta pallida (Schneider, 1851): H
Chrysopa viridiana Schneider, 1845: T
Chrysopa nierenbergi (Navás, 1908): Z * (conocida de T)
Chrysopa regalis (Navás, 1915): T
Mallada genei (Rambur, 1842): Z
Mallada clathratus (Schneider, 1845): T
Mallada granadensis (Pictet, 1865): T
Mallada picteti (McLachlan, 1880): Z
Mallada ibericus (Navás, 1903): Z
Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851): H
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836): T
Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935): T*



BOSMANS, R. & K. DE SMET 1993.-Le genre *Walckenaeria* Blackwall en Afrique du Nord (Araneae, Linyphiidae). Etudes sur les Linyphiidae nord-africaines, I. Revue Arachnologique, tome 10 (2).

Se aportan datos sobre este género de arácnidos para el Norte de África y se recopilan las citas europeas de *Walckenaeria* (*Prosopotheca*) *corniculans* (O.P. Cambridge), entre las que figuran varias de Denis para el Pirineo oscense.



PARDO, J.E. et al. 1993.-Orthopteroidea de los sistemas montañosos de Castilla-La Mancha (España). I. Phasmoptera, Dermaptera, Mantodea, Blattoptera. Zool. baetica, 4: 89-112.

Estudio de los orthopteroidea de la Comunidad Autónoma. Una de las áreas de estudio: Serranía de Cuenca (Cuenca) resulta colindante con Teruel, por lo que es previsible que las especies citadas para dicha área estén presentes en la provincia aragonesa. Las especies citadas de la Serranía de Cuenca, son:

PHASMOPTERA:

Leptynia hispanica (Bolivar, 1878)

DERMAPTERA:

Euborellia moesta (Serville, 1839)
Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878)
Forficula auricularia Linnaeus, 1758

MANTODEA:

Ameles spallanzania (Rossi, 1792)
Ameles assoi (Bolívar, 1873)
Ameles decolor (Charpentier, 1825)
Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Mantis religiosa Linnaeus, 1758
Geomantis larvoides Pantel, 1896

BLATTOPTERA:

Phyllodromica (*Lobolampra*) *carpetana* (Bolívar, 1873)
Phyllodromica (*Lobolampra*) *subaptera* (Rambur, 1838)



PARDO, J.E. et al. 1993.-Orthopteroidea de los sistemas montañosos de Castilla-La Mancha (España). II. Ensifera. Zool. baetica, 4: 113-148.


Continuación del trabajo anterior. Las especies citadas de la Serranía de Cuenca, son:

Phaneroptera nana Fieber, 1853
Barbitistes fischeri (Yersin, 1854)
Conocephalus (*Xiphidion*) *discolor* Thunberg, 1815
Tettigonia viridissima Linneo, 1758
Platycleis (*Platycleis*) *albopunctata* *hispanica* Zeuner, 1941
Platycleis (*Platycleis*) *albopunctata* *sculpta* Zeuner, 1941
Platycleis (*Platycleis*) *intermedia* *intermedia*

(Serville, 1839)
 Platycleis (Platycleis) affinis Fieber, 1853
 Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier, 1825)
 Thyronotus corsicus corsicus Rambur, 1839
 Antaxius (Chopardius) kraussi (Bolivar, 1878)
 Antaxius (Chopardius) spinibrachius (Fischer, 1853)
 Ehippigerida areaolaria (Bolivar, 1877)
 Ehippigerida zapateri (Bolivar, 1877)
 Steropleurus perezii (Bolivar, 1877)
 Steropleurus ortegai (Pantel, 1896)
 Pycnogaster (Pycnogaster) jugicola jugicola Graells, 1851
 Gryllus campestris Linnaeus, 1758
 Gryllus bimaculatus De Geer, 1773
 Melanogryllus desertus (Pallas, 1771)
 Sciobia lusitanica Rambur, 1839
 Petaloptila aliena (Brunner, 1882)
 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
 Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)

BADIH, A. et al. 1993.- *Mioscirtus wagneri maghrebi* Fernandes, 1968 nueva cita para el sureste de la Península Ibérica (Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae). Zool. baetica, 4: 179-180.

Nuevas citas de esta especie hasta ahora sólo capturada en Madrid y Zaragoza.




DELECOLLE, J.C. & J.P. RIEB 1993.- Contribution à l'étude des Cératopogonidés d'Espagne. Description de *Forcipomyia* (Thyridomyia) *blascoi* n.sp. (Diptera, Nematocera). Nouv.Revue Ent. (N.S.), T.10(2):109-120.

Lista de 20 especies de Ceratopogónidos capturados en la Retuerta de Pina (Zaragoza), de 1989 a 1991, por Javier BLASCO. Dos de ellas, señaladas con * son nuevas para la fauna española. *Forcipomyia* (Thyridomyia) *blascoi* es nueva para la ciencia. La lista completa, es:

Atrichopogon (Melohelea) *lucorum* (MEIGEN, 1818)
Atrichopogon (Psammipogon) *luteicollis* (BECKER, 1903)
Culicoides *cataneii* CLASTRIER, 1957
Culicoides (Beltranmyia) *circumscripatus* KIEFFER, 1918
Culicoides *jumineri* CALLOT & KREMER, 1970
Culicoides *maritimus* KIEFFER, 1924.
Culicoides (Culicoides) *newstaedi* AUSTEN, 1921
Dasyhelea (Pseudoculicoides) *arenosa* KIEFFER, 1924*
Dasyhelea (Pseudoculicoides) *bicrenata* KIEFFER, 1923
Dasyhelea (Dicryptoscena) *modesta* (WINNERTZ, 1852)
Dasyhelea (Pseudoculicoides) *punctiventris* GOETGHEBUER, 1940*
Dasyhelea (Dasyhelea) *versicolor* (WINNERTZ, 1852)
Forcipomyia (Forcipomyia) *armendarizi* SAHUQUILLO & GIL, 1982
Forcipomyia (Thyridomyia) *blascoi* DELECOLLE & RIEB, 1993 (**)
Forcipomyia (Forcipomyia) *ciliata* (WINNERTZ, 1852)

Forcipomyia (Microhelea) *kaltenbachii* (WINNERTZ, 1852)
Forcipomyia (Synthyridomyia) *knockensis* GOETGHEBUER, 1938
Forcipomyia (Synthyridomyia) *murina* (WINNERTZ, 1852)
Forcipomyia (Euprojoannisia) *pilonota* (KIEFFER, 1911)
Forcipomyia (Lasiohelea) *velox* (WINNERTZ, 1852)



BORDERA, S. & J.SELFA 1993.- Datos sobre la fauna de *Acrolytina* de la Península Ibérica (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nouv.Revue Ent. (N.S.), T.10 (3): 281-288.

Estudio de la fauna de *Acrolytina* de la Península Ibérica (3 géneros y 6 especies), de las que se aportan algunas citas para Teruel:

Lysibia nana (GRAVENHORST, 1829): Teruel.
Lysibia tenax (GEMES, 1983): Teruel.
Acrolyta rufocincta (GRAVENHORST, 1829): Teruel.
Eudelus okadaei (UCHIDA, 1942): Teruel.


MICHELENA, J.M. & A.SANCHIS 1993.- *Metaphidius* STARY & SEDLAG, 1959 en la Península Ibérica (Hymenoptera, Braconidae). Note scientifique. Nouv.Revue Ent. (N.S.), T.10(4):379-380.


Cita para Teruel (Bronchales) de la especie *Metaphidius aterrimus* FARHINGER, 1935, la cual constituye la primera del género para la Península Ibérica.

ASKEW, R.R. 1994.- Two new European species of *Ormyrus* (Hym., Ormyridae). Entomologist's Monthly Magazine, Vol.130: 87-93.

Descripción de dos nuevas especies del género: *Ormyrus capsalis*, en base a material capturado en Francia (holotipo y paratipos) y en Pina de Ebro (Zaragoza, Monegros) por Javier Blasco (2 ♀♀ y 2 ♂♂) y Toledo.

La segunda especie, *Ormyrus monegricus*, también se describe en base a material capturado exclusivamente por J.Blasco en Pina de Ebro (Zaragoza, Monegros). Tipos depositados en el British Museum (Natural History).





LE SCARABÉE SACRÉ (La pilule)

Fotografía de *Souvenirs entomologiques. Etudes sur le instinct et les Moeurs des Insectes (1^a série)*
Ed.definitive. París, 1920. J.H.FABRE.

PYROCHROIDAE Latreille, 1807 aragoneses.

A.Melic

En el Catalogus de la Entomofauna aragonesa nº 1 Xavier Vázquez (VAZQUEZ, 1994) señala las especies de cuatro familias de coleópteros citadas para Aragón o cuya presencia puede considerarse como probable. En el caso concreto de la familia *Pyrochroidae* Latreille, 1807, se señala la presencia de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) y *P. serraticornis* (Scopoli, 1763) como probable en el Pirineo de Huesca. Y tal criterio no puede ser más acertado.

En el caso de *P. coccinea*, la cita se remonta al año 1968, en la que ESPAÑOL la menciona del Valle de Ordesa (Huesca), tal y como recoge el propio autor, Xavier VAZQUEZ, en su reciente trabajo sobre la familia (VAZQUEZ, 1993), por lo que su inclusión como probable, en lugar de segura, es una mera errata.

La otra especie, *P. serraticornis*, sólo estaba citada de Barcelona, Lérida, Soria y Vizcaya, según señala VAZQUEZ y, a la vista de la distribución geográfica conocida, era probable su presencia en, al menos, el Pirineo oscense.

Recientemente me fueron facilitados por D.Grustán varios coleópteros capturados por él en Piedrafita (Huesca), cerca de la frontera francesa, hallando entre ellos, un ejemplar de *P. serraticornis*, que viene a confirmar las suposiciones de Xavier VAZQUEZ respecto a la presencia de la especie en el Pirineo aragonés.

La cita concreta es: ♂ Piedrafita (Huesca), 31-V-1994, D.Grustán leg., A.Melic det. El ejemplar se encuentra en mi colección.


Antonio Melic
Avda. Radio Juventud, 6
50012 ZARAGOZA.

Bibliografía:


VAZQUEZ, X. 1993.- Coleoptera. Oedemeridae, Pyrochroidae, Pythidae, Mycteridae. En: Fauna Ibérica, Vol. 5. RAMOS, M.A. et al (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 181 pp.

VAZQUEZ, X. 1994.- Catalogus de la Entomofauna Aragonesa, nº 1, Insecta: Coleoptera 4: Familia Pyrochroidae. Suplemento 1 del Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, nº 5: p.6.

ESPAÑOL, F. 1968.- Entomofauna forestal española: la familia Pyrochroidae (Col., Heteromera). Boletín del Servicio de Plagas Forestales 11(22): 111-113.



Pyrochroa coccinea
(de VAZQUEZ, 1993)



Pyrochroa serraticornis
(elaboración propia a
partir de VAZQUEZ, 1993)

ALGUNOS COLEPTEROS INTERESANTES DE LOS MONTES DE TORRERO (ZARAGOZA).

Por César González Peña (*)

(*) Artículo publicado en el Boletín Informativo del Grupo Entomológico de Zaragoza, nº 1 (16-3-1979).

Los Montes de Torrero están formados por un conjunto de colinas de poca altitud y pequeños valles; situados en el extremo sureste de la ciudad de Zaragoza. Constituyen un entorno de unas características muy particulares, entre las que cabe destacar la gran sequedad del terreno así como su composición, en la que el yeso es el principal componente. Todo esto condiciona una vegetación esteparia en la que las gramíneas, tomillos, ephedras, romeros y aliagas son los tipos de plantas más frecuentes.

Entre los muchos coleópteros que pueblan estos parajes voy a recoger en la presente nota una serie de especies que a mi juicio son interesantes, bien por contribuir al conocimiento de la fauna ibérica, bien por su interés dentro de la entomofauna de la provincia de Zaragoza. Estas especies pertenecen a las familias siguientes: *Cerambycidae*, *Scarabaeidae*, *Carabidae* y *Cicindelidae*, por ser estas las que más he estudiado.

CERAMBYCIDAE

- *Hispanodorcadion navasi* Esc.:

Especie endémica de la zona. Los adultos corretean entre las gramíneas desde finales de febrero a mediados de abril, época en que su captura es relativamente frecuente.

- *Vesperus xatarti* Duf.:

De costumbres nocturnas, es fácil capturar machos de noviembre a febrero, atraídos por la luz. Las hembras son escasas y su captura esporádica.

- *Cartallum ebulinum* L.:

Muy común de marzo a mayo sobre las flores de los jaramagos.

- *Phytoecia coerulea* Scop.:

Frecuente sobre los tallos de los jaramagos, de mitad de marzo a mediados de mayo.

- *Agapanthia asphodeli* Latr. y *A. cardui* L.:

Estas dos especies son frecuentes sobre el tallo del asphodelo de abril a finales de junio.

- *Semanotus laurasi* Luc.:

Un ejemplar capturado por P. Rovira, volando al atardecer en mayo de 1977.

- *Phymatodes testaceum* L.:

Poco frecuente. Vuela al atardecer desde mediados de abril hasta finales de mayo.

- *Penichroa fasciata* Steph.:

Un ejemplar capturado por V.Redondo el cinco de agosto de mil novecientos setenta y cuatro.

SCARABAEIDAE

- *Ateuchetus laticollis* L.:

Bastante frecuente. Se encuentra de marzo a junio volando o sobre el suelo.

- *Ateuchetus puncticollis* Latr.:

Bastante frecuente desde marzo a finales de mayo, llevando la pelota de excrementos o en pequeños túneles en el suelo.

- *Scarabaeus sacer* L.:

Un ejemplar muerto y acarreado por las hormigas en agosto de 1976.

- *Gymnopleurus coriarius* Herbst.:

Poco frecuente. De marzo a junio en excremento de ganado lanar.

- *Bolbelasmus bocchus* Er.:

Especie muy interesante. Bastante común de marzo a mediados de junio.

- *Trox perlatus* Goeze.:

Bastante común. Prácticamente todo el año, sobre excrementos de cánido principalmente.

- *Thorectes albarracinus* Wagner.:

Bastante frecuente, caminando por el suelo, sobre todo tras días lluviosos, o en pequeños túneles.

- *Pleurophorus caesus* Creutz.:

Muy común en primavera, volando al atardecer.

CARABIDAE

- *Hadrocarabus lusitanicus aragonicus* Glamb.:

Bastante escaso. Ejemplares aislados bajo las piedras, de febrero a junio. Especie muy interesante por ser la subespecie *aragonicus* endémica de la región.

- *Cimindis lineola* Dej.:

Poco frecuente. Bajo las piedras.

- *Paracelia simplex* Dej.:

Relativamente frecuente bajo las piedras.

- *Lamprias cyanocephala* L.:
Bastante común aunque siempre ejemplares aislados por el suelo o bajo las piedras. De marzo a mayo.

- *Microlestes negrita* Wol.:
Bastante común bajo las piedras y correteando por el suelo.

- *Aptinus displosor* Duf.:
Bastante común bajo las piedras.

- *Pseudoaptinus rugipleuris* Reitt.: (?)..
Muy escaso. Bajo las piedras.

CICINDELIDAE

- *Cicindela maroccana* F.:
Bastante común de marzo a julio.

César Gonzalez Peña.
S.E.A.

CITAS ENTOMOLOGICAS

Dos citas interesantes del Puerto de Paniza (Zaragoza): *Euphydryas aurinia beckeri* (Lepidoptera: Nymphalidae), 8-VI-1981 y *Rhabdotocarabus melancholicus* (Coleoptera: Carabidae), 17-III-1990. Valentín Agulló.

