

Presencia de *Leptynia (Leptyniella) attenuata* (Pantel 1890) en el noroeste de la provincia de León, España (Phasmatodea, Heteronemiidae)

Miguel Moya A.

Apdo. De correos 63
Pola de Lena (Asturias)

Resumen: Se presentan nuevos registros para la especie endémica ibérica *Leptynia (Leptyniella) attenuata* Pantel, 1890, ampliándose el área de distribución conocida hasta la provincia de León.

Palabras clave: Phasmatodea, Heteronemiidae, *Leptynia*, Villarodrigo de Ordás, León.




Fig. 1. Distribución de *Leptynia (Leptyniella) attenuata* (Pantel, 1890)

● Registros según Lelong (1991) ■ Nuevos registros

Leptynia (Leptyniella) attenuata (Pantel 1890) es un endemismo ibérico descubierto cerca de Castelo Branco (Portugal) que se localiza en la parte central de la Península Ibérica y en el sur, así como en el centro y sur de Portugal (Lelong, 1991, 1992).

A estos datos podemos añadir ahora un conjunto de nuevos registros que amplían la distribución conocida de la especie por el norte hasta León. La especie ha sido colectada en las siguientes localidades, todas ellas a finales del mes de julio 2006: Villarodrigo de Ordás, NO León, 900 m.s.n.m., 5°49'60"W 42°42'N, UTM: 30TTN62–30TTN63, Riocastrillo de Ordás, Santamaría de Ordás y Callejo de Ordás. En todos los casos sobre *Cytisus scoparius* (L.) Link.

La distribución actual conocida de la especie, queda tal y como se refleja en la fig. 1.

Información complementaria y gráfica de la especie puede consultarse en: <http://entomologia.net/attenuata.htm>

Bibliografía: LELONG, P. 1991. *Leptynia attenuata* (Pantel 1890). *Le Monde des Phasmes*, 13: 4-8. ● LELONG, P. 1992. Le genre *Leptynia* dans la Péninsule Iberique. *Le Monde des Phasmes*, 17 : 10-15.