

Primer registro de *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) para la provincia de Sevilla (Coleoptera, Ripiphoridae)

José Sáez Bolaño¹ & José Ignacio López-Colón²

¹ Apartado de Correos 25; E-06280 Fuentes de León, Badajoz.

² Plaza de Madrid, 2, 1º D; E-28529 Rivas-Vaciamadrid, Madrid.

Resumen: Se registra por vez primera *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) en la provincia de Sevilla. Esta nueva comunicación representa la localidad más occidental conocida de su área de distribución ibérica.

Palabras clave: Coleoptera, Ripiphoridae, *Macrosiagon ferruginea*, Sevilla, Península Ibérica.

Abstract: First record of *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) from Sevilla (Andalusia, South Spain). This new communication represents the well-known most western locality of its area of Iberian distribution.

Keywords: Coleoptera, Ripiphoridae, *Macrosiagon ferruginea*, Sevilla, Iberian Peninsula.



Vistas lateral y dorsal de uno de los ejemplares (hembra) de *Macrosiagon ferruginea* de Torreblanca (Sevilla).

Macrosiagon ferruginea (Fabricius, 1775) (*Mordella ferruginea* Fabricius, 1775. *Syst. Ent.*: 262) es una especie de amplia distribución: extendida por Europa meridional: España, Francia, Italia, Eslovenia, Baleares, Córcega, Cerdeña, Malta, Sicilia; muy repartida en África, tanto en la región mediterránea como en la tropical (Senegal, Guinea, Transvaal, Eritrea, Zanzíbar, etc); por el oeste alcanza la India. En España ocupa principalmente el tercio oriental, salvo en Andalucía, donde se adentra más hacia poniente; se ha citado de toda Cataluña, Aragón (Zaragoza y Teruel), todo el Levante (Castellón, Valencia y Alicante), Castilla-La Mancha (Albacete), Murcia, Andalucía (Jaén, Granada, Málaga y Cádiz) y Baleares (Fuente, 1933; Español, 1942; López-Colón *et al.*, 1997; López-Colón, 1999a, 1999b; Fernández-Carrillo *et al.*, 2001).

De biología similar a otros congéneres: parasita a *Odynerus crenatus* Lepeletier, 1841 (Chobaut, 1895), un taxon considerado actualmente sinónimo de *Euodynerus* (*Euodynerus*) *variegatus* (Fabricius 1793). Los imagos tienen fenología estival (junio, julio y

agosto) y se localizan habitualmente en inflorescencias de umbelíferas, pero también, menos frecuentemente, sobre las de compuestas (asteráceas), labiadas y especies de otras familias.

Se comunica la presencia de *Macrosiagon ferruginea* en la provincia de Sevilla. Uno de nosotros (J. Sáez Bolaño) la colectó hace tiempo en el municipio de Torreblanca: 1 ♀ del 1-VI-1988, en inflorescencia de umbelífera, y 1 ♂ y 1 ♀ del 2-VII-1987, sobre *Mentha* sp.. La zona donde se capturaron los ejemplares es (y era entonces) un polvorín militar, un biotopo de escaso arbolado y vegetación rala (se limpiaba todos años para evitar el peligro de incendio), aunque las capturas se realizaron sobre la vegetación que crece en torno a una antigua alberca que mantiene agua embalsada todo el año y que, debido a las filtraciones, mantiene una pequeña superficie con vegetación verde constante (de ahí la presencia abundante de la labiada y de umbelíferas).

Esta nueva comunicación representa la localidad más occidental conocida de su área de distribución ibérica.

Bibliografía: CHOBOUT, A. 1895. Étude sur les *Macrosiagon* Hentz (*Emenadia* Lap.-Cast.) de la région méditerranéenne. *L'Abeille*, **28**: 181-192. ● ESPAÑOL, F. 1942. Los representantes catalanes de la familia Rhipiphoridae (Col.). *Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura, Barcelona*, **2**, 4: 335-346. ● FERNÁNDEZ-CARRILLO, E., J.L. FERNÁNDEZ-CARRILLO & J. I. LÓPEZ-COLÓN 2001. Coleoptera Rhipiphoridae de la colección J.M. De la Fuente. *Boln. de la S.E.A.*, **28**: 114. ● FUENTE, J.M. DE LA 1933. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. Ent. Españ.*, **16**: 49-52. ● LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1999a. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (II) (Coleoptera). *Lambillionea*, **99**, 1: 132-138. ● LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1999b. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (III) (Coleoptera). *Lambillionea*, **99**, 2: 258-266. ● LÓPEZ-COLÓN, J.I., MELIC BLAS, A., C.F. GONZÁLEZ PEÑA, J.R. BELTRÁN VALEN & J. BLASCO ZUMETA 1997. Familia: *Rhipiphoridae* Gemminger and Harold, 1870 [Insecta: Coleoptera, 12 (Familia 34)]. *Catalogus de la entomofauna aragonesa*, **15**, *Sociedad Entomológica Aragonesa*: 9-18.