

Expansión en Asturias de *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) (Lepidoptera, Lycaenidae)

Hugo Mortera

Lope de Vega 12, 2º B. 33204 Gijón (Asturias) – apymor@telefonica.net

Resumen: la especie introducida *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898), que se citó por primera vez de Asturias en 2002, se extiende con rapidez por las áreas de clima más suave de la región.


Palabras clave: Lepidoptera, *Cacyreus marshalli*, área de distribución, Asturias, España.

Cacyreus marshalli (Butler, 1898) es un licénido exótico que, procedente de Sudáfrica se instaló en la Península Ibérica hace algunos años, como resultado de la importación de geranios del género *Pelargonium* (Sarto I Monteys, 1993). Su presencia en Asturias se constató muy recientemente en Oviedo (Mortera, 2002), y posteriormente fue citada de Villaviciosa (Suárez Fernández, 2003). La referencia a esta especie en el Parque Nacional de los Picos de Europa (Verhulst *et al.*, 2005) se debe a su detección en Covadonga (Cangas de Onís, Asturias). Al igual que ha sucedido en regiones limítrofes, como Galicia (Rey Muñiz & Docampo, 2004) y Cantabria (Sanz Román & Marcos Gómez, 2004), se ha extendido por buena parte de Asturias con mucha rapidez, tal y como resultaba previsible. La velocidad de expansión de este licénido se ve reflejada perfectamente en la diferencia entre el mapa de distribución correspondiente a 2004 (García-Barros *et al.*, 2004), en el que, para Asturias, implicaba 3 cuadrículas UTM de 10 km de lado, y el que se adjunta correspondiente a 2007, donde ya se conoce de 30 cuadrículas.

En cuanto al rango altitudinal, las observaciones se hallan comprendidas a alturas entre el nivel del mar y 370 m. Tiene al menos tres generaciones sucesivas a lo largo del año: aparece de forma escasa en el mes de abril; durante el mes de junio se pueden ver también algunos ejemplares; pero es a partir de mediados de agosto cuando se vuelve abundante, alcanzando su plenitud de vuelo durante septiembre y octubre. Los registros en Asturias abarcan entre el 1 de abril y el 11 de noviembre. Se encuentra casi siempre en medios urbanos, en zonas ajardinadas donde se encuentre la planta nutricia de sus orugas, *Pelargonium*.

A continuación referimos nuevos registros de *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) en Asturias (entre paréntesis, coordenadas de la cuadrícula UTM de 10 km de lado) (todas las referencias: H. Mortera *leg.*):

AMIEVA: Santillán (30TUN29), a 140 m, 23 – X – 2005.
CANDAMO: Murias (29TQJ31), a 100 m, 4 – VI – 2004. **CANGAS DEL NARCEA:** Cangas del Narcea (29TPH98), a 370 m, 29 – X – 2006. **CASTRILLÓN:** Salinas (30TTP63), a 8 m, 16 – IX – 2006. **CARAVIA:** Prado (30TUP21), a 137 m, 16 – X – 2005 y 15 – X – 2006. **COLUNGA:** Colunga (30TUP11), a 20 m, 16 – X – 2005 y 8 – IX – 2006. **EL FRANCO:** Sueiro (29TPJ72), a 40 m, 6 – IX – 2006. **GIJÓN:** Gijón (30TTP82), a 10 m, 7 – VI – 2003; 21 – VIII – 2003; 7 – IX – 2003; 1 – IV – 2005; 7 – X – 2005; 2 – XI – 2005; 23 – X – 2006; 6 – XI – 2006. **GOZÓN:** Luanco (30TTP73), a 10 m, 14 – X – 2006. **LENA:** Pola de Lena (30TTN68), a 322 m, 30 – VIII – 2006. **LLANERA:** Lugo de Llanera (30TTP71), a 170 m, 5 – XI – 2006. **LLANES:** Buelna (30TUP70), a 50 m, 29 – IX – 2002. Pendueles (30TUP60), a 40 m, 29 – IX – 2002. Nueva (30TUP41), a 45 m, 14 – IX – 2003. Cuevas de Mar (30TUP41), a 5 m, 18 – IX – 2005. **MIERES:** Turón (30TTN78), a 250 m, 17 – VIII – 2004. **PEÑAMELLERA BAJA:** Alevia (30TUN79), a 240 m, 8 – X – 2005. **PROAZA:** Proaza (29TQH49), a 200 m, 10 – IX – 2006. **OVIEDO:**



Oviedo (30TTP60 y 30TTP70), a 230 m, 29 – IX – 2005 y 7 – XI – 2006. **PARRES:** Avelle (30TUN29), a 80 m, 23 – X – 2005. **PILOÑA:** Infiesto (30TTP00), a 150 m, 24 – IX – 2003. **PONGA:** Sellaño (30TUN29), a 200 m, 23 – X – 2005. **PRAVIA:** Pravia (29TQJ31), a 40 m, 28 – X – 2006. **RIBADEDEVA:** La Franca (30TUP70), a 35 m, 24 – IX – 2002. El Peral (30TUP70), a 35 m, 26 – IV – 2003. **RIBADESELLA:** Ribadesella (30TUP31), a 10 m, 16 – X – 2005. **SALAS:** Cornellana (29TQJ21), a 60 m, 28 – IX – 2002. **SIERO:** Pola de Siero (30TTT80), a 210 m, 5 – X – 2003. **SOTO DEL BARCO:** San Juan de La Arena (29TQJ32), a 5 m, 6 – XI – 2005. **TAPIA DE CASARIEGO:** Salave (29TPJ62), a 40 m, a 8 – XI – 2006. **TINEO:** Navelgas (29TPJ90), a 240 m, 8 – XI – 2006. San Fructuoso (29TQJ00), a 350 m, 11 – XI – 2006. **VILLAVICIOSA:** Villaviciosa (30TUP01), a 20 m, 23 – X – 2006.

Agradecimiento

El Principado de Asturias y la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa concedieron los permisos necesarios para los muestreos de lepidópteros.

Bibliografía: MORTERA, H. 2002. Algunos licénidos nuevos o muy escasos en Asturias (Lepidoptera: Lycaenidae). *Boln. S.E.A.*, **31**: 191. ● REY MUÑIZ, X.L. & F. DOCAMPO 2004. Presencia y reproducción de *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 en el noroeste peninsular, España. *SHILAP Revta. lepid.*, **32**(127): 264. ● SANZ ROMÁN, P. & J.M. MARCOS GÓMEZ 2004. Mariposas y ecosistemas cántabros. Cantabria Tradicional. Santander, 195 pp. ● SARTO I MONTEYS, V. 1993. Nuevos datos sobre la distribución de *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 en el archipiélago balear y en el continente europeo. *SHILAP Revta. lepid.*, **21**(81): 62-63. ● SUÁREZ FERNÁNDEZ, A. 2003. Registro de *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 en Asturias (Lepidoptera: Lycaenidae). *Boln. S.E.A.*, **32**: 215. ● VERHULST, G., J. VERHULST & H. MORTERA 2005. Mariposas diurnas del Parque Nacional de los Picos de Europa (Lepidoptera, Rhopalocera). Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. 183 pp.