Confirmación de la presencia de *Hemianax (= Anax) ephippiger* (Burmeister, 1839) (Odonata: Aeshnidae) en Extremadura (SO de la Península Ibérica)

José Luis Pérez-Bote & Antonio José Romero Castaño

Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura,
Avda. de Elvas s/n, 06071 Badajoz, España – jlperez@unex.es



Fig. 1. Alas del ejemplar de *Hemianax ephippiger* localizado. Es característico de esta especie que las celdas que ocupan el espacio comprendido entre las venas cubital (CuP) y anal (A) no estén dispuestas en dos filas regulares, como ocurre en el género *Anax*, sino que sean un grupo irregular, debido a la curvatura de la vena anal hacia la cubital.

En ocasiones ocurre que una especie no es detectada hasta mucho tiempo después de que lleguen los primeros ejemplares a una zona. Este parece ser el caso de *Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839) en Extremadura. La primera referencia a su presencia en Extremadura proviene de Muddeman (2007), quien informa de su presencia (en vuelo) en las proximidades del río Tozo, pocos kilómetros al noroeste de la localidad de Trujillo. Sin embargo, la revisión de una colección particular permitió detectar un ejemplar muy deteriorado de *H. ephipigger* que, no obstante, pudo ser perfectamente identificado en base a la peculiar venación alar (Fig. 1). Esta venación permite diferenciarla de las especies del género *Anax* (en el que la incluyen algunos autores, p.ej. Dikjstra & Lewington, 2006) presentes en Extremadura. Este ejemplar fue capturado accidentalmente el 19 de septiembre de 1991 en las proximidades de la localidad cacereña de Brozas (29SPD9085).

Hemianax ephippiger se incluye en el 11,6% de especies de origen etiópico presentes en la Península Ibérica (Torralba Burrial & Ocharan, 2007), donde presenta una distribución básicamente mediterránea, ocupando también la costa atlántica andaluza. Se trata de una especie de gran porte y con gran capacidad de vuelo, que suele presentar unas pautas de comportamiento muy similares a *Anax imperator* Leach, 1815 y *Anax parthenope* (Sélys, 1839).

Agradecimientos: a Francisco Domínguez Durán por informar sobre la presencia de la especie y a Antonio Torralba por confirmar su identidad.

Bibliografía: DIJKSTRA, K.B.D. & R. LEWINGTON (eds.) 2006. *Field guide to the dragonflies of Britain and Europe*. British Wildlife Publishing, Gillinghan, Dorset. • MUDDEMAN, J.L. 2007. Miscellaneous dragonfly (Odonata) records from Extremadura, including the first record of *Anax ephippiger* (Burmeister, 1839). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **41**: 461-462. • PÉREZ-BOTE, J.L., J.M. TORREJÓN, F. FERRI, A.J. ROMERO, J.M. GARCÍA & A. GIL 2006. Aproximación al atlas odonatológico de Extremadura (SO de la Península Ibérica) (Odonata). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **39**: 329-343. • TORRALBA BURRIAL, A. & F.J. OCHARAN 2007. Composición biogeográfica de la fauna de libélulas (Odonata) de la Península Ibérica, con especial referencia a la aragonesa. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **41**: 179-188.