

Primer registro de *Rhipiphorus subdipterus* Bosc d'Antic, 1792 (Coleoptera, Rhipiphoridae) para la provincia de Cuenca (España)

José María Ortega Seral¹ & Álvaro Murria Beltrán²

¹ Laina Serrano, nº 22, Ed. Peñalara 10º A Guadalajara, España-
² Aguadores, nº 29-33, 2º- Ctro. Zaragoza, España – alvaromurria@hotmail.com

Resumen: Se cita por primera vez para la provincia de Cuenca (España) *Rhipiphorus subdipterus* Bosc d'Antic, 1792 (Coleoptera, Rhipiphoridae).

Palabras clave: Coleoptera, Rhipiphoridae, *Rhipiphorus subdipterus*, Cuenca, España.

First record of *Rhipiphorus subdipterus* Bosc d'Antic, 1792 (Coleoptera, Rhipiphoridae) from Cuenca province (Spain)

Abstract: First record of *Rhipiphorus subdipterus* Bosc d'Antic, 1792 (Coleoptera, Rhipiphoridae) from Cuenca province (Spain).

Key words: Coleoptera, Rhipiphoridae, *Rhipiphorus subdipterus*, Cuenca, Spain.

Rhipiphorus subdipterus Bosc d'Antic, 1792 es el único representante del género *Rhipiphorus* Bosc d'Antic, 1792 presente en Europa. Esta especie se caracteriza por tener los élitros muy cortos (que dejan al descubierto las alas membranosas). La cabeza y el protórax suelen ser negros, los élitros amarillo testáceos, abdomen con coloración variable, desde el amarillo al negro, pasando por tonos intermedios. Las antenas también son muy variables de coloración, con los mismos tonos que el abdomen. Patas amarillas con los fémures oscurecidos. Cabeza con una pubescencia abundante y corta. Tamaño variable entre 5 y 10 mm.

Se encuentra en Europa meridional, Turquía, Siria, parte de Oriente Medio, Caucaso y zona meridional de la antigua Unión Soviética. En la Península Ibérica la mayor parte de los registros se localizan en la zona nordeste, este y centro, casi siempre por ejemplares aislados y el resto en el sur (Cuni i Martorell, 1883; Fuente, 1933; Español, 1942; Torres Sala, 1962; Sánchez-Piñero, 1993; Baena & López-Colón, 1998; Grosso-Silva & López-Colón, 1998; López-Colón, 1998; López-Colón, 1999; López-Colón, 2000; Murria & Murria, 2001; Bercedo *et al.*, 2006). En las islas Baleares se conoce de Mallorca (Moragues & De Manzanos, 1894).

Se ha recolectado una hembra en la localidad de Villaverde y Pasaconsol (Cuenca, UTM30S5644, elev. 861 m.), el 11 de agosto de 2007 (J. M. Ortega leg. y coll.) revoloteando sobre inflorescencias de *Eryngium sp.* que supone el primer registro de la especie para la provincia de Cuenca.

Bibliografía: BAENA, M. & J. I. LÓPEZ-COLÓN 1998. *Rhipiphorus subdipterus* Bosc, 1792: presencia en Andalucía occidental. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **23**: 31. ● BERCEDO PÁRAMO P., L. ARNÁIZ RUIZ, P. BAHILLO DE LA PUEBLA & J. I. LÓPEZ-COLÓN 2006. Presencia de *Rhipiphorus subdipterus* Bosc, 1792 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y nuevos datos corológicos sobre ripifóridos (Coleoptera, Rhipiphoridae). *Boletín de la So-*

ciudad Entomológica Aragonesa, **39**: 429-430. ● CUNI I MARTORELL, M. 1883. Resultado de una exploración entomológica y botánica por el término de la Garriga (Cataluña). *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, **12**: 83-111. ● ESPAÑOL, F. 1942. Los representantes catalanes de la familia Rhipiphoridae (Col.). *Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los servicios Técnicos de Agricultura, Barcelona*, **2**(4): 335-346. ● FUENTE, J. M. DE LA 1933. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la Península Ibérica Pirineos propiamente dichos y Baleares (continuación). *Boletín de la Sociedad Entomológica de España*, **16**: 49-52. ● GROSSO-SILVA, J. M. & J. I. LÓPEZ-COLÓN 1998. *Rhipiphorus subdipterus* Bosc, 1792, nova espécie para a fauna de Portugal (Coleoptera, Rhipiphoridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **21**: 5-6. ● LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1998. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (I) (Coleoptera). *Lambillionea*, **97**(4): 642-650. ● LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1999. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (II) (Coleoptera). *Lambillionea*, **99**(1): 132-138. ● LÓPEZ-COLÓN, J. I. 2000. *Rhipiphorus subdipterus* Bosc, 1792 nuevo para la fauna de Aragón (NE de España) (Coleoptera: Rhipiphoridae). *Biocosme Mésogéen, Nice*, **16**(3) (1999): 153-156. ● MORAGUES Y DE MANZANOS, F. 1894. Insectos de Mallorca. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, **23**: 79-87. ● MURRIA BELTRÁN, F. & A. MURRIA BELTRÁN 2001. Nuevo registro de *Rhipiphorus subdipterus* Bosc, 1792 (Coleoptera, Rhipiphoridae) para Aragón. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **28**: 125. ● SÁNCHEZ-PIÑERO, F. 1993. *Ecología de las comunidades de coleópteros en zonas áridas de la Depresión de Guadix-Baza (Sureste de la Península Ibérica)*. Tesis Doctoral. Departamento de Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada: 229 pp. ● TORRES SALA, J. DE 1962. *Catálogo de la colección entomológica "Torres Sala" de coleópteros y lepidópteros de todo el mundo*. Diputación Provincial de Valencia, I: 1-487.