

Primera cita de *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae) para Cantabria (norte de España)

José Antonio Gainzarain

Instituto Alavés de la Naturaleza Apdo. de correos 2092 01080 Vitoria-Gasteiz – j.a.gainzarain@euskalnet.net

Resumen: Se aporta la primera cita de *Aeshna juncea* para la comunidad autónoma de Cantabria (norte de España).

Palabras clave: Odonata, *Aeshna juncea*, Península Ibérica, Cantabria.

First record of *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae) from Cantabria (northern Spain)

Abstract: The first record of *Aeshna juncea* from Cantabria (northern Spain) is reported.

Key words: Odonata, *Aeshna juncea*, Iberian Peninsula, Cantabria.

De entre las especies ibéricas de su género, *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) es la más escasa y localizada. Se trata de una libélula de distribución holártica, que resulta común en el centro y el norte de Europa, pero que hacia el sur del continente va rareándose y acantonándose en zonas de montaña (Askew, 2004). En España sus poblaciones se localizan en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y el norte del Sistema Ibérico (Ocharan *et al.*, 2005); existen además algunas citas del Sistema Central (Jurzitza, 1994), y recientemente se ha registrado su presencia en la provincia de Castellón (Prieto-Lillo *et al.*, 2009). Se la ha catalogado en el Libro Rojo de los Invertebrados de España dentro de la categoría de Vulnerable (Ocharan *et al.*, 2005), debido a lo reducido y fragmentado de su área de distribución ibérica, restringida básicamente a los altos niveles de las principales elevaciones montañosas del norte del país (Ocharan & Torralba Burrial, 2004).

Según Ocharan *et al.* (2005), los registros en la Cordillera Cantábrica se limitan a la comunidad autónoma de Asturias (aunque ese mismo autor también la citó de León: Ocharan, 1980), de manera que puede ser de interés la cita que aportamos a continuación, y que tuvo lugar el 14 de agosto de 2009. En esta fecha se observaron dos machos de la especie en un collado a 1280 m de altitud en las inmediaciones del pico Porracolina, ubicado en el cordal que separa los altos valles del Miera y del Asón, en el oriente de Cantabria (municipio de Arredondo; 30TVN4687). Estos ejemplares sobrevolaban a baja altura los pequeños charcos dispersos en una zona de turberas de reducida extensión, inmersa en un paisaje dominado por brezales, pastos montanos y afloramientos calizos. En este enclave se observaron también unos pocos individuos de *Pyrrosoma nymphula* (Sulzer, 1776) y *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798).

Dada la extensión de hábitat aparentemente propicio para la especie, es presumible que la falta de citas de *A. juncea* en Cantabria hasta la fecha se deba más a una insuficiente prospección que a una ausencia real, más aún teniendo en cuenta que la especie en Asturias se halla bastante repartida, llegando a ocupar incluso localidades situadas a baja altitud (Ocharan & Torralba Burrial, 2004).

Agradecimiento: A José Antonio Lara por su información sobre los registros de la especie en Castellón.

Bibliografía: ASKEW, R.R. 2004. *The dragonflies of Europe (revised edition)*. Harley Books, Colchester. ● JURZITZA, G. 1994. Observaciones de *Aeshna juncea* (L., 1758) en el norte de la provincia de Madrid. *Navasía*, 3: 7. ● OCHARAN, F.J. 1980. Catálogo de la colección de Odonatos (Insecta) del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo. *Boletín de Ciencias de la Naturaleza Instituto de Estudios Asturianos*, 26: 201-209. ● OCHARAN, F.J. & A. TORRALBA BURRIAL 2004. La relación entre los odonatos y la altitud: el caso de Asturias (Norte de España) y la Península Ibérica (Odonata). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, 35: 103-116. ● OCHARAN, F.J., M. FERRERAS ROMERO, R. OCHARAN & A. CORDERO RIVERA 2005. *Aeshna juncea* Linnaeus, 1758. En VERDÚ, J.R. & E. GALANTE (eds.): *Libro Rojo de los Invertebrados de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid, p. 248. ● PRIETO-LILLO, E., F.J. OCHARAN, L. FONTANA-BRIA & J. SELFA 2009. *Aeshna juncea* (Linnaeus 1758) (Odonata: Aeshnidae) en el sureste del sistema ibérico (Este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, 45: 539-540.