

***Clitellaria ehippium* (Fabricius): citada de España 122 años después (Diptera: Stratiomyidae)**

Miguel Carles-Tolrà¹ & Alvaro Murria Beltrán²

¹Avda. Príncipe de Asturias 30, ático 1; E-08012 Barcelona, España. mcarlestolra@terra.es
²Avda. de Navarra 7-11, esc. 1ª-2ª A; E-50010 Zaragoza, España. alvaromurria@hotmail.es

Resumen: El estratiómido *Clitellaria ehippium* (Fabricius) se vuelve a citar de España después de 122 años. Se cita por primera vez de Aragón.

Palabras clave: Diptera, Stratiomyidae, *Clitellaria ehippium*, 122 años después, España.

***Clitellaria ehippium* (Fabricius): recorded from Spain 122 years later (Diptera: Stratiomyidae)**

Abstract: The stratiomyid *Clitellaria ehippium* (Fabricius) is recorded again from Spain after 122 years. It is recorded from Aragón for the first time.

Key words: Diptera, Stratiomyidae, *Clitellaria ehippium*, 122 years later, Spain.

Introducción

Recientemente, el primer autor (MC-T), recibió unos pocos dípteros capturados en la provincia de Huesca por el segundo autor (AMB). Entre dicho material se encontraba un ejemplar de Stratiomyidae que ha sido identificado como *Clitellaria ehippium* (Fabricius, 1775).

Esta especie es bien conocida y está repartida por el paleártico occidental. También estaba citada de España de tres comunidades, concretamente de Castilla-León, Cataluña y Madrid. Esto significa, por lo tanto, que se cita ahora por primera vez de Aragón. Sin embargo, lo más interesante no es esta novedad a nivel de comunidad. Efectivamente, las tres únicas citas originales que aparecen en la bibliografía sobre esta especie en España datan todas de finales del siglo XIX, en concreto en los trabajos de Loew (1870), que la cita de España por primera vez, de Cazorro y Ruiz (1888), que la cita de Madrid y Segovia, y de Salvaña (1889), que la cita de Barcelona. En consecuencia, la última vez que se citó a esta especie de España fue en 1889, es decir hace 122 años.

Datos de captura

La Peña, Las Peñas de Riglos (Huesca), UTM 30TXM89, 23 mayo 2010, 1 hembra (sobre hojas de tilo, 550 m), A. Murria leg. El ejemplar ha sido identificado por el primer autor y se halla conservado en alcohol (70°) en la colección privada del mismo.

Descripción de la zona

La Peña se encuentra a orillas del embalse que lleva su nombre (Embalse de La Peña), que se encuentra en las sierras más meridionales del Pirineo oscense (Prepirineo). La captura se realizó junto al canal de Carcavilla, en la orilla sur del embalse. La vegetación dominante consiste en bosque mixto de *Pinus silvestris* (también hay cierta repoblación con *Pinus nigra nigra*), quercíneas de hoja caduca (*Quercus* sp.) y perenne (*Quercus ilex rotundifolia*), además de multitud de especies arbustivas (rosales, majuelos, endrinos, boj, etc.), chopos y pequeños olmos que bordean dicho canal. Junto a este tipo de bosque, bordeando la orilla del embalse y colonizando la zona de inundación, se encuentra el bosque de

galería (*Populus nigra* y *Salix* sp.). En el punto donde se recolectó el ejemplar se hizo en años recientes una tala de árboles que afectó a un pequeño grupo de tilos naturales (*Tilia* sp.), los únicos de la zona. Por suerte, los ejemplares talados están rebrotando y en sus grandes hojas suelen revolotear y acudir gran cantidad de insectos. La escasa altura que tienen todavía sus ramas verdes, de un metro aproximadamente, permite divisar a todos los insectos que se posan en ellas y fue, precisamente en una de estas ramas, donde se encontró y capturó el único ejemplar de *Clitellaria ehippium*.

Taxonomía

El género *Clitellaria* Meigen, 1803 pertenece a la subfamilia Clitellariinae y se distingue fácilmente de los demás géneros europeos por presentar un par de espinas en el escutelo y otro par en el tórax, justo encima de la base de las alas (Rozkošný, 1983). *Clitellaria* incluye 16 especies distribuidas por las regiones Australasia, Oriental y Paleártica, aunque sólo 2 se han citado de Europa: *C. ehippium* (Fabricius, 1775), que está repartida por varios países europeos y Rusia, y *C. pontica* (Lindner, 1936), citada únicamente de Bulgaria (Woodley, 2001).

C. ehippium es un díptero grande (9-15 mm), negro, que presenta el mesonoto recubierto de pilosidad roja, característica que la diferencia claramente de *C. pontica*, que la presenta negra (Rozkošný, 1983).

Bibliografía: CAZURRO Y RUIZ, M. 1888. Estratiómidos de España. *Actas Soc. Esp. Hist. Nat.*, **17**: 102-103. ● LOEW, H. 1870. Ueber von Herrn Dr. G. Seidlitz in Spanien gesammelte Dipteren. *Berl. entom. Zeitschr.*, t.**XIV**: 137-144. ● ROZKOŠNÝ, R. 1983. A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera). Volume 2. *Series Entomologica* 25. Dr W. Junk Publishers. 431 pp. ● SALVAÑA, J.M. 1889. *Flora y fauna de Mataró y su zona*. Barcelona, 87 pp. Dípteros: 60-61. ● WOODLEY, N.E. 2001. A World Catalog of the Stratiomyidae (Insecta: Diptera). *Myia*, **11**: 473 pp.