

PRIMERAS CITAS DE NOCTUIDOS PARA GALICIA (ESPAÑA) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)

Eliseo H. Fernández Vidal

Plaza de Zalaeta, 2-5ª, 15002 A Coruña (España) – lisuco1@hotmail.com

Resumen: Presentamos nuevos datos faunísticos de noctuidos de Galicia (España) que representan 54 primeras citas para esta región así como 131 para sus provincias.

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, primeras citas, Galicia, España.

First records from Galicia (Spain) of some noctuids (Lepidoptera: Noctuidae)

Abstract: New faunistic data of noctuids from Galicia (Spain) are reported, involving 54 first records from this region and 131 from its provinces.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, first records, Galicia, Spain.

Introducción

Se tiene escaso conocimiento sobre la composición faunística de los noctuidos de Galicia y su distribución geográfica en este territorio que, en contraste a su amplia extensión y rica diversidad de hábitats, sobresale como uno de los españoles menos estudiados al respecto. Las referencias bibliográficas que contienen información original de esta Familia en Galicia, a lo que alcanzamos, sólo rozan el medio centenar (Fernández Vidal, *in litt.*); en base a ellas y después de eliminar citas derivadas de confusiones geográficas así como determinaciones dudosas y/o inaceptables, comprobamos que sólo se conoce la presencia fidedigna en este territorio de 256 especies, aproximadamente un 32 % de las ibéricas cuando, probablemente, tal cómputo y porcentaje deben ser mucho mayores.

Como constatación de tal aserto y al objeto de contribuir al conocimiento de los noctuidos de Galicia, ofrecemos ahora, en forma de listado detallado, un considerable número de primeras citas regionales y/o provinciales, resultado mayormente de la determinación de ejemplares colectados durante el último lustro o, en algunos casos, más antiguamente.

Es de apuntar que si atendemos a mapas de distribución geográfica por los sistemas de manchas y/o rayado insertos en, por otra parte, relevante bibliografía, el número de especies de noctuidos de Galicia se incrementaría considerablemente. Pero mayormente no se trata de mapas basados en citas reales sino que expresan, con más o menos acierto, simple probabilidad. Es así, que pueda resultar sorprendente que algunas de las citas contenidas en el presente trabajo, especialmente provinciales de especies bastante comunes y de amplia distribución sean realmente las primeras.

Material y métodos

Colectamos la mayoría de ejemplares utilizando trampas de luz portátil tipo Heath con tubos fluorescentes de luz ultravioleta de 15 watts y negra de 8 watts, así como recogiendo los atraídos por todo tipo de luces de edificaciones y alumbrado público (tanto en zonas urbanas como rurales). La colecta fue siempre selectiva.

Presentamos los resultados en forma de listado comentado según el siguiente esquema: **1º** Nombre y autoría específica. **2º** Indicación de haber determinado por análisis genital al menos un ejemplar (g). **3º** Relación de ejemplares colectados, localizaciones y fechas, indicando el método de colecta (t = con trampa lumínica; l = “a las luces”). **4º** Comentarios.

En el ordenamiento genérico y específico seguimos básicamente a Yela (1997), así como mayormente en la nomenclatura taxonómica aunque, en algunos casos, atendemos a cambios propuestos en la serie *Noctuidae Europaeae* (Fibiger ed.). Obviamos toda indicación tribal y subgenérica. Como obras de consulta general utilizamos las de Calle (1982), Culot (1909-1913 y 1914-1917), Gómez Bustillo *et al.* (1979), Redondo *et al.* (2010) y Seitz (1914). Para la determinación, básicamente las de Berio (1985 y 1991), Fibiger (1990, 1993, 1997), Goater *et al.* (2003), Hacker *et al.* (2002), Ronkay *et al.* (2001), Ronkay & Ronkay (1995), Zilli *et al.* (2005) y puntualmente las de Agenjo (1941, 1945, 1967, 1970 y 1972), Bellavista & Pérez De-Gregorio (1985), De Laever (1983), Dufay (1983 y 1984) y Yela (1987).

Realizamos 60 preparaciones genitales, que obran en nuestra colección de A Coruña así como todos los ejemplares relacionados excepto parte de los de algunas especies, a la que dimos libertad *in situ*, según queda indicado en el listado. Todas las capturas son Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño *leg.*, salvo excepciones especificadas y las anteriores al año 2002 que son Eliseo H. Fernández Vidal *leg.* Los datos geográficos de las localidades y/o localizaciones de captura se detallan en la Tabla I; en el caso de la localidad genérica Pista al Tres Obispos especificamos para cada captura la altitud a que fue efectuada, así como en el de la carretera de Casaio a Fonte da Cova (con *sub.*, o *supra*) si no coincide con la del topónimo.

Nuestras labores de colecta estuvieron amparadas por los correspondientes permisos de la Xunta de Galicia desde que éstos se hicieron preceptivos.

Tabla I. Localidades y/o localizaciones gallegas citadas.

Nombre	Municipio	Provincia	Altitud (m)	UTM 10x10
A Carreira	Narón	A Coruña	70	29TNJ62
Chorén	Santiso	A Coruña	330	29TNH74
Playa Lago	Muxia	A Coruña	20	29TMH98
Trasanqueros	Cesuras	A Coruña	331	29TNH68
Albergue Club Ancares	Cervantes	Lugo	1.380	29TPH74
Campa de Fieiró	Cervantes	Lugo	1.470	29TPH74
Campelo	Folgo do Courel	Lugo	980	29TPH52
Carbedo	Folgo do Courel	Lugo	740	29TPH52
Degrada	Cervantes	Lugo	1.060	29TPH64
Esperante	Folgo do Courel	Lugo	797	29TPH52
La Coruxeira	Muras	Lugo	893	29TPJ01
Moreda	Folgo do Courel	Lugo	900	29TPH52
Muras	Muras	Lugo	486	29TPJ01
Nocedo	Quiroga	Lugo	292	29TPH30
Pista al Tres Obispos	Cervantes	Lugo	1.400-1792	29TPH74
Samos	Samos	Lugo	532	29TPH33
Sarria	Sarria	Lugo	455	29TPH26
Seoane	Folgo do Courel	Lugo	640	29TPH52
Viveiró	Muras	Lugo		29TPJ11
Biobra	Rubiá	Ourense	680	29TPH70
Casaio	Carballeda	Ourense	974	29TPG89
Fonte da Cova	Carballeda	Ourense	1.780	29TPG88
O Barco de Valdeorras	O Barco de Valdeorras	Ourense	328	29TPH69
O Trigal	Carballeda	Ourense	698	29TPG79
Tamaguelos	Verín	Ourense	465	29TPG23
Verín	Verín	Ourense	373	29TPG24
Baiona	Baiona	Pontevedra	10	29TNG16

Resultados

Meganola togatalis (Hübner, 1796). 1♀, Moreda, 23-VII-06 (l); 1♀, *supra* Casaio (1.280 m), 4-VII-09 (t). Nueva para Galicia.

Meganola albula (Denis & Schiffmüller, 1775). Chorén: 1♀, 28-VII-84; 1♀, 21-VII-85 (de día, espantados a nuestro paso). Nueva para A Coruña.

Nola chamitulalis (Hübner, [1813]). 1♀, Campelo, 18-VIII-07 (t). Nueva para Galicia.

Catocala elocata (Esper, 1787). 1♀, Verín, 24-IX-09 (de día, posada en área urbana). Nueva para Ourense.

Lygephila craccae (Denis & Schiffmüller, 1775): (g). 1♂, Pista al Tres Obispos (1.450 m), 23-VI-07 (t); 1♂, *supra* Casaio (1.250 m), 30-V-10 (t); 1♂, Seoane, 11-IX-10 (l). Nueva para Galicia.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758). 1♀, Verín, 8-IV-07 (l); 1♂, Samos, 6-V-09 (l). Nueva para Galicia.

Hypena obesalis Treitschke, 1829. 1♀, *supra* Casaio (1.450 m), 30-V-09 (t); 1♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761): (g). 1♂, Degrada, 13-IX-08 (t). Nueva para Galicia.

Trisateles emortalis (Denis & Schiffmüller, 1775). 1♂, Seoane, 19-VII-91 (l). Nueva para Lugo.

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794). 1♂, Moreda, 29-VIII-06 (l). Nueva para Lugo.

Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835): 1♀, Seoane, 2-VIII-08 (l). Nueva para Lugo.

Euchalcia variabilis (Piller, 1783). 1♀, Moreda, 23-VII-06 (l). Nueva para Galicia.

Eublemma parva (Hübner, [1808]): 3♂♂, *supra* Casaio (1.300 m), 1-VIII-10 (t). Nueva para Galicia.

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758). 1♂, Verín, 2-IX-10 (l). Nueva para Ourense.

Raphia hybris (Hübner, [1813]). 1♂, Moreda, 23-VII-06 (l); 1♂, *supra* Casaio (1.300 m), 1-VIII-10 (l). Nueva para Galicia.

Moma alpium (Osbeck, 1778). 1♂, Verín, 2-IX-10 (l). Nueva para Ourense.

Acronicta leporina (Linnaeus, 1758). 1♀, Muras, 9-VIII-00 (l). Nueva para Lugo.

Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffmüller, 1775). 1♂, Fonte da Cova, 30-V-09 (t). Nueva para Ourense.

Craniophora ligustri (Denis & Schiffmüller, 1775). 1♂ y 2♀♀, Seoane, 1-IX-07 (l). Nueva para Lugo.

Cryphia raptricula (Denis & Schiffmüller, 1775). 2♂♂, *sub* Fonte da Cova (1.500 m), 1-VIII-10. Nueva para Galicia.

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758). (g). 1♂, O Barco de Valdeorras, 1-VIII-10 (l). Nueva para Ourense.

Cucullia tanacetii (Denis & Schiffmüller, 1775). (g). 1♂, *supra* Casaio (1.300 m), 20-VI-10 (t). Nueva para Galicia.

Calophasia platyptera (Esper, 1788). (g). 1♂, *supra* Casaio (1.300 m), 20-VI-10 (t). Nueva para Galicia.

Xylocampa areola (Esper, 1789). 1♂, Biobra, 7-III-04 (de día, posado al pie de una farola); 2♂♂, Verín, 25-III-07 (l). Nueva para Ourense.

Valeria jaspidea (de Villiers, 1789). 1♀, Verín, 8-IV-07 (l). Nueva para Ourense.

Amphipyra tragopoginis (Clerk, 1759). 1♂, Albergue Club Ancares, 13-IX-08 (l). Nueva para Galicia.

Leucochlaena oditis (Hübner, [1822]). 1♂, Carbedo, 2-IX-01 (l); 1♀, Nocedo, 14-IX-03 (l); 1♂ y 2♀♀, Sarria, 24-IX-05 (l); 2♀♀, Verín, 24-IX-09 (l). Nueva para Lugo y Ourense.

Callopietria juvenina (Stoll, 1782). 1♂, Verín, 24-IX-09 (l). Nueva para Ourense.

Callopietria latreillei (Duponchel, 1827). 1♂, Seoane, 23-VII-06 (l). Nueva para Lugo.

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766). Biobra: 1♂, 6-VII-03; 1♂, 20-VII-03 (de día; recogidos muertos al pie de una farola). Nueva para Ourense.

Caradrina aspersa (Rambur, 1834). (g). 1♂, *sub* Fonte da Cova (1.500 m), 1-VIII-10. Nueva para Ourense.

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763). (g). 1♀, O Trigal, 22-V-11 (t). Nueva para Ourense.

- Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♀, Seoane, 25-VIII-07 (l). Nueva para Lugo.
- Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816): (g). 2♂♂, Albergue Club Ancares, 29-VI-08 (l); 1♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, Biobra, 26-V-03 (recogido de día muerto, al pie de una farola); supra Casaio (1.200-1400 m): 1♂, 20-VI-09 (t); 3♂♂, 4-VII-09 (t); 1♀, 19-VI-10 (t). Nueva para Ourense.
- Coenobia rufa* (Haworth, 1809): 1♂, Chorén, 28-VIII-84 (batiendo la vegetación en horario diurno). Nueva para A Coruña.
- Athetis pallustris* (Hübner, [1808]). (g). 1♂, Pista al Tres Obispos (1.450 m), 21-VI-07 (t); 1♂, Degrada, 7-VI-08 (t); Fonte da Cova: 1♂ 30-V-09 (l); 3♂♂, 19-VI-10 (l); 1♂, 22-V-11 (t); 2♂♂, 5-VI-11 (t); 3♂♂, 12-VI-11 (t). Nueva para Galicia. El ejemplar ilustrado (Fig. 1:23) es el más grande y diferente de toda la serie.
- Rusina ferruginea* (Esper, [1785]). (g). 1♂, La Carreira, 17-VI-87 (l); 1♂, Pista al Tres Obispos, 7-VII-07 (con linterna LED); 1♂, Degrada, 7-VII-07 (l). Nueva para A Coruña y Lugo.
- Polyphaenis sericata* (Esper, 1787). 2♂♂, Degrada, 21-VI-01 (de día; recogidos aún vivos dentro de un plafón de alumbrado). Nueva para Lugo.
- Talpophila vitalba* (Freyer, 1834). Verín: 1♂, 24-IX-09 (l); 1♂, 2-IX-10 (l). Nueva para Ourense. La consideramos especie diferente y suficientemente diferenciada de *Talpophila matura* (Hufnagel, 1766), constituyendo además un elemento faunístico de diferente origen y establecimiento en el sudoeste europeo.
- Luperina dumerilii* (Duponchel, 1827). (g). 3♂♂, Verín, 3-IX-10 (l). Nueva para Ourense.
- Calamia tridens* (Hufnagel, 1766). 1♀, Campelo, 18-VIII-07 (t); 1♀, supra Casaio (1.250 m), 31-VII-10 (a los focos del coche). Nueva para Galicia. Ambos ejemplares muestran intenso descolorido y desescamación alar.
- Capsula sparganii* (Esper, 1790). (g). 1♂, La Carreira, 28-VII-87 (l). Nueva para Galicia.
- Chortodes pygmina* (Haworth, 1809). (g). La Carreira: 1♂, 14-VIII-87 (l); 1♂, 26-VIII-87 (l); 1♂, 4-IX-87 (l). Nueva para A Coruña.
- Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758). 1♂, Verín, 2-IX-10 (l). Nueva para Ourense.
- Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775). 2♂♂, Verín, 26-III-09 (l). Nueva para Ourense.
- Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859). 1♂, Seoane, 15-IX-07 (l). Nueva para Lugo.
- Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767). 1♀, Campelo, 18-VIII-07 (l). Nueva para Galicia.
- Apamea crenata* (Hufnagel, 1766). (g). 2♂♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Apamea anceps* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, La Coruxeira, 17-VII-89 (espantada a nuestro paso en horario de la mañana). Nueva para Galicia.
- Apamea scolopacina* (Esper, 1788). 1♂, Seoane, 2-VIII-08 (l). Nueva para Lugo.
- Abromias monoglypha* (Esper, 1790). (g). Fonte da Cova: 1♂, 31-VII-10 (t); 2♂♂, 24-VII-11 (t). Nueva para Ourense.
- Abromias syriaca* (Osthelder, 1933). (g). 1♂, Pista al Tres Obispos (1.450 m), 7-VII-07 (t). Nueva para Galicia. Probablemente, entre nuestro material de varias localizaciones gallegas, determinado provisionalmente a ojo como *A. monoglypha*, aparezcan más ejemplares de esta especie cuando los analicemos genéticamente. La segregación temporal entre ésta y la anterior especie no parece ser tan marcada en Galicia como en otras zonas ibéricas siendo ciertamente similar, según hemos comprobado por capturas propias, a la que presentan en la vertiente leonesa de la cordillera Cantábrica (valles de San Emiliano, Luna, Arbás y Gordón).
- Abromias sublustris* (Esper, 1788). 1♂, Pista al Tres Obispos (1.500 m), 29-VI-08. Nueva para Galicia.
- Abromias lateritia* (Hufnagel, 1766). (g). Fonte da Cova: 1♂, 19-VI-09 (t); 6♂♂, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Abromias zeta* (Treitschke, 1825). (g). 1♂, Fonte da Cova, 31-VII-10 (l). Nueva para Galicia.
- Abromias furva* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). Fonte da Cova: 2♂♂, 31-VII-10 (l); 4♂♂ y 1♀, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Oligia fasciuncula* (Haworth, 1809). 1♂, Moreda, 30-VII-06 (espantada a nuestro paso en horas de la mañana). Nueva para Lugo.
- Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758). (g). 1♂, Moreda, 12-VIII-06 (l); 1♂, Samos, 8-IX-07 (l). Nueva para Lugo. De Galicia, fue citada por primera vez en Calle & Outerelo (1974) con material de El Moscoso (Pontevedra), ilustrándose 1♀ en Calle (1982); después, sólo en Fernández Vidal (2010 y 2011), de la Torre de Hércules y Cecebre (A Coruña). La existencia de la especie similar (“sibling species”) *Mesapamea secalella* Remm, 1983 (Fibiger *et al.*, 1984), que en Zilli *et al.* (2005) se amplía su presencia a toda la Península Ibérica, nos indujo a revisar ahora nuestro material; por el momento confirmamos el coruñés citado por nosotros como *M. secalis*, añadido en 1♂, de Playa Lago, VIII-09 (l), (F. Rosende *leg.*); así como en 1♂, de Baiona, 13-VIII-78.
- Mesapamea secalella* Remm, 1983. (g). 1♂, Viveiró, 5-IX-83(l); 1♂ y 2♀♀, Albergue Club Ancares, 13-IX-08 (t). Nueva para Galicia.
- Atethmia centrago* (Haworth, 1809). 1♀, Seoane, 15-IX-07 (l). Nueva para Galicia.
- Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766). 1♂, Seoane, 15-IX-07 (l); 2♂♂, Tamaguelos, 3-IX-10 (l). Nueva para Lugo y Ourense.
- Spudaea ruticilla* (Esper, 1791). 2♂♂, Verín, 7-IV-07 (l). Nueva para Ourense.
- Jodia croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775). 1♂, *sub* Fonte da Cova (1.600 m), 21-V-10. Ejemplar muy volado. Nueva para Galicia.
- Dryobotodes monochroma* (Esper, 1790). (g). 1♂, Seoane, 15-IX-07 (l); 1♀, Moreda, 11-IX-10 (l). Nueva para Galicia.
- Trigonophora haasi* (Staudinger, 1892). (g). 1♀, Seoane, 11-IX-10 (l). Nueva para Galicia.
- Trigonophora jodea* (Herrich-Schäffer, [1850]). 1♂, Verín, 25-IX-09 (l); 1♂, Seoane, 11-IX-10 (l); 1♂, Moreda, 2-X-11 (a pleno sol sobre una labiada, recién emergido aún extendiendo sus alas). Nueva para Lugo y Ourense.
- Polymixis xanthomista* (Hübner, [1819]). (g). 1♂, Moreda, 11-XI-06 (l); 1♂, Seoane, 2-X-11 (t). Nueva para Lugo.
- Mniotype adusta* (Esper, 1790). (g). Fonte da Cova: 2♂♂, 30-V-09 (t); 2♂♂ y 1♀, 19-VI-09 (t); 2♂♂, 12-VI-11 (t). Nueva para Galicia.
- Discestra trifolii* (Hufnagel, 1766). 1♂ y 1♀, Verín, 3-IX-10 (l). Nueva para Ourense.
- Lacanobia contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, Degrada, 7-VII-07 (l). Nueva para Galicia.
- Hada plebeja* (Linnaeus, 1761). 1♂, Albergue Club Ancares, 13-VI-08 (l); Fonte da Cova: 4♂♂ y 2♀♀, 30-V-09 (t); 1♂, 20-VI-09 (l); 20♂♂ y 3♀♀, 19-VI-10 (l); 12♂♂ y 5♀♀, 12-VI-11 (t); 1♀, 24-VII-11 (t); 4♂♂ y 2♀♀, *sub* Fonte da Cova (1.700 m), 19-VI-09 (t). Nueva para Galicia. En nuestra colección 8♂♂ y 4♀♀, al resto de ejemplares se les dio libertad *in situ*.

- Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766). (g). 1♂, Moreda, 29-VIII-06 (l). Nueva para Lugo.
- Hadena magnolii* (Boisduval, [1828]). (g). 4♂♂ y 1♀, Fonte da Cova, 30-V-09 (t). Nueva para Galicia.
- Hadena compta* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, Moreda, 30-VII-06 (l); 1♂, Esperante, 18-VIII-07 (t); 1♂, Campa de Fieiró, 20-VI-08 (t); 1♂, Seoane, 2-VIII-08 (l). Nueva para Galicia.
- Hadena fuligrama* (Esper, 1788). (g). Fonte da Cova: 2♂♂, 4-VII-09 (l). Nueva para Galicia. En su nomenclatura seguimos a Yela (1997:126).
- Hadena consparcatoides* (Schawerda, 1928). (g). 1♂ y 1♀, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Hadena caesia* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, Fonte da Cova, 19-VI-09 (t); 1♂, *sub* Fonte da Cova (1.600 m), 5-VI-11 (t). Nueva para Galicia. Ejemplares aún más oscuros que los de la cordillera Cantábrica (sbs. *grisea* Hospital, 1948) y que probablemente constituyan una nueva entidad subespecífica.
- Aneda rivularis* (Fabricius, 1775). 1♂, Seoane, 1-IX-09 (l). Nueva para Lugo.
- Sideritis turbida* (Esper, 1790). (g). 1♂, Pista al Tres Obispos (1.450 m), 23-VII-07 (t). Nueva para Lugo.
- Sideritis reticulata* (Goeze, 1781). Fonte da Cova: 3♂♂ y 2♀♀, 19-VI-09 (t); 4♂♂, 20-VI-09 (t); 1♂, 19-VI-10 (l); 16♂♂ y 3♀♀, 12-VI-11 (t). Nueva para Galicia. En nuestra colección 9♂♂ y 5♀♀, al resto de ejemplares recogidos se les dio libertad *in situ*.
- Polia bombycina* (Hufnagel, 1766). (g). 1♀, Seoane, 11-IX-10 (l). Ejemplar muy volado. Nueva para Galicia.
- Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766). *Supra* Casaio: 1♀, (1.350 m), 4-VII-09 (t); 1♂ (1.400 m), 20-VI-10 (t). Nueva para Galicia.
- Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766). Fonte da Cova: 1♂, 30-V-09 (t); 2♂♂, 19-VI-09 (t); 1♂, 22-V-11 (t). Nueva para Ourense.
- Mythimna pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂, La Carreira, 4-VII-87. Nueva para Galicia.
- Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775). 2♂♂, Verín, 2-IX-10 (l). Nueva para Ourense.
- Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787). Seoane: 4♂♂ y 3♀♀, 1-IX-07 (l); 1♂, 15-IX-07 (l). Nueva para Lugo.
- Mythimna comma* (Linnaeus, 1761). Fonte da Cova: 2♂♂, 30-V-09 (t); 2♂♂, 19-VI-09 (t). Nueva para Galicia.
- Mythimna obsoleta* (Hübner, [1803]). (g). 2♂♂, La Carreira, 13-VII-87. Nueva para Galicia.
- Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766). 1♀, Verín, 25-III-07 (l). Nueva para Ourense.
- Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758). 1♀, Verín, 26-III-09 (l). Nueva para Ourense.
- Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758). Verín: 1♂, 7-IV-07 (l); 2♂♂, 8-IV-07 (l). Un ejemplar de la f. *intermedia*. Nueva para Ourense.
- Lasionycta proxima* (Hübner, [1809]). 19♂♂ y 6♀♀, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia. En nuestra colección 8♂♂ y 4♀♀; al resto de ejemplares se le dio libertad *in situ*.
- Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♂ y 1♀, Trasanquelos, 23-VI-05 (l). Nueva para A Coruña.
- Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel *et* Hanigke, 1983. 1♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Ourense.
- Violaphotia molothina* (Esper, 1789). 1♂, Albergue Club Ancares, 13-VI-08 (l); 1♀, Campa de Fieiró, 28-VI-08 (t); 1♂, *supra* Casaio (1500 m), 21-V-11 (t). Nueva para Lugo y Ourense.
- Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, [1852]). 1♂, Albergue Club Ancares, 28-VI-08 (l); 3♂♂ y 1♀, Campa de Fieiró, 28-VI-08 (t); 1♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Lugo y Ourense.
- Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775). 1♂, Albergue Club Ancares, 28-VI-08 (l); 1♀, Seoane, 18-VIII-07 (l); Fonte da Cova: 1♀, 30-V-09 (l); 1♂, 19-VI-09 (t); 3♂♂, 24-VII-11 (t). Nueva para Lugo y Ourense.
- Chersotis oreina* Dufay, 1984. (g). 6♂♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Chersotis multangula* (Hübner, [1803]). 6♂♂, Fonte da Cova, 31-VII-10 (l). Nueva para Galicia. Ejemplares muy acordes a los de la Cordillera Cantábrica (sbs. *andreae* Dufay, 1973).
- Chersotis anatolica* (Draudt, 1936). (g). Fonte da Cova: 1♂, 12-VI-11 (t); 4♂♂, 24-VII-11 (t). Nueva para Galicia.
- Epiplasia cervantes* (Reisser, 1935). (g). 4♂♂, Fonte da Cova, 31-VII-10 (l). Nueva para Galicia.
- Eugnorisma arenoflavida*, (Schawerda, 1934). 1♀, Seoane, 9-IX-06 (l). Nueva para Galicia.
- Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766). (g). 2♂♂, Pista al Tres Obispos (1.450 m), 7-VII-07 (t). Nueva para Galicia.
- Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758). 1♂, Verín, 22-IV-11 (l). Nueva para Ourense.
- Xestia ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775). (g). 1♀, Moreda, 12-VIII-06 (l). Nueva para Galicia.
- Xestia agathina* (Duponchel, 1827). 2♂♂, Albergue Club Ancares, 14-IX-08 (t). Nueva para Lugo.
- Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761). (g). Fonte da Cova: 2♂♂, 19-VI-09 (t); 1♂, 29-V-10 (l); 3♂♂ y 4♀♀, 12-VI-11 (t). Nueva para Ourense. Las tempranas fechas de colecta de estos ejemplares resultan discordantes con lo anotado en la mayor parte de la bibliografía consultada no obstante, en los Pirineos y en partes de Cataluña al menos, también vuelan los adultos en VI (Bellavista & Pérez De-Gregorio, 1989).
- Dichagyris candelisequa* (Denis & Schiffermüller, 1775). 1♀, O Trigo, 1-VIII-10 (l). Nueva para Galicia.
- Yigoga fidelis* (de Joannis, 1903). (g). 1♂, *supra* Casaio (1.480 m), 21-V-11 (t). Nueva para Galicia.
- Agrotis crassa* (Hübner, [1803]). Seoane: 1♂, 18-VII-07 (l); 2♂♂, 1-IX-07 (l); 1♂ y 2♀♀, Verín, 2-IX-10 (l). Nueva para Lugo y Ourense.
- Agrotis puta* (Hübner, [1803]). (g). 2♂♂, Fonte da Cova, 24-VII-11; Verín: 1♂, 25-III-07 (l); 2♂♂, 7-IV-07 (l); 1♂, 8-IV-07 (l); 2♂♂, 22-IV-11 (l). Nueva para Ourense.
- Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766). 2♂♂, Fonte da Cova, 24-VII-11 (t). Nueva para Ourense.
- Agrotis chretieni* (Dumont, 1903). Fonte da Cova: 2♂♂, 30-V-09 (l); 37♂♂ y 12♀♀, 30-V-09 (t); 7♀♀, 19-VI-09 (t); 1♂, 20-VI-09 (l); 9♂♂ y 4♀♀, 22-V-11 (t); 8♂♂ y 1♀, 12-VI-11 (t). Nueva para Ourense. En nuestra colección 10♂♂ y 12♀♀, al resto de ejemplares recogidos se le dio libertad *in situ*.

Conclusiones y consideraciones

Hemos documentado la presencia en territorio gallego de 114 especies de noctuidos que suponen 54 primeras citas para Galicia, así como 8 para la provincia de A Coruña, 52 para la de Lugo y 71 para la de Ourense (véase Tabla II).

Constatamos la presencia en los macizos montañosos orientales de la región (Ancares y/o Trevinca) de especies que hasta ahora se suponía que en el norte de la Península Ibérica se distribuían exclusivamente en áreas montañosas de considerable altitud, de Pirineos a la Cordillera Cantábrica (*Abromias lateritia*, *Abromias zeta*, *Abromias furva*, *Mniotype*

Tabla II. Primeras citas para Galicia (G) y/o provincias de A Coruña (C), Lugo (L) y Ourense (O) presentadas en este trabajo. Marcadas con X según corresponda.

Especie	G	C	L	O
<i>Meganola togatalis</i>	X	-	X	X
<i>Meganola albula</i>	-	X	-	-
<i>Nola chamitulalis</i>	X	-	X	-
<i>Catocala elocata</i>	-	-	-	X
<i>Lygephila cracca</i>	X	-	X	X
<i>Hypena rostralis</i>	X	-	X	X
<i>Hypena obesalis</i>	X	-	-	X
<i>Parascotia fuliginaria</i>	X	-	X	-
<i>Trisateles emortualis</i>	-	-	X	-
<i>Paracolax tristalis</i>	-	-	X	-
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i>	-	-	X	-
<i>Euchalcia variabilis</i>	X	-	X	-
<i>Eublemma parva</i>	X	-	-	X
<i>Colocasia coryli</i>	-	-	-	X
<i>Raphia hybris</i>	X	-	X	X
<i>Moma alpium</i>	-	-	-	X
<i>Acronicta leporina</i>	-	-	X	-
<i>Acronicta euphorbiae</i>	-	-	-	X
<i>Craniophora ligustri</i>	-	-	X	-
<i>Cryphia algae</i>	-	-	-	X
<i>Cryphia raptricula</i>	X	-	-	X
<i>Cucullia umbratica</i>	-	-	-	X
<i>Cucullia tanacetii</i>	X	-	-	X
<i>Calophasia platyptera</i>	X	-	-	X
<i>Xylocampa areola</i>	-	-	-	X
<i>Valeria jaspidea</i>	-	-	-	X
<i>Amphipyra tragopoginis</i>	X	-	X	-
<i>Leucochlaena oditis</i>	-	-	X	X
<i>Callopietria juvenina</i>	-	-	-	X
<i>Callopietria latreillei</i>	-	-	X	-
<i>Caradrina morpheus</i>	-	-	-	X
<i>Caradrina aspersa</i>	-	-	-	X
<i>Caradrina clavipalpis</i>	-	-	-	X
<i>Hoplodrina blanda</i>	-	-	X	-
<i>Hoplodrina superstes</i>	X	-	X	X
<i>Hoplodrina ambigua</i>	-	-	-	X
<i>Coenobia rufa</i>	-	X	-	-
<i>Athetis pallustris</i>	X	-	X	X
<i>Rusina ferruginea</i>	-	X	X	-
<i>Polyphaenis sericata</i>	-	-	X	-
<i>Talpophila vitalba</i>	-	-	-	X
<i>Luperina dumerilii</i>	-	-	-	X
<i>Calamia tridens</i>	X	-	X	X
<i>Archanara sparganii</i>	X	X	-	-
<i>Chortodes pygmina</i>	-	X	-	-
<i>Euplexia lucipara</i>	-	-	-	X
<i>Chloantha hyperici</i>	-	-	-	X
<i>Pseudenargia ulicis</i>	-	-	X	-
<i>Cosmia affinis</i>	X	-	X	-
<i>Apamea crenata</i>	X	-	-	X
<i>Apamea anceps</i>	X	-	x	-
<i>Apamea scolopacina</i>	-	-	x	-
<i>Abromias monoglypha</i>	-	-	-	X
<i>Abromias syriaca</i>	X	-	X	-
<i>Abromias sublustris</i>	X	-	X	-
<i>Abromias lateritia</i>	X	-	-	X
<i>Abromias zeta</i>	X	-	-	X
<i>Abromias furva</i>	X	-	-	X
<i>Oligia fasciuncula</i>	-	-	X	-
<i>Mesapamea secalis</i>	-	-	X	-
<i>Mesapamea secalella</i>	X	-	X	-
<i>Atethmia centrargo</i>	X	-	X	-
<i>Xanthia icteritia</i>	-	-	X	X
<i>Spudaea rutilicilla</i>	-	-	-	X
<i>Jodia croceago</i>	X	-	-	X
<i>Dryobotodes monochroma</i>	X	-	X	-
<i>Trigonophora haasi</i>	X	-	X	-
<i>Trigonophora jodea</i>	-	-	X	X
<i>Polymixis xanthomista</i>	-	-	X	-
<i>Mniotype adusta</i>	X	-	-	X
<i>Discestra trifolii</i>	-	-	-	X
<i>Lacanobia contigua</i>	X	-	X	-
<i>Hada plebeja</i>	X	-	X	X
<i>Hadena bicruris</i>	-	-	X	-

Tabla II (cont.)

Especie	G	C	L	O
<i>Hadena magnolii</i>	X	-	-	X
<i>Hadena compta</i>	X	-	X	-
<i>Hadena filograma</i>	X	-	-	X
<i>Hadena consparcatoides</i>	X	-	-	X
<i>Hadena caesia</i>	X	-	-	X
<i>Aneda rivularis</i>	-	-	X	-
<i>Sideritis turbida</i>	-	-	X	-
<i>Sideritis reticulata</i>	X	-	-	X
<i>Polia bombycina</i>	X	-	X	-
<i>Polia nebulosa</i>	X	-	-	X
<i>Pachetra sagittigera</i>	-	-	-	X
<i>Mythimna pudorina</i>	X	X	-	-
<i>Mythimna albipuncta</i>	-	-	-	X
<i>Mythimna ferrago</i>	-	-	X	-
<i>Mythimna comma</i>	X	-	-	X
<i>Mythimna obsoleta</i>	X	X	-	-
<i>Orthosia incerta</i>	-	-	-	X
<i>Orthosia gothica</i>	-	-	-	X
<i>Egira conspiciaris</i>	-	-	-	X
<i>Lasionycta proxima</i>	X	-	-	X
<i>Diarsia brunnea</i>	-	X	-	-
<i>Noctua tirrenica</i>	-	-	-	X
<i>Violaphotia molothina</i>	-	-	X	X
<i>Lycophotia erythrina</i>	-	-	X	X
<i>Lycophotia porphyrea</i>	-	-	X	X
<i>Chersotis oreina</i>	X	-	-	X
<i>Chersotis multangula</i>	X	-	-	X
<i>Chersotis anatolica</i>	X	-	-	X
<i>Epipsilia cervantes</i>	X	-	-	X
<i>Eugnorisma arenoflavida</i>	X	-	X	-
<i>Xestia triangulum</i>	X	-	X	-
<i>Xestia c-nigrum</i>	-	-	-	X
<i>Xestia ditrapezium</i>	X	-	X	-
<i>Xestia agathina</i>	-	-	X	-
<i>Euxoa nigricans</i>	-	-	-	X
<i>Dichagyris candelisequea</i>	X	-	-	X
<i>Yigoga fidelis</i>	X	-	-	X
<i>Agrotis crassa</i>	-	-	X	X
<i>Agrotis puta</i>	-	-	-	X
<i>Agrotis clavis</i>	-	-	-	X
<i>Agrotis chretieni</i>	-	-	-	X

adusta, *Hadena caesia*, *Hadena compta*, *Mythimna comma*, *Chersotis multangula*, etc.), ampliándose así considerablemente sus áreas de distribución.

Constatamos también la presencia en Galicia de otras escasamente o nunca citadas del occidente ibérico y de algunas consideradas raras (*Calamia tridens*, *Dichagyris candelisequea*, *Eugnorisma arenoflavida*, etc.). Destacamos especialmente, tal como se hace en Ortiz *et al.* (2009) citándola como nueva para Cuenca, la de *Athetis pallustris*, sólo conocida hasta entonces en España de escasas localidades de Huesca y Teruel (Agenjo, 1970; Redondo, 1990), La Rioja (Latasa *et al.*, 2001) y Lérida (Pérez De-Gregorio, 2001).

Agradecimiento

A Francisco Rosende Maneiro que recogió ejemplares para mí a las luces del camping de Playa Lago; A José Luis Janeiro Crespo por facilitarme la colecta "a las luces" del Aula de la Naturaleza de Moreda; a mi hermana María Isabel y a mi cuñado Remigio Nieto Espiñeira, que me acompañaron repetidas ocasiones por el Courel, Ancares y el área de Trevinca atendiendo las trampas y recogiendo ejemplares; especialmente a mi esposa Antonia Rodríguez Fandiño, a quien debo buena parte de las capturas relacionadas en este trabajo; y a Miguel López Caeiro por su colaboración fotográfica.

Bibliografía

- AGENJO, R. 1941. Analectas de *Agrotidae* españoles (*Lep. Agrot.*). *EOS*, **17**: 293-312, láms. VII-VIII.
- AGENJO, R. 1945. Cinco géneros y treinta especies de *Agrotidae* nuevos para la fauna española (*Lep. Agrot.*). *EOS*, **21**(2): 165-200, láms. IV-X.
- AGENJO, R. 1967. Una nueva *Parascotia* (Hb., 1826) de la Sierra de Guadarrama, dedicada al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Manuel Lora Tamayo, Ministro de Educación y Ciencia (*Lep. Noctuidae*). *EOS*, **43** (1-2): 7-12, lám.I.
- AGENJO, R. 1970. Seis géneros y veinte especies de *Noctuidae* nuevos para España. *Graellsia*, **25**: 119-140, láms. II-VI.
- AGENJO, R. 1972. Los *Dryobotodes* europeos, defoliadores de quercíneas, estudiados con material español (*Lep. Noctuidae*). *Bol. Est. Cent. Ecol.*, **1**(2): 25-42, láms. I-II.
- BELLAVISTA I ADMETLLA, J. & J. J. PÉREZ DE-GREGORIO 1985. Nota sobre les especies catalanes del genere *Photodes* Lederer, 1857 (*Noctuidae Amphipyrrinae*). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, **7**: 43-48.
- BELLAVISTA [I ADMETLLA], J. & J. J. PÉREZ DE-GEGORIO 1989. El gènere *Euxoa* Hübner, 1821, a Catalunya (*Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae*). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, **10**: 97-124.
- BERIO, E. 1985. *Noctuidae*, I. Generalità. *Hadeninae, Cucullinae, In Fauna d'Italia, Lepidoptera*, **22**: 970 pp., 32 láms. Edizioni Calderini. Bologna.
- BERIO, E. 1991. *Noctuidae*, II. Sezione Quadrifide, *In Fauna d'Italia, Lepidoptera*, **27**: 708 pp., 16 láms. Edizioni Calderini. Bologna.
- CALLE, J. A. 1982. Noctuidos españoles. *Boln. Ser. Plag. Insp. Fitop., Fuera de Serie*, **1**: 430 pp.
- CULOT, J. 1909-1913. *Noctuelles et Géomètres d'Europe. Première Partie. Noctuelles. Volume I*: 220 pp., láms. 1-38. (Reedición 1986). Apollo Books. Svendborg.
- CULOT, J. 1914-1917. *Noctuelles et Géomètres d'Europe. Première Partie. Noctuelles. Volume II*: 243 pp., láms. 39-81. (Reedición 1986). Apollo Books. Svendborg.
- DE LAEVER, E. 1983. *Noctua tirrenica*, sp. nov. en Espagne. *SHILAP Revta. lepid.*, **11**(43): 202.
- DUFAY, C. 1983. *Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel et Hanigke (1983), espèce nouvelle pour l'Espagne (*Noctuidae, Noctuinae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **11**(43): 197-201.
- DUFAY, C. 1984. *Chersotis oreina* n. sp., noctuelle méconnue des montagnes de l'Europe occidentale (*Noctuidae, Noctuinae*). *Nota lepid.* **7**(1): 8-20.
- FERNÁNDEZ VIDAL, E. H. 2010. Lepidopterofauna de la Torre de Hércules (A Coruña, Galicia, España) (*Lepidoptera*). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, **46**: 285-298.
- FERNÁNDEZ VIDAL, E. H. 2011. Lepidopterofauna lucípeta de la fraga de Cecebre (A Coruña, Galicia, España) (*Lepidoptera*). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, **48**: 163-182.
- FERNÁNDEZ VIDAL, E. H. (*in litt.*). Catálogo comentado de los noctuidos de Galicia (*Lepidoptera: Noctuidae*).
- FIBIGER, M. 1990. *Noctuidae Europaeae. Volume 1. Noctuinae I*: 208 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M. 1993. *Noctuidae Europaeae. Volume 2. Noctuinae II*: 230 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M. 1997. *Noctuidae Europaeae. Volume 3. Noctuinae III*: 418 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M., K. MIKKOLA, A. MOBERG & P. SVENDSEN 1984. *Mesapamea secalella* Remm, 1983, a new species found in Western Europe. *Nota lepid.*, **7**(2): 121-131.
- GOATER, B., L. RONKAY & M. FIBIGER 2003. *Noctuidae Europaeae. Volume 10. Catocalinae & Plusiinae*: 452 pp. Entomological Press. SorØ.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R., M. ARROYO VARELA & J. L. YELA GARCÍA 1979. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros (III). Superfamilia Noctuoidea (Segunda parte) Noctuidae (partim)*: 263 pp. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- HACKER, H., L. RONKAY & L. M. HREBLAY 2002. *Noctuidae Europaeae. Volume 4. Hadeninae I*: 419 pp. Entomological Press. Soro.
- LATASA ASSO, T., I. PÉREZ MORENO & A. GARZÓN SÁNCHEZ *Trabajo de campo de Lepidópteros y Coleópteros del Parque Natural Sierra de Cebollera (La Rioja)*: 164 pp. CEIP. Gobierno de La Rioja. Logroño.
- ORTIZ, A. S., M. GARRE, J. J. GUERRERO, R. M. RUBIO & J. A. CALLE 2009. Nuevas citas de la Familia *Noctuidae* en Cuenca (España) (*Lepidoptera: Noctuidae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **37**(145): 105-114.
- PÉREZ DE-GREGORIO, J. J. 2001. Recerques Consell de redacció. *Bull. Soc. Cat. Lep.*, **88**: 23-24.
- REDONDO VEINTEMILLAS, V. M. 1990. *Las mariposas y falenas en Aragón. Distribución y catálogo de especies*: 226 + 1 pp. Diputación General de Aragón. Zaragoza.
- REDONDO, V., J. GASTÓN & J. C. VICENTE 2010. *Las mariposas de España peninsular. Manual ilustrado de las especies diurnas y nocturnas*: 405 pp. Ediciones Prames. Zaragoza.
- RONKAY, G. & L. RONKAY 1995. *Noctuidae Europaeae. Volume 7. Cuculliinae II*: 224 pp. Entomological Press. Soro.
- RONKAY, L., J. L. YELA & M. HREBLAY 2001. *Noctuidae Europaeae. Volume 5. Hadeninae II*: 452 pp. Entomological Press. Soro.
- SEITZ, A. (Ed.). 1914. *Die Gross-Schmetterlinge der Erde. I. Abteilung: Die Gross-Schmetterlinge der Palaearktischen Faunengebietetes. 3. Band: Die eulenartigen Nachtfalter*: i-iii + 511 pp; i-iv + 75 láms. Alfred Kern. Stuttgart.
- YELA, J. L. 1997. Noctuidos del área iberoibérica: adiciones y correcciones a la lista sistemática, con consideraciones micro y macroevolutivas y una propuesta filogenética global (*Insecta: Lepidoptera: Noctuidae*). *ZAPATERI Revta. aragon. ent.*, **7**: 91-190.
- YELA GARCÍA, J. L. 1987. Contribución al conocimiento del género *Caradrina* Ochseneimer, 1816: primera aproximación al estudio de los imagos de las especies ibéricas del subgénero *Paradrina* Boursin, 1937 (*Lepidoptera: Noctuidae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **59**: 189-256.
- ZILLI, A., L. RONKAY & M. FIBIGER 2005. *Noctuidae Europaeae. Volume 8. Apameini*: 323 pp. Entomological Press. SorØ.

Fig. 1. Ejemplares de algunos noctuidos de Galicia que se citan en este trabajo:

1. *Abromias furva* (D. & S.) ♂, Fonte da Cova, 31-VII-10;
2. *Mniotype adusta* (Esp.) ♂, Fonte da Cova, 30-V-09;
3. *Sideritis reticulata* (Goeze) ♂, Fonte da Cova, 11-VI-11;
4. *Eugnorisma arenoflavida* (Schaw.) ♀, Seoane, 9-IX-06;
5. *Calamia tridens* (Huf.) ♀, supra Casaio, 31-VII-10;
6. *Epipsilia cervantes* (Reisser) ♂, Fonte da Cova, 31-VII-10;
7. *Athetia centrigo* (Haw.) ♀, Seoane, 15-IX-07;
8. *Cryphia raptricula* (D. & S.) ♂ sub Fonte da Cova, 1-VIII-10;
9. *Cosmia affinis* (L.) ♀, Campelo, 18-VIII-07;
10. *Mythima obsoleta* (Hüb.) ♂, A Carreira, 13-VII-87;
11. *Chersotis oreina* Dufay ♂, Fonte da Cova, 24-VII-11.
12. *Polia nebulosa* (Huf.) ♀, supra Casaio, 4-VII-09.
13. *Chersotis anatolica* (Draudt) ♂, Fonte da Cova, 24-VII-11.
14. *Hadena consparcatoides* (Schaw.) ♀, Fonte da Cova, 24-VII-11.
15. *Hadena compta* (D. & S.) ♂, Moreda, 30-VII-06.
16. *Hadena caesia* (D. & S.) ♂, Fonte da Cova, 19-VI-09.
17. *Dichagyris candelisequa* (D. & S.) ♀, O Trigoal, 1-VIII-10;
18. *Hypena obesalis* Treitschke ♂, Fonte da Cova, 24-VII-11;
19. *Yigoga fidelis* (de Joannis) ♂, supra Casaio, 21-V-11;
20. *Abromias sublustris* (Esp.) ♂, Pista al Tres Obispos, 29-VI-08;
21. *Euchalcia variabilis* (Pill.) ♀, Moreda, 23-VII-06;
22. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck) ♂, Albergue Club Ancares, 13-IX-08;
23. *Athetis pallustris* (Hüb.) ♂, Pista al Tres Obispos, 2-VI-07;
24. *Abromias lateritia* (Huf.) ♂, Fonte da Cova, 24-VII-11.
25. *Violaphotia molothina* (Esp.) ♀, Campa de Fieiró, 28-VI-08.

