

Primera cita de la Península Ibérica de un macho glabro de *Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linnaeus, 1758)

Antonio Hidalgo-Fontiveros¹ & Alberto del Saz Fucho²

¹ Fuente del Oso, nº 3. 23700, Linares, Jaén – antonio_hidalgo_fontiveros@yahoo.es

² Estocolmo, 98. 28922, Alcorcón, Madrid – adelsaz@telefonica.net

Resumen: En esta nota se presenta la primera captura en la Península Ibérica de un ejemplar macho glabro de *Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linnaeus, 1758).

Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Iberodorcadion fuliginator*, glabro, Península Ibérica.

First record for the Iberian Peninsula of a hairless male of *Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linnaeus, 1758)

Abstract: In this note we report the first hairless male of *Iberodorcadion fuliginator* (Linnaeus, 1758) collected in the Iberian Peninsula.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Iberodorcadion fuliginator*, hairless, Iberian Peninsula.




Fig. 1: *Iberodorcadion fuliginator andianum* (Pic, 1917), glabro. Escala gráfica 14 mm. **Fig. 2:** Mapa de distribución UTM 10x10 Kms. **Fig. 3:** Habitus de *Iberodorcadion fuliginator andianum* (Pic, 1917). Escala gráfica 11,5 mm.

La presencia de ejemplares glabros en las especies de *Iberodorcadion* Breuning, 1943 es algo más o menos frecuente. Esto ha dado lugar a la descripción de diversas formas sin ningún valor taxonómico en la actualidad.

El trabajo de Saz (2009) recoge de manera minuciosa información acerca de las diferentes formas glabras de los *Iberodorcadion* ibéricos conocidas hasta la fecha. Según este autor, la variedad *atrum* Bach, 1856 de *Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linnaeus, 1758), no tendría que tenerse en cuenta por corresponder a ejemplares ♂♂ y ♀♀ recogidos en Alemania central y no tener noticias de la captura de individuos glabros en nuestro país. En el presente trabajo damos a conocer la primera captura de un macho de *I. fuliginator* (Linnaeus, 1758) glabro para la Península Ibérica (Fig. 1).

DATOS DE CAPTURA: un ejemplar ♂, en un camino situado entre el pueblo de Lezáun y el puerto de Lizarraga. 30TWN84, 906 m (Fig. 2). El individuo se encontraba andando entre las rodadas de un camino. 12-V-2011, A. Hidalgo leg. El ejemplar se encuentra depositado en la colección de A. Hidalgo.

COMENTARIO: esta especie presenta un área de distribución que ocupa gran parte de Europa occidental, estando localizada en

nuestro país en los Pirineos y sus estribaciones (Bahillo, 1997). En el territorio español, están descritas cinco subespecies (Vives, 1983), de las cuales tres presentan una corología Vasco-Navarra. Una de ellas, *Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator andianum* (Pic, 1917), se localiza en las Sierras de Urbasa y de Andía, lugar donde se capturó el ejemplar y de donde se obtuvo numeroso material asignable a esta subespecie. *I. fuliginator andianum* se caracteriza por poseer en el disco del pronoto dos almohadillas de tomento marrón muy denso a ambos lados de la línea media longitudinal (Fig. 3).

Bibliografía: BAHILLO, P. 1997. Estudio de la variabilidad en las poblaciones de *Iberodorcadion fuliginator* (Linnaeus, 1758) del País Vasco y Navarra (Coleoptera: Cerambycidae). *Boln. Asoc. Esp. Ent.*, 21: 3-4. • SAZ, A. DEL 2009. Sobre los ejemplares glabros *Iberodorcadion* Breuning, 1943, con tomento elitral (Coleoptera, Cerambycidae) y estudio de la demo glabra de *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) pseudomolitor* (Escalera, 1902). *Boln. S.E.A.*, 45: 127-134. • VIVES, E. 1983. *Revisión del género Iberodorcadion (Coleópteros Cerambycoides)*. CSIC. Inst. Esp. Entom., Madrid, 171 pp.